

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



1876

Prisuppgift,

gällande för våren 1876, å införskrifna, nyare, utländska

Sätt-Potatis-Sorter.

Expedieras i April och Maj månader.

Samtliga sorterna äro utmärkt goda, passande till odling för bordet, hållbara och ytterst riktbärande.

Priserna äro beräknade pr extra kontant, utan rabatt.

Emballage beräknas särskildt, men billigast möjligt.

Requisitioner torde göras så tidigt som möjligt, för att i god tid kunna medhinnas och helst uppsättas på ett särskildt blad, för att lättare observeras och särskiljas från order å andra artiklar.

	Pr 20 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
	Kr. ö.	Kr. ö.
Bisquit , en utmärkt god, tidig och gifvande sort	4,50	— 25
Peerless eller Bresse's; n:o 6, tidiga, ytterst fina och mycket gifvande	4,50	— 25
Prolific eller Bresse's n:o 2, mycket tidiga, stora, hvita, utm. fina och gifvande	5	— 30
Mühlhäuser , medeltidiga, stora, runda, hvita, utm.	5	— 30
Marjolin , njurpotatis, gulhvita, utmärkta	6	— 35
Njurpotatis , sena, hvita, utm.	5	— 30
Early Goodrich , hvita, runda utmärkt fina; en af de allra tidigaste sorter	4,50	— 25

	Pr 20 <i>℔</i> .	Pr <i>℔</i> .
	Kr. ö.	Kr. ö.
Amerikanska Rosen- eller Early rose , röda, ovala, stora, en mycket tidig, god och gifvande sort, pålitliga	3,50	— 20
King of the early , ytterst fina, välsmakande och gifvande; tidigare än förestående. År 1869 betaltes i Amerika 50 dollars för en enda potatis af denna sort	4,50	— 25
Flower ball , rödaktiga; en utm. god och gifvande sort, som ej nog kan rekommenderas till odling. Den har visat sig vara nästan oemottaglig för potatis-sjukdom	7	— 40

Order upptagas å alla sorter utländska och inhemska **Südesarter**, såsom **Hafre, Hvete, Korn** och **Råg** m. m. och utföras snarast möjligt till billigaste priser. Dock utföres ingen sådan order å mindre än 25 *℔*. af samma sort.

Alla Requisitioner, hvars värde ej uppgår till **minst 10 Kronor**, böra åtföljas af likvid i förskott.

Williams patenterade Grässkäringsmaskiner.

Utmärkta för finare gräsplaner för såväl slät som kuperad mark. Gräset bör ej få blifva högre än 6 tum innan det afskäres.

Till följande priser pr st. utom emballage.


N:o 1, skär 9 tum bredt, 55 kr.	N:o 3, skär 14 tum bredt, 90 kr.
N:o 2, skär 11 tum bredt, 70 kr.	N:o 4, skär 21 tum bredt, 125 kr.

Georg Löwegren,
adr.: Göteborgs Trädgårdsförening

1876

Wm. W. W. W.
Cyril. W. W. W.





Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1876, å

DIVERSE FRÖSORTER.

Vid öfverlemnandet af denna prisförteckning vilja vi fästa uppmärksamheten derpå, att *hufvudsyftet* med vår fröhandel är, att *tillhandahålla allmänheten verkligt goda, fullt pålitliga, äkta och grobara frösorter*. De frö, som ej odlas här, införskrifvas direkte från de ofta aflägsna orter, der de *bäst och mest* odlas samt från de *bästa och tillförlitligaste fröodlare*, utan afseende på prishillighet. Alla *rester* af frö, som ej gro sedan de blifvit gamla, *bortkastas* hvarje år, och de *tveivelaktiga säljas ej*, förr än vi försäkrat oss om deras *grobarhet* genom profsning.

Det är naturligt, att detta förfaringssätt är förenadt med *stora kostnader*, hvarför vi ej heller *alltid* kunna sälja till *billigaste priser*, men som vår årliga omsättning är mycket stor, så äro våra priser likväl, *i förhållande till varornas godhet*, i allmänhet billiga.

För öfrigt inses det lätt, att jorden och det derpå nedlagda arbetet är mångdubbelt dyrare än fröet samt att *godt frö*, äfven om det *betalas dyrt*, är *billigare* än dåligt.

Vårt bemödande skall derfor alltid förblifva, att sälja jembforelsevis billiga, men *framförallt verkligt goda, äkta varor*.

Göteborgs Trädgårdsförening.



Petunia
hybrida fl. pl.



Salpiglossis variabilis.



Tropæolum
majus nanum.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Af förekommen anledning fästa vi uppmärksamheten derpå, att vår firma *icke* har något gemensamt med Herr C. F. Liepe eller hans firma: "Trädgårdsbolaget i Göteborg."

Vänligen anhålles att denna pristuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt överlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.



Collinsia bicolor.

Ingående requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, och i den ordning de komma oss tillhanda. Det händer ofta om våren, att så många requisitioner nästan samtidigt anlända, att det åtgår flera veckors tid till deras expedition. Det är därför **angeläget att requisitionerna hitsändas **minst 14 dagar** innan det requirerade skall användas.**

Requisitioner, hears värde ej uppgår till **minst 10 Kronor, böra, för att blifva expedierade, **ovilkorligen åtföljas af likvid i förskott**. Överskott af insände penningar återsändas noggrant, då räkning å det expedierade aflätes. **Innehållet å nästa sida torde benäget nog observeras.****

Göteborgs Trädgårdsförening.

Prisuppgift,

gällande för året

1876,

innehållande förteckning öfver

DIVERSE FRÖSORTER,

allesamman friska, grobara och äkta,
som försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

På våren utgifves ingen ny prisförteckning öfver växter emedan växtpriserna äro nästan oförändrade. Priserna å en del växter finnas noterade i slutet af denna prisförteckning. Rekommenderande denna prisuppgift hos resp. blomstervänner och landbrukare, anhålla vi att beställningar måtte så tidigt som möjligt insändas (senast 14 dagar å 3 veckor innan det rekvirerade skall användas) och torde observeras, att bref, requisitioner och remisser adresseras:

"Till Göteborgs Trädgårdsförening."

- Genom denna nya prisuppgift annulleras alla våra föregående frökataloger. De i densamma förekommande kulturbeskrifningar och öfrige upplysningar göra den i någon mån äfven till en handbok i trädgårdsskötsel. Alla nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med fetare stil, för att lättare kunna observeras. Öfverst på hvarje sida finnes dess innehåll angifvet.
- Requenter anmodas att utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig, och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart tager slut, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De requenter, som vilja anförto oss urvalet af sorterna, kunna vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
- Vid oförutsedda prisförändringar å de mest gängbara frösorterna ikläda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
- Requisitioner, som icke åtföljas af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes, expedieras ej, såvida requirerten ej förut stätt i affärsförbindelse med oss. Öfverskott af insände penningar återsändes noggrant då räkning å det rekvirerade aflåtes.
- Requisitioner, hvars värde ej uppgår till minst 10 Kronor, torde alltid åtföljas af likvid i förskott.
- Å requisitioner, hvilka åtföljas af likvid i förskott och uppgå till belopp af minst 50 Kronor, godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomifrö eller för emballage.
- Emballeringen verkställs sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
- Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser. Alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

genom Georg Löwegren.

Obs! Prisförteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

A. Frö till Köksträdgårdsväxter.

Efter vigt säljes ej mindre än 1 ort, Från och med 25 ort säljes efter $\text{t}l$ -priset.

Pr $\text{t}l$. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Pr $\text{t}l$. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

I. Kålväxter:

Bladkål (*Brassica oleracea acephala*).

hög, blå, krusbladig	3,60	—	6
grön, krusbladig	3	—	5
låg, blå, krusbladig	3,60	—	6
grön, krusbladig	2	—	4
plumage-el. fjäder-, å p. 10 ö.	—	—	30
palmråd-, . . å port. 10 öre	—	—	50
jätte-, blå, 6 å 8 fot hög	4	—	6
träd- eller kokål, grön, stor.	1,60	—	4

Till odling för köket är isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen att rekommendera. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina spräckliga, färgskiftande blad. Jätte-, ko- och palmträdgårdskålen användes till kreatursfoder, den sistnämnda äfven till prydnadsväxt på kalljord.

Brüssel eller Rosenkål, (*Brassica oleracea gemmifera*).

hög	2,40	—	5
låg, förbättrad	3	—	5

Dessa utmärkte kålsorter fordra god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen afknipes, längs utmed stammen en mängd små, förnorslika hufvuden, hvilka, om de väl tillagas, äro lika välsmakande som blomkål. Implanteras på hösten i källare, hvarest de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing, (*Brassica oleracea capitata bullata*).

tidig, gul Blumenthaler	4,60	—	7
drumhead	2	—	4
sen drumhead	2	—	4
tidig, grön Wiener	3	—	5
chou marzelin	3	—	5
Waterloo curled	3	—	5

Alla sorterna behandlas som vanlig hvitkål.

Hufvudkål. (*Brassica oleracea capitata*).

hvit, Svensk från Kinnekulle, utm. stor och god sort	8	—	12
extra stor, platt Braunschweiger, äkta rma	7,80	—	10
platt, Lübecker	7,60	—	10
midssommarkål, låg, tidig Engelsk, utmärkt	5	—	7
majspets-, tidig med spetsiga hufvuden	6,40	—	9
sockertopp, tidig med spetsiga hufvuden	5	—	7
Yorker-, tidig, utm.	3	—	5
Enfields Markt-, tidig	3	—	5
Emperor-, tidig	3	—	5
Prince Albert	3	—	5
röd Erfurter, tidig, utmärkt	—	—	15
Cabus, sen, stor, platt	—	—	12

Blomkål. (*Brassica oleracea botrytis*).

Erfurter dverg-, (Haages) rma äkta sort, . . . å port 20 öre	2,40
Holländsk dverg-, till drifn.	20
tidig Engelsk	15
sen Engelsk	15
Asiatisk, stor, sen	15
Cyprisk, tidig	15

Algier, tidig med bländhvita hufvuden, förträfflig, å p. 10 ö. 45 — 50

Frankfurter Jätte-, mycket att rekommendera för fritt land; frambringar på senhösten klossala hufvuden, å port 10 ö. — 50

standholder-, utmärkt 15 — 20

Walchern, utmärkt 15 — 20

Till drifning är Haages Erfurter dvergblomkål den bästa. Blifver ej gerna öfver 15 tum hög; har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufvuden.

Broccoli eller Sparriskål (*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

Engelsk, violett	10
hvit	8

Denna, flerstädes i utlandet med förkärlek odlade kål, är nära beslägtad med blomkålen; hvafv den endast är en förändring. Odlas icke så mycket för blomkåpparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjelkarne, hvilka kunna nyttjas som sparris. Behandlas som blomkål, men behöfver större utrymme.

II. Rotväxter:

Kålrabbi. (*Brassica oleracea caulocarpa*).

glas-, tidiga, hvita Engelska	3	—	5
tidiga, blå Engelska	3	—	5
sen, hvita	—	—	5

Trifvas bäst och blifva smakligast på svula platser. Pl. på 1 å 1 1/2 fots afstånd från hvarandra

Kålrötter, (*Brassica Napus rapifera*).

gula, underjordiska	1	—	3
hvita, underjordiska	80	—	3
Schmalz-, gula, släta	1	—	3
jätte-, rödgråttoppiga, släta, gula	1	—	3
gula, äppleformiga, välsm.	1,40	—	3
stora, långa, hvita Pommerska	1,40	—	3

De gula sorterna, hvilka hos oss vanligen kallas "Rotabaggar" äro mest omtyckta. Planteras 1 1/2 fot ifrån hvarandra, eller utsås mycket tannat i rader och gallras sedan.

Rofvor, (*Brassica Rapa rapifera*).

tidiga, hvita, runda maj	1	—	3
gula maj utm.	1,80	—	4
höst-, Maltheser, fina, gula	2	—	4
Wilhelmsburger-, runda, gula, utm. goda	2	—	4

Pr. th. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Rofvor, höst-, Teltower små, äkta	2,40 — 4
„ höst-, snow ball, hvita, Eng., runda	1,20 — 3
„ „ Bortfelder, långa, gula	1,20 — 3
„ „ pr 100 <i>th.</i> , 115 kr.	
„ „ hvita, långa, rödtoppiga	1 — 3
„ „ runda, rödtoppiga	1,20 — 3
„ öfriga sorter, se foderofvor.	

Med undantag af majrofvän, hvilken utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller straxt efter midsommar. Jorden bör ej till någon af rofsorterna vara nygödslad, utan heldre något mager. De små sorterna böra hafva 3 à 4 tum's afstånd från hvarandra, de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.

Rättikor, (*Raphanus sativus esculentus*).

„ vinter, långa, hvita	80 — 3
„ runda, svarta	1 — 3
„ sommar-, tidiga, svarta	1,40 — 3
„ „ tidiga, hvita	1,40 — 3
„ „ gula Wiener Maj	1,20 — 3
„ höst-, rosenröda	1 — 3

Fordra en något fuktig, lös och lucker, förra året gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 à 5 tum från hvarandra.

Månads-Rädiser, (*Raphanus sativus radícula*).

„ runda, hvita	1,80 — 4
„ röda	1,80 — 4
„ gula	1,80 — 4
„ violetta	1,80 — 4
„ rosenröda med hvita spetsar	2,20 — 4
„ ovala, rosenröda m. hvita rotsp.	2 — 4
„ långa, hvita, fina	1,60 — 4
„ rosenröda, fina	1,60 — 4
„ Dippes karmosinröda till drifning, en utm. fin, god sort	5 — 7
„ alla sorter blandade	1,80 — 4
„ från Madras (<i>Raph. caudatus</i>)	— — 50

à port. 10 öre.
Blifva bäst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädiser utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti. R. caud. har långa, ormlika skidor, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsmakande.

Haferötter, (*T. agopogon porrifolium*).

„ vanliga	2,20 — 4
---------------------	----------

En tvåårig växt hvars frö utsås tidigt på våren. I hösten och lucker, året förrut gödslad jord. Om hösten upptages rötterna och förvaras öfver vintern i källare, uti sand.

Schorzonera, (*Schorzonera hispanica*).

„ vanlig	8 — 10
--------------------	--------

Vid upptagning af såväl schorzonera som haferötter bör man noga äkta sig att rötterna ej på något sätt säras, ty då utvinnet dem i dem befintliga, hvita mjölskaften, hvilket försäkras röta.

Cichoria (*Cichorium intybus*).

„ äkta Magdeburger	2 — 4
„ ny förbättrad, storbladig	2,80 — 5

Rötterna upptagas om hösten och användas som kaff-surrogat. Bladen lemna ett godt foder till mjölkkor. Se vidare under rubr. "Saladväxter".

Morötter, (*Daucus Carota*).

„ vanliga, tidiga Holl. karoter	1,80 — 4
„ Douvikers-, korta, tidiga	1,80 — 4
„ Pariser-, (trés-courtes de Paris).	2,20 — 4

Pr. th. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Morötter, Hornska, tid., långa röda	1,40 — 3
„ violetta, långa, fina att stufva	1 — 3
„ Dippes tidiga, halflånga, röda, utmärkt och god sort	1,40 — 3
„ rent hvita, fina till stufning	1,40 — 3
„ Surrey-, långa, röda, utm.	1,80 — 4
„ Altringhams-, stora, långa, söta, röda, pr 100 <i>th.</i> , 115 kr.	1,20 — 3
„ Braunschweiger-, långa, röda, tidiga, pr 100 <i>th.</i> , 135 kr.	1,40 — 3
„ Belgiska, förbättr. hvita, stora gröntoppiga, pr 100 <i>th.</i> , 95 kr.	1 — 3
„ orangegula, gröntoppiga jätte-, utmärkta, pr 100 <i>th.</i> , 135 kr.	1,40 — 3

Till drifning äro de tre förstnämnda sorterna samt Dippes tidiga bäst passande. De rent hvita och violetta fina sorterna äro såsom stufvade utmärkt välsmakande. Altringhams, de hvita belgiska och orangegula morötterna användas hufvudsakligen till kvestursfoder men äro äfven goda till mat. Morötterna fordra en fet, men ej nygödslad, sandig, lätt och lös jordmån.

Palsternackor, (*Pastinaca sativa*).

„ stora, långa, vanliga	1,20 — 3
„ stora, runda	1,20 — 3
„ från Jersey, långa	1,60 — 4
„ student-, långa	1,80 — 4

Fröet kan äfven med fördel utsås om hösten.

Rotpersilja, (*Petroselinum sativum*).

„ stor, lång, sen	1,20 — 3
„ „ socker, tidig	1,40 — 3

Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan så, att hvarje planta får en kvadratfots utrymme. Bladpersilja, se kryddväxter.

Rotselleri, (*Apium graveolens*).

„ stor, tjock, glatt	2,80 — 5
„ mycket stor Leipziger-, tidig	3,40 — 6
„ Naumburger jätte-, utmärkt	6 — 10

Fröet sås tunnt i en ljun driftbänk och plantorna utsätas, med 1 à 1 1/2 fots afstånd mellan hvarandra, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Utmärkt släta och vackra rötter erhålles, om man i Augusti borttager det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskrår alla sidorötter. Upptagas om hösten och förvaras i källare.

Sockerrötter, (*Sium Sisarum*).

„ vanliga	4 — 6
---------------------	-------

Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, hvilka om våren planteras på 1 fots afstånd från hvarandra. Bör ej förväxlas med schorzonera, som af många kallas sockerrötter.

Rödbetar, (*Beta vulgaris*).

„ Holländska, mörkröda	1 — 3
„ Egyptiska, mörkröda, runda	3,60 — 6
„ Castle Naudry, utmärkta, söta	2,60 — 5
„ White's new, karmosinröda	2,60 — 5
„ Bassano-, runda, ljusröda, fina	1,60 — 4

För hvarje planta lägges 3 à 4 frökorn så, att plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra. Sedan borttagas de svagaste så att endast den starkaste plantan får stå kvar på hvarje ställe. De utgallrade kunna, om man så vill, planteras på en annan plats.

Rapontica eller Rapunzelselleri, (*Oenothera biennis*), stor gul. — — — 6

Utsås i Maj på kalljord. (Vid tidigare sådd

Pr *℔*. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

skjuta de redan första sommaren blomstjekar, hvarstef roten är oduglig. I Oktober upptagas rötterna och öfvervintras i kallare eller skåras de i skifvor och inläggas i ättika eller olja.

III. Knölväxter:

Jordärt-kockor, (*Helianthus tuberosus*), vanliga 30 — —
Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader 6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om hösten upptages hvad man ämnar använda under vintern; de öfriga qvarlemnas på sängen. Växten blifver 6 à 8 fot hög; bör derför sättas så, att den ej hindrar spätrade växter.

Potatis, (*Solanum tuberosum*).
blandade, bästa sorter 10 — — 15
Utsås om våren i en ljum dribbänk. När nattfrosterna upphöra utplanteras plantorna på sängar och behandlas som vanligt. Genom frösädd enhåller man ofta nya och för de lokala förhållandena passande sorter.

Jordmandel, (*Cyperus esculentus*).
vanlig, rötter 2,20 — 4
En gräslig växt, hvars rotknölar sedan nattfrosten upphört utplanteras i god, sandig jordmån, 6 à 8 tum ifrån hvarandra. Jordmandeln har en fin smak och användes dels som kaffesurrogat, dels stekes den och ätes som kastanjer.

Harklöfver, (*Oxalis esculenta*).
vanlig, lökar, pr 100 st. 80 ö. — — — —
Fortpl. genom smålökar, som af växten bildas i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tum mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lökarne förvaras frostfritt och de hvita, tjocka rötterna tillagas som blomkål.

IV. Skidfrukter; Ärter, Bönor, etc.:

Obs! Pr *℔*.
Kr. ö.

Sockerärter, (*Pisum sativum*).
" stora sabel-, pr 100 *℔*. 95 kr. 1 —
" sabel-, med vaxgula skidor 1 —
" grå jätte-, 5 à 6 fot höga 1 —
" De grace eller buxbom-, mycket låga, utmärkta till drifning 2,40
" kryp-, 1 à 1½ fot höga 1 —
" Willmorins skrynkliga mærg-, 2 fot 1 —
Af alla sorterna sockerärter användas hela skidan som mat. De tre första behöfva 3 anar långt ris; de tre sistnämnda, som blifva blott omkring 1 ½ à 2 fot höga, behöfva ej risas.

Spritärter (*Pisum sativum hortense*).
" tidigaste maj-, 2 à 3 fot hög 50
" Kentish invicta, 2 fot, utm. 50
" välsm. och riktbarande 60
" Daniel O'Rourke, 2 à 3 fot 50
" Dicksons first and best, 3 fot 80
" Prince Albert, 2½ fot 40
" tidiga Auvergne-, 4 fot, riktbarande — 45
" biskops-, 1 fot hög, 50
" med långa skidor, 1 f. hög — 50
" Burbridges eclipse-, 2 fot 50
" Caper-, grön, 2½ fot 50
" Charlton-, 4 fot. 35
" Dicksons favorit, låg 45
" Early wonder, utmärkt sort 55

Pr *℔*.
Kr. ö.

Spritärter, tidiga Fairbaird's surprice,
5 fot hög 50
" medeltidiga Laxton's prolific, utm. — 55
" Gold vom Blocksberge, en ny,
sort, utm. riktbarande, smaklig
och varaktig. Motstår dålig väderlek bättre än andra sorter . . . 2,20
" stora sabel-, 4 fot hög 50
" sena gula vax-, utm. 50
" scimitar, 4 fot, utm. 45
" capuziner-grå, 2 à 3 fot höga . . . 60
" hvita (äggärter) 3 à 4 fot höga . . . 60

Mærg-spritärter.
" early green prizetaker, 4 fot hög,
tidig, grön, riktbarande 55
" paradies-, 4 fot, tidig, riktbarande — 45
" Victoria-, 5 fot, riktbarande 60
" Waterloo-, 6 fot, riktbarande 60

Skrynkliga mærg-spritärter.
" British Queen-, 5 fot hög 1 —
" champion of England-, 4 fot 1 —
" Knight's dwarf green-, låg, utm. . . . 1 —
" dwarf white-, låg, utmärkt 1 —
" tall green-, hög, utmärkt 90
" white-, hög, utmärkt 90
" Lord Raglan's-, 2½ fot, god sort . . . 1 —
" M' Leans premier, utm. stor sort . . . 1 —
" ne plus ultra, god sort 1 —
Till drifning användas endast de lägsta och tidigaste sorterna. De skrynkliga mærgärterna utmärka sig genom sin sötna.

Stångbönor, (*Phaseolus vulgaris*).
" stora svärd-, eller Turkiska 80
pr 100 *℔*. 75 kr.
" jätte-, socker-bryt-, grönskaliga utm. — 80
" socker-vax-, med gula skidor 1 —
" vax-bryt-, svarta, mycket mör,
utomordentligt gifvande sort 1,20
" tidigaste socker-bryt-, ny sort tidigast af alla hittills kända stångbönor och utmärkt i alla afeendene . . 1,20
" hvita, fina socker-perl-gifvande 1 —
" Romerska vax-, med gula skidor, ny, utomordentligt gifvande . . . 1 —
" svarta, Romerska vax-perl, riktbd. . . . 1 —
" Alger-, tidiga riktbara. de 90

Krypbönor, (*Phaseolus vulgaris nanus*).
" perl-, hvita, tidiga, fina 60
" svärd-, breda, tidiga, till drifning . . . 60
" allra tidigaste, till drifning 60
" adler-, rödfäckiga, till drifning 60
" gula, tidiga Eng. till drifning 60
" socker-, eller smör-, hvita, tidiga . . . 60
" Ilsenburger-, brokiga, tidiga 50
" Kafferländer-, svartbrokiga 50
" svarta, tidiga neger- 60
" gulbruna, (Callevanser eller Prinsessbönor) . . . pr 100 *℔*. 25 kr. — 30
" tusen för en, hvita, utmärkt sort . . . 40
" tusen för en, gula, utmärkt 60
" flageolet-, röda 60

Pr *th.*
Kr. ö.Pr *th.* Ort.
Kr. ö. Kr. ö.**Rosen- eller Blomsterbönor, (*Phaseolus multiflorus*).**

” svärd-, rödblommade I —
 Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordra någorlunda torr ej nygödslad jord och varmt läge. Till fröen äro svärds-, socker-, isenburger- och adlerbönor tjenligast. Blomsterbönorna användas och behandlas som vanliga turkiska bönor, men deras vackra skarlakansröda blommor göra dem äfven användbara såsom prydnadsväxter.

Wälska eller Bondbönor, (*Vicia Faba vulgaris*).

” ordinära pr 100 *th.* 35 kr. — 40
 ” Windsor-, Engelska, stora, hvita . . . — 80
 ” „ Engelska, stora, gröna — 80
 ” Mazagan-, tidiga — 40
 ” Johnson's wonderful, en af de bästa — 50
 ” Marshall's, låga, riktbarande — 50
 ” cluster-, dverglika, riktbarande . . . — 60
 ” monarch-, med långa skidor — 50
 Trifvas öfverallt och planteras antingen i kanten af andra sängar eller på en särskild plats, 2 å 3 tum djupt och 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra.

Linsor, (*Ervum* eller *Cicer Lens*).

” vanliga, hvita — 40
 Fröet sås i rader med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ tums mellanrum.

Svenskt kaffe eller Astragalkaffe, (*Astragalus boeoticus*).

pr ort 4 öre. 1,60
 Sås om våren på en varm plats i kraftig jordmån, men först bör fröet ligga i vatten ett par dagar, för att mjukna. Då fröet skall uttagas bör man uppnjuka skidorna i varmt vatten, hvarefter kärnorna torkas i ugn och användas som kaffe.

V. Sparrisväxter:Obs.! Pr *th.* Ort.
Kr. ö. Kr. ö.**Sparris, (*Asparagus officinalis*).**

” Darmstädter 1,20 — 3
 ” Grayson's jätte 3 — 5
 ” Connover's Colossal jätte 6 — 8

Fröet utsås höst eller vår, 1 tum djupt i rader med 1 fots mellanrum. Om hösten afskåras stänglarne, hvarefter sängarne betäckas med ett tunnt lager af brunnen gödsel. Då plantorna äro 2 år gamla utsätts de på för dem anordnade sängar. Man brukar äfven att utså fröet direkte på den plats der plantorna framdeles skola stå, hvarigenom omplanteringsarbetet inbesparas och ändamålet vinnas nästan lika snart, som då 2 å 3-åriga plantor utsätts. För sådant ändamål lärges fröet i en eller tvenne rader på sängar med 2 fots mellanrum. På hvarje ställe lägges 4 å 5 frö och sedan bortplockas de öfverflödiga plantorna. Om hösten betäckes mæn sängarne med brunnen gödsel, hvilken om våren försigtigt nednyllas mellan plantorna och så fortfares till dess plantorna hafva ett 8 å 10 tums jordlager öfver sig. På fjerde (stundom på tredje) året efter sängen, kan sparris sköras.

Sparrisarter, (*Lotus tetragon.*) 1 — 3

Ettårig växt: sås i rador; skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.

Matthabarber, (*Rheum*).

” Queen Victoria, å p. 5 öre 10
 ” Prince Albert 6
 ” blandade, goda sorter 4 — 6

Fröet sås på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försigkomna omplanteras de i fet och djup jord i tvenne rader på en 5 fot bred säng. Om hösten nedgräfväs brunnen gödsel mellan plantorna.

Strand- eller Sjökal,

(*Crambe maritima*) — 8
 Fordrar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet lägges i tvenne rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 å 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afskåres bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga af sängen betäckes med brunnen gödsel, som om våren nednyllas mellan plantorna. Under sommaren afbrytas alla blommande skott. Tredje våren, innan plantorna börjat växa, stjelpes tomma krukor, trälådor, gamla bikupor eller dylikt öfver stånden, hvarefter de i mörkert framskjutande, gulgröna skotten afskåras och användas till mat. Skörden fortfar till Juni, då betäckningen borttages.

Bladselleri, (*Apium graveolens var.*)

” hvit och violett — 6
 ” Coles crystal white, hvit 6
 ” „ superb. red., röd, utm. 6
 ” Seymour's white champion 6
 ” red solid, röd, stor 6

Varieteter af rotselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter). Plantorna uppdragas i bank och utplanteras sedan i $\frac{1}{2}$ fots djupa fåror, hvilka allt eftersom bladstjelkarne skjuta i höjden fyllas med den ur fåroräna tagna jorden. När fåroräna äro fyllda börjar man kupa, i Sept. och Oktober kan man aftaga stjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar mycket fet, nygödslad jord.

Kronärtskoekor, (*Cynara Scolymus*).

” Fransyska, stora gröna 8 — 12
 ” Italienska, stora 8 — 12
 ” violetta, stora 10 — 15

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödselad jordmån. Fröet utsås i 2 tums krukor, ett frö i hvarje och krukorna ställas sedan i ljum fröbänk. Sedan plantorna så småningom fått vännas vid den yttre luften, upplanteras de på 2 å 3 fots afstånd ifrån hvarandra. När blomknopparne framkomma bör man blott bibehålla 5 å 6 sådana på hvarje planta, de öfriga aflägsnas. Om vintern betäckas plantorna med näfverhatar, trälådor eller dylikt, hvarpå lägges torrt löf eller myrstack.

Spansk Cardy eller Cardoner,

(*Cynara Cardunculus*) 4,60 — 8
 Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskoekans och planteras sedan med 3 å 4 fots mellanrum i en fåra, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklat sig, sammanbindas de och onödas med hamm, hvarefter jorden nedföres i fåran och kypas kring plantorna, så att blott bladspejlsarne synas. Två eller tre veckor dorefter äro de färdiga för köket.

Sparrisallad, (*Lactuca ang.*) — — 5

För att få tidig skörd utsås fröet i ljum bänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraftig jord. Eljest utsås fröet hvar 11de dag på kalljod. Blomstjelkarne skördas innan blomorna utvecklat sig och anrättas som sparris.

Angelika, (*Angelica Archangelica*) — 8

Denna växt, som förekommer vild i Lappland, är särdeles onyctekt af Lapparne. Man afskäpar det yttre skalet jemte bastfibrerna; allt det öfriga ätes, antingen rått eller stufvadt, tillsammans med Lapsk syra, (*Oxyura digyna*). De

Pr H. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

outvecklade blomknopparna läggas på köttsoppa, som derigenom får en ogenodlig, behaglig smak. Växten är tvåårig och fordrar en fet, lös och fuktig jordmån.

VI. Spinatväxter:

- Spinat**, (*Spinacia glabra & Spinosa*),
" bredbladig, stor med rundt frö — 60 — 3
pr 100 tb. 55 kr.
" " stor med spetsigt frö . . . — 60 — 3
" Sälladbladig (de Gaudry) . . . — 60 — 3
" Savoy-, mycket, stor . . . — 80 — 3
Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och ljökare blifva bladen.

Winter- eller Romersk Spinat, (*Rumex patientia*) 1,80 — 4
Fröet säs i kall bänk eller på kalljord. Plantorna sätas i 4 rader på en 4 fot bred säng. Planterad i lådor och ställd i växthus, kan den skördas hela vintern.

Spansk syra, (*Rumex Acetosa*).
" vanlig 1,40 — 4
" jätte-, från Belleville 2,40 — 4
Varieteter af den hos oss vildt växande arten; behandlas som *Rumex patientia*.

Nyseeländsk Spinat, (*Tetragonia expansa*), vanlig 1,60 — 4
Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.

Molla eller Mell, (*Atriplex hortensis*).
" gul och röd 80 — 3
Behandlas som spinat. Man bör ej låta för många planter bära frö emedan växten lätt kan blifva ett ogräs och dessutom betydligt utsuger jorden.

Quinoa, (*Chenopodium Quinoa*), 1,60 — 4
Odlas som spinat; fröet kan användas som gryn.

Portlak, (*Portulaca oleracea & sativa*).
" gul 3,80 — 6
" grön 1,60 — 4
Utsås i bänk, upplanteras sedan i fet, lös jord med 6 å 8 tum mellanrum.

Isplanta, (*Mesembryanthemum crystallinum*), å pört. 5 öre — 20
Bladen begagnas som spinat. Fröet säs i bänk eller kruka och plantorna sätas på sängar i god, lös jord.

Mangold, (*Beta cicla*).
" flera utm. sorter blandade . . . 1 — 3
Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spinat eller sallad. För vinterbehovet planteras rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.

Phytolacca esculenta 20
Bladen begagnas som spinat. Fröet säs i bänk och plantorna sätas i rader. Växten blifver 5 å 6 fot hög. Rotknölarne kunna öfvervintras om de täckas med löt eller myrstack.

VII. Salladväxter:

Snittsallad, (*Lactuca sativa foliosa praecox*), tidig gul 1,60 — 4
" gul, krusbladig 1,80 — 4
" ny, fin, mosslik 2 — 4
Sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifvit färdiga.

Pr H. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Bindsallad eller Sommar-Endivie, (*Lactuca sativa romana*).

- " Victoria 6
" Parisier 6
" Casseler-, krusbladig 6
" Dunnett's brun jätte-, stor 12
" ny jätte- 12
" imperial Bath, brun 12
" chicon palatine, stor 12
Dessa präktiga salladsorter bildar ej hufvuden, hvarför man brukar sammanbinda ytterbladen, hvarigenom de tre blifva bleka och mjöra. Fordra starkt gödslad jord och böra säs flera gånger under sommaren till in i Augusti.

Hufvudsallad, (*Lactuca sativa capit.*)

- " Asiatisk, stor, gul 3,40 — 5
" Berliner-, stor, gul 3,40 — 5
" steinkopf-, tidig gul, hård 6,80 — 10
" Schwedenkopf-, rödaktig 3,40 — 5
" Haarlemer, brun, stor 3,40 — 5
" Blodfelle, utmärkt, stor 3,40 — 5
" Jätte-Mogul, gul, stor, utm. 3,40 — 5
" Broj-Geel-, utmärkt, tidig 4,60 — 7
" Dippes ny, fast, gul, stor 8 — 12
" Whelers Thom-Thumb-, förträfflig, tidig, liten sort 8 — 12
" non plus ultra-, ny, fin, gul 15
" Perpignaner, äkta, stor 5,20 — 8
en af de allra bästa sorterna; har mycket fasta hufvuden, som hålla sig ovanligt länge.
" All the year round, utm. 15
" bästa sorter blandade 3,40 — 5
Alla salladsorterna fordra fet jord och mycken fuktighet, hvarförutan hufvudena blifva små och osmakliga. Plant. sätas på 10 å 12 tum afstånd ifrån hvarandra. Fröet utsås hvar 14:de dag till slutet af Juli. Till drifning passa Broj-Geel, Steinkopf, mogul och Whelers Thom-Thumb, etc.

Cichoria, (*Cichorium Intybus*).

- " äkta Magdeburger 2 — 4
" ny, förbättrad, storbladig 2,80 — 5
Rötterna intagas om hösten och insläs i sand uti källare eller planteras i trälådor, som ställas bakom hyllorna i ett växthus. Bladen begagnas till sallad. Se öfven under rubrik: Rotväxter.

Endivie, (*Cichorium Endivia*).

- " grön, krusbladig, vinter-, 4
" gul, krusbladig, vinter-, 5
" Casseler- bredbladig 4
" Escariol, stor, bredbladig 4
" fin, krusig, mosslik 6
Utsås i Juni eller Juli. Då plantorna hafva 4 å 6 blad planteras de på en säng med 1 fots mellanrum. När bladen utbildat sig sammanbindas de och blifva efter 14 dagar färdiga att begagnas. Upphängas under vintern på snören i en torr källare. Användas i ulandiet mycket, såväl till soppor, som till sallad.

Krusig Krasse, (*Lepidium sativum*).

- " vanlig, grön 40 — 3
" dubbel eller krusbladig, grön — 60 — 3
För tidig skörd säs fröet tjockt i lådor, som sätas i växthus, boningshus eller stall. Annars säs fröet på kalljord. Trifves hvar som helst.

Skedört, (*Cochlearia officin.*) 8

Säs i rader och bör ej omplanteras. Bladen kunna skördas hela året om.

Pr th. Ori.
Kr. ö. Kr. ö.

Kapuciner- eller Indisk Krasse, (*Tropaeolum majus*) 1,60 — 4
Trifves i all slags god jord. Bör stödjäs med ris, eller planteras vid espalier. Se äfven under rubrik: Kryddväxter.

Åker- eller Vintersallad, (*Valeriana* eller *Fedia Oitoria*) 4
Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten, vintern och våren.

VIII. Kryddväxter:

Anis, (*Pimpinella Anisum*) 1 — 3
Flerårig; säs i rader på skuggigt ställe.

Basilica, (*Ocymum Bacilicum*),
" stor grön 2,20 — 5
Ettårig. Säs i bänk och pl. i Maj på kalljord.

Boretsch eller Gurkört, (*Borago officinalis*), vanlig 1,40 — 3
Ettårig; säs på kalljord. Bladen användbara till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas till prydnad på stektat, karotter m. m.

Citronmeliss, (*Melissa offic.*) 8
Befäctes om vintern; fordrar skugga och god jord.

Coriander, (*Coriandrum sat.*) 60 — 3
Säs på våren i sandig ej fet jordmån.

Bill, (*Anethum graveolens*) 1 — 3
Ettårigt; fortplanter sig ofta sjelf.

Dragon, (*Artemisia Dracunculus*) 25 öre.
Bladen användas vid inläggnig af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Planteras i rader med 12 å 15 tum mellanrum; omplanteras och delas hvarannat år. Befäctes om hösten med gammal gödsel från bankarne.

Fenkol, (*Feniculum officinalis*),
" söt Bologneser 1,20 — 3
Fordrar fet jord och skyddat läge. Fröet säs på kalljord och plantorna sättas sedan i rader, i 3 tum djupa färor, i tot ifrån hvarandra. Täckas om hösten med grannis och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.

Isop, (*Hyssopus officinalis*) 2,60 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar.

Indisk- eller Kapuciner-Krasse, (*Tropaeolum majus*) 1,60 — 4
Se salladväxter. Utrikes begagnas ej blott den s. k. Kra-seknoppen, utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomtopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.

Kummin, (*Carum carvi*) 1 — 3
Utsås på fritt land, omplanteras ej.

Kyndel, (*Satureja hortensis*),
" sommar- 5
" vinter- 12
Behandlas s m kummin-

Kärleksäpple eller Tomates, (*Lycopersicum escul.* eller *Solanum Lycop.*)
" blandade stora sorter 2,60 — 5
" stora, gula, å port. 8 öre 15
" nya, monströsa rosenröda 50
å port. 15 öre.

Den sistnämnda sorten, hvars frukter hafva en fin vinsmak och uppnå en ansenlig storlek, bildar 12 å 20 fot långa rankor, prydda af talrika frukter. Alla sorterna säs i drifbänk och utplanteras när frostsen upphörr på skyddade, varma platser t. ex mot söder belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och nygödslad.

Pr th. Ori.
Kr. ö. Kr. ö.

Qvistarne uppbindas vid espalier och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig. Utmärkta köksväxter.

Körffel, Svensk, (*Anthriscus Cerefolium*) 1 — 3
Ettårig; trifves hvarsomhelst. Fröet utsås flera gånger under sommaren.

Körffel, Spansk, (*Scandix* eller *Myrrhis odorata*) 14 — 20
Flerårig; säs i rader på skuggigt ställe.

Lavendel, (*Lavandula Spica*) 2,60 — 5
En i köksträdgårdar, synnerligen i Sverige, mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras hvar tredje år och sättes dervid så djupt, att endast 2 å 3 tum af grenarne synes ofvan jord.

Malört, (*Artemisia Absinthium*) 5
Fordrar sandjord; kan äfven fortplantas genom delning. Känd medicinväxt.

Malva, krusbladig, (*Malva erispa*) 2,60 — 5
Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad på stektat, m. m.

Mejram, (*Origanum vulgare*) 3 — 5
Fortplantas äfven genom rotledning.

Persilja, blad-, (*Petroselinum sativum*),
" vanlig, slätbladig 1 — 3
" " krusbladig 1 — 3
" plumege-, extra fin 1,20 — 3
" ny Italiensk jätte-, slätblad 1,20 — 3
" Myatt's new garnishing 1,20 — 3
Behandling och användande allmänt bekant.

Pimpinella, (*Poterium sanguisorbium*) 1,80 — 4
Planteras i rader och är ej kinkig med jordmån. De unga bladen begagnas bland sallad.

Rosmarin, (*Rosmarinus offic.*) 12
Odlas i krukor.

Salvia, (*Salvia officinalis*) 2 — 4
Bladen användas såväl till medicin som till matkryddning. Fröet säs på kalljord; fordrar på våra orter skydd mot stång bartrot.

Spansk Peppar, (*Capsicum annum*),
" blandade sorter 6
Uppdragas i krukor under glas. Om hösten mogna frukterna, hvar användande i hushållet är tillräckligt känd. Se äfven sommarblær.

Senap, (*Sinapis*),
" gul Engelsk (*Sinapis alba*) 40 — 3
" brun Eng. (*Sinapis nigra*) 80 — 3

Thimjan, (*Thymus vulgaris*),
" sommar- 5,60 — 8
" vinter- 4,40 — 6
Förträffligt till garnering af köksväxtquarter.

Viuruta, (*Ruta graveolens*) 5
Fröet säs i bänk och sedan planteras plantorna i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses vara magstäkande och ätas sönderhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på såser. De blifva mera aromatiska om de odlas på mager och torr jord.

IX. Lökväxter:

Rödlök, (*Allium Cepa*),
" Holländsk, stor, mörkröd 2 — 4
" " stor, ljusröd 1,80 — 4
" " svavelgul 2,40 — 4
" " fin, hvit, syltlök 4,80 — 7

Pr fl. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Obs. Pr Ort. Port.
Kr. ö. Kr. ö.

- Rödlök, Braunschweiger, stor, mörk. 2 — 4
 „ Madera-, eller jätte-, stor . . . 2,80 — 5
 „ lång, gul, päronformig utm. . . 2 — 4
 Fordrar god, fjolåret gödslad jord och öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter säddeå tillklappas sängen väl. De sorter man önskar små, t. ex. den hvita syltlöken, säs tät, hvaremot de storväxta sorterna säs glezare. Maderalöken säs helst i bänk och utplanteras sedan. Hvarvid rötterna, men ej bladen, något förkortas.

Vinterlöök, (*Allium fistulosum*).

- „ vanlig, hög 4
 Fröet utsås om våren på fritt land och de små lökarna kvarstå ute öfver vintern. Våren derpå kunna de planteras i rader eller som infatningsväxter. Bladen nyttjas tidigt om våren som sursoget för annan löök. Borde användas mera än som sker.

Schallott- eller Eschallottlöök, (*Allium Ascalonicum*)

- „ vanlig svensk, lökar 75 — —
 Denna lökart, som för sin mildare smak af många föredragas framför alla andra löksorter, forplantas genom smålökar, hvilka om våren utplanteras i god, fet, men ej nygödslad jord. Upptagas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.

- Hvitlöök, (*Allium sativum*) lökar . . . 75 — —**
 Trifves hvar som helst, men blifver bäst i en varm, sandblandad jordmån. Bi dar sällan frö, men forplantas läti genom smålökar. Omplanteras hvarannat år.

- Gräslök, (*Allium Schoenoprasum*) . . . pr torva 25 öre. — — — —**

- Potatislöök, (*Allium Ascalonicum variegatum*), lökar 75 — —**

Behandlas och användes som Schallottlöök.

- Purjolök, (*Allium porrum*).**

- „ vanlig vinter-, stor, tjock . . . 2,60 — 5
 „ „ sommar- tjock 2 — 4
 „ Brabanter-, vinter, mycket stor 3,20 — 5
 „ jätte eller monströs vinter . . . 5 — 7
 „ gul sommar- från Poitou, stor . . . 10
 Säs om våren i halfvarm bänk och utplanteras sedan, (något öjupare än de uppkomna plantorna stått i bänken) i rader, 8 å 10 tum ifrån hvarandra, hvarvid både rötter och blad något förkortas. Fordrar nygödslad jord.

X. Gurkartade växter:

Gurkor, (*Cucumis sativus*).

A. För fritt land:

- „ Holländska, gröna druf eller s. k. Westeråsgurkor 4 — 6
 „ stora, långa, gröna, rikt. 8 — 12
 „ Athener-, långa gröna, utm. 12 — 15
 „ å p. 10 ö.
 „ långa, gröna slang-, å p. 10 ö. 10 — 15
 „ Chin. gr na slang-, å p. 10 ö. 10 — 15
 „ Ryska, små gröna, utm. 5 — 8
 „ långa hvita slang-, å p. 10 ö. 10 — 15
 „ Holländska, hvita, långa tidiga 8 — 12

B. För drifning: Pr Ort. Port.

- „ non plus ultra, gröna 40 — 15
 „ „ „ hvita 50 — 15
 „ Dessa gurkor blifva öfver i åln långa.
 „ Arnstädter, snöhvita jätte-, extra 2,50 — 25

- Gurkor, Arostädter, ljusgröna jätte 1,50 — 15

- „ Rhum von Quedlingburg, nya snöhvita jätte 2,50 — 25
 „ „ von Erfurt, hvita 2,50 — 25
 „ Frukterna 2 fot långa, snöhvita,
 „ „ von Erfurt, gröna 1,50 — 15
 „ Sillig's hvita, utmärkta 1 — 15
 „ Brasilianska, hvitgröna, långa 1 — 15
 „ alla tidigaste, riktbarande, utm. — 80 — 15
 „ Cuthill's blaespine, god sort. — 75 — 15
 „ emperor of Manchester. — 75 — 15
 „ Gladiator, god sort — 50 — 15
 „ Glory of London, utmärkta — 80 — 15
 „ Man of Kent, utmärkta — 60 — 15
 „ Patrik, god sort — 75 — 15
 „ Race horse, omtyckta — 80 — 15
 „ En ständigt bärande sort; kan med fördel kultiveras i kruka.
 „ Snow's Horticultural, goda — 80 — 15
 „ Walker's Traveller, goda — 80 — 15
 „ Victory of Bath, utmärkta — 80 — 15
 „ semperfructifera, ständ. bärande 1 — 15
 „ blandade goda sorter t. drifn. 1 — 15
 „ 12 sorter Drifgurkor, vårt val kr. 1,50.
 Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraftig, men framför allt lucker jordmån. Öbrunnen gödsel bör ej nyttjas emedan frukterna deraf få en bitter smak.

Ormgurkor, (*Trichosanthes*).

- „ anguinea — 25 — 10
 „ colubrina vera — 50 — 10
 Böra odlas i drifbänk; ha ofantligt långa, m. av frukter, hvilka kunna användas som gurkor.

Meloner, (*Cucumis Melo*).

- „ socker- — 50 — 10
 „ från Texas — 10 — 10
 „ Nutmeg-, riktbarande, välsm. — 50 — 10
 „ Japanska, hvita — 60 — 10
 „ tidiga, Amerikanska 1 — 10
 „ ananas- — 50 — 10
 „ Beechwood- — 10 — 10
 „ Chito- från Havanna 1 — 10
 „ Erfurter Preis- — 10 — 10
 „ nät-, gula, stora — 80 — 10
 „ „ tidiga, runda, riktbarande 1,25 — 10
 „ Queen Victoria 1,25 — 10
 „ Fransyska frilands- — 20 — 10
 „ blandade sorter — 40 — 10
 „ 12 sorter Meloner 1 kr.; 6 dio 50 ö.

Cantalouper, (*Cucumis Melo var.*)

- „ Portugisiska — 10
 „ gula Orange — 10
 „ Malta d'hiver- — 10
 „ Prescot de Paris- — 10
 „ Algier- — 10
 „ blandade sorter — 40 — 10

Vattenmeloner, (*Cucis citrullifolium*)

- „ blandade sorter — 10
 Skillnaden mellan meloner och cantalouper är den, att melonerna hafva en nättlik teckning på skalet, vanligtvis aflång form samt, såsom mogna, ljusgul färg och en ganska stark melonlukt, hvarom cantalooperna hafva ett tjockt, med vårtor besatt skal, mycket varierande form, än oval, än rund, lång, plåtrund o. s. v. samt ananaslik lukt.

Pr Ort Port.
Kr. ö. Kr. ö.

Cantaloupen bliver 2 å 3 dagar efter mognaden mjölig; melonen vid samma tid vattenaktig. Vattmelonerna blifva ofta mycket stora och frukter af dem, vägande 20 *ll.*, äro ej sällsynta.

Pumpor; Gräskar eller Kurbits,
(*Cucurbita Pepo*).

A. Ätbara eller Matpumpor:

Wäxtmärg Vegetable marrow, (<i>Cucurbita ovifera</i>)	— 15	— 10
Gorge goufrée	— 40	— 10
Valparaiso, gröna	— 40	— 10
” ” mörkröda	— 40	— 10
” ” grönstrimmiga	— 40	— 10
” ” gula, strimmiga	— 40	— 10
” ” rosenfärgade, strimmiga	— 40	— 10
” stora, gula jätte-melon-	— 40	— 10
” ” gröna jätte-melon-	— 40	— 10
” ” röda jätte-melon-	— 40	— 10
” ” hvita jätte-melon-	— 40	— 10
” blandade, sorter, mat-	— 20	— 10

**B. Prydnadspumpor; Gräskar
eller Figurkurbits:**

Angurie, med brokiga blad (<i>Cucurbita melanoearpa</i>)	— 30	— 10
centner-	— 30	— 10
flask-	— 25	— 10
Herkulesklubba	— 25	— 10
Biskopsmössa gul	— 40	— 10
” ” hvit	— 40	— 10
” ” grönstrimmig	— 40	— 10
turban-, stora, röda	— 30	— 10
turban-, st. gröna med rödt	— 30	— 10
apelsin-	— 40	— 10
pomerans-	— 40	— 10

Pr Ort Port.
Kr. ö. Kr. ö.

Pumpor, flera andra sorter	— 30	— 10
” blandade prydnads-, pr <i>ll.</i> 6 kr.	— 10	— 5
6 sorter ätbara pumpor ”	— 50	
12 ” Figurkurbits, ”	— 1	—
6 ” ” ” ”	— 50	

Alla sorter pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utså fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klimp å för dem bestämda ställen.

XI. Ätliga Svampar:

Champignon, (*Agaricus campestris*).

” bästa qualità thallus i tegel-
” stenformiga stycken, pr *ll.* 1 kr. — — — —

Champignonerna kunna drifvas antingen i der- till särskildt inrättade hus, eller i lådor under hyllorna till växthus, der man kan hafva + 15 å 18° C. eller ock i häststall, der vanligen den nämnda temperaturgraden är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersökes temperaturgraden i ströet och om densamma är + 20 å 25° så täckes ströet med thallus. Vill man använda groddstenar (tegelstenformiga klumpar af hästgödsel, ko- eller färgödsel samt löfjord och genomväfda af thallus) så sönderbrytas dessa i 2 å 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar thallus förgrena sig, då det hela täckes med 2 å 3 tum lös och lätt jord, som helt saktas nedplockas, hvarefter locken ej mera påläggas. Efter 4 å 5 veckor framkomna champignoner fortfarande under omkring 3 månader. När de skördas, utsieckas de temligen djupt. Om jorden torkar så öfversprutas den något. Temperaturen hålles beständigt mellan + 15 å 18°. Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

B. Frö till Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter:

Till Hrr Landtbrukares synnerliga uppmärksamhet!

Priserna å alla ekonomifrö äro ej fullt bestämda, men noteras efter dagens pris här på platsen. De säljas blott pr kontant, utan rabatt.

Från och med 25 *ll.* säljes efter 100 *ll.*-priset.

Pr 100 *ll.* Pr *ll.*
Kr. ö. Kr. ö.

Pr 100 *ll.* Pr *ll.*
Kr. ö. Kr. ö.

I. Gräsväxter:

Agrostis capillaris, Hårhven 70 — — 75
” stolonifera, Kryphven eller Fioringräs 70 — — 75
Hvensorterna växa nästan hvar som helst, men blifva yfvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blifva de småväxta och tviviga. Särdeles omtyckta fodergräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.
Aira cæspitosa, Tuftätel 45 — — 50
” flexuosa, Krustätel 45 — — 50
Tuftäteln är att rekommendera endast för fuktig mark, hvaremot krustäteln passar för torra lägen.
Alopecurus pratensis, Ang- haffe 195 — — 2 —

Värderas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera än timotej. Blifver kraftigast i god, mullrik och något fuktig jord. Kann äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Anthoxanthum odoratum,

Vårbrädd, välluktande — — 1 —
Ett tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter. Ingår i blandningen för finare gräsplaner.

Avena elatior, Knölhafre 65 — — 70

” flavescens, Gulhafre 40 — — 45

” pubescens, Luddhafre — — 80

Knölhafren är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej alltför fuktig sandjord. Gulhafren lämpar sig för hvarje jordmån, som ej är alltför torr; kan ingå i

Pr 100 ö. Pr ö.

Kr. ö. Kr. ö.

blandningar till större gräsplaner. Luddhafren trives i torr jordmån och är ett ganska godt fodergräs.

Bromus mollis, Mjuklost . . . 35 — — 40

„ *pratensis, Anglost* . . . 70 — — 75

Mjuklostan trives både i torr och fuktig jord och är ett mycket beaktningsvärdt fodergräs.

Cynosurus cristatus Kamexing — 1,80

Bildar om det ofta afmejas täta och vackra torvor, hvarför det bör ingå i hvarje blandning till trädgårdsplaner. Trives äfven på torr mark.

Dactylis glomerata, Hundex 120 — 1,25

Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trives på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.

Elymus arenarius Strandhafre — 1,75

En af de bästa växter för bindande af flygsand. Ätes af kreaturen endast såsom omoget.

Festuca duriuscula, Hårdsving 65 — — 70

„ *elator, (pratensis) Ångsvingel* 95 — 1 —

„ *ovina, Fårsvingel* 65 — — 70

„ *rubra, Rårdsvingel* 65 — — 70

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård-, får- och rårdsvingel lemnas på torr och mager jord, der knappt något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ångsvingeln är ett af de bästa gräs för ångar och dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar.

Holcus lanatus, Luddtätel . 25 — — 30

Trives i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräsen.

Lolium perenne, Eng-Raygräs 30 — — 35

„ *perenne tenue, Pacey's Raygr.* 35 — — 40

„ *italicum, Italienskt Raygr.* 35 — — 40

I fröblandningen till gräsplaner i trädgårdar utgör som bekant raygräs oftast huvudbeståndsdelen. Ingen annan gräsart är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarför det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3, 4, t. o. m. 5 gånger årligen. Är ej synnerligt noga på jordmån, blott den ej är för våt.

Melica (Molinia) coerulea . . . — — 40

Fodergräs för mossbotten och fuktig sand; blandas med andra grässlager.

Milium effusum, Amur- eller

Luktgräs — — 1,80

Ett 3 å 4 fot högt, bredbladigt, vålluktande gräs, som kan odlas öfverallt, der täta trädkronor beskydda marken o. hindra andra gräsarter att växa.

Phalaris canar., Kanariefrö 60 — — 65

Kanariefröet nyttjas till föda åt småföglar.

Phleum pratense, Timotej . . . dagens pris.

Timotejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar, men bör då ej tillsättas blandningen utan sås särskildt.

Poa annua Hvitgrö — — 90

„ *aquatica, (Glyceria spectabilis)*

Fättegrö eller *Vattengrö* . . . — 1 —

„ *nemoralis Lundgrö* — 1 —

„ *pratensis, Slotter-; Ånggrö* 85 — — 90

„ *trivialis Betesgrö* 85 — — 90

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen; ångs- eller slottergrö t. o. m. till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och ingå i myckenhet i blandningarna. Lundgrö är mycket användbar på trädbevuxta,

Pr 100 ö. Pr ö.

Kr. ö. Kr. ö.

skuggiga platser. Jätte- eller vattengrö växer i sött vatten och måste afmejas före blomningen. Hvitgrö lemnar ett utmärkt färbete.

Blandning af de nyttigaste och bästa fodergräs, för besäning af ångar, dels med

torr och dels med våt jord-

mån, 1:ma qualité 45 — — 50

„ **af finare gräsarter, för besä-**

ning af gräsplaner i trädgårdar

och parker, passande för hvarje

ej alltför dålig jordmån. . . . 50 — — 55

„ **af finaste gräsarter, för besä-**

ning af smärre planer, med myc-

ket fin, god jordmån — — 80

II. Klöfverväxter:

Klöfver, Holländsk, röd, lma

(*Trifolium pratensis*) . . . dagens pris.

„ **Schlesisk, röd, lma** ” ”

„ **hvit, lma, (Trifol. repens)** ” ”

„ **Aisike-; Svensk, (Tr. hybrid.)** ” ”

Aisikeklövern föredrages mågenstades i utlandet för dess högre fodervärde och dess förmåga att äfven på ganska dålig jord, der man af den vanliga klövern ej har mycket att vänta, gifva god skörd. Trives väl tillsammans med timotej.

Inkarnatklöfver, (Tr. inc.) 65 — — 70

En etårig art, hvaraf utsås ungef. 24 å 26 skålp. på tunnlandet. Utrikes begagnas den mycket tillsammans med Italienskt raygräs och lemnar då både tidiga och rika gräskördar. Den användes äfven till igensänning af under vintern uppkomna luckor i de andra klöfverfälten,

Räfflor, (Anthyllis vulner.) — — 2 —

Bland de växter som på senare tiden blifvit använda till foder, intager Anthyllis ett utmärkt rum. Den håller tillgodt med den magraste jord och motstår den starkaste torra. På torr och mager mark utsås den jemte fårsvingel och gifver ett godt, riktigt färbete.

Blå-Luzern, (Medicago sat.) — — 1,40

Sand-Luzern, (Medic. media) — — 2 —

Humleklöf., (Med. lupulina) 35 — — 40

Blåluzern har långa, starka, krypande rötter och anses för en god foderväxt. På sandjord gifver sandluzern årligen en stundom två, rätt goda skördar och på något bättre jord öfverträffar den blåluzern. Humleluzern emotstår torra, lemnar godt färbete och användes i trädgårdar att besätta torra slutningar o. s. v.

Bokharaklöfver, (Melilo-

tus albus altissimus — — 1,60

Bokharaklöfver kan på någorlunda god jord skördas grön, 3, 4 å 5 gånger under sommaren och hösten. Den bör ej få växa mera än 1 fot högt, emedan den eljest blifver grof och tråaktig.

Honungsklöfver, (Melilo-

tus coeruleus) blå — — 1,60

Honungsklöfvern är något mindre än föreg., men väl förtjent att uppmärksammas; dess blommor äro mycket eftersökta af bien. Den blå användes vid beredning af den s. k. aptisosten.

Esparsette, (Onobrychis eller

Hedysarum sativum). 30 — — 35

Växer egentligen på kalkmark och är äfven på

dålig mark en god foderväxt.

Gigelsårter eller Käring-

tänder (Lotus corniculatus) — — 2 —

I förening med andra klöfverväxter lemnar den

na art ett godt foder för mjölkkor.

Pr 100 *tt.* Pr *tt.*
Kr. ö. Kr. ö.

Pr 100 *tt.* Pr *tt.*
Kr. ö. Kr. ö.

III. Diverse foderväxter:

Foderrofvor eller Turnips,

" White globe, (hvita runda)	60	—	65
" Pomeranian white globe, Pom- merska, hvita runda)	60	—	65
" White Norfolk, hvita	60	—	65
" Autumn stuble, (Höststubb-)	70	—	75
" Red globe, (Röda, runda)	60	—	65
" Skirwings förbättr, rödtoppiga	65	—	70
" Purple top yellow Bullock (Gu- la, rödtoppiga)	65	—	70
" Border imperial, gula, rödtopp	70	—	75
" Tweddale's förbättrade, rödtop- piga, gula	70	—	75
" Green top yellow Bullock, (Gu- la, gröntoppiga)	65	—	70
" Aberdeen green top yellow, (Gula, gröntoppiga)	65	—	70
" Hoods imperial, gula, grönt	—	—	90
" Dales hybrid, grön gula	65	—	70
" Red top white tankard, (Lån- ga, hvita, rödtoppiga)	70	—	75
" Green top yellow tankard, (Långa, gula, gröntoppiga)	75	—	80
" Bortfelder, långa, gula, utm.	115	—	1,20
" Höst-, långa, hvita, rödtopp	95	—	1 —
" " runda, hvita, rödtopp	115	—	1,20

Fröet till ofvannämnda rfsorter införskaffes från Skottland, hvarst edlingen af foderrofvor bedrifves i stor skala. Deras värde som foder- växter är så allmänt bekant, att det är onödigt att här yttra något vidare derom. Se äfven ann. under Rotväxter bland köksväxterna.

Kålrötter, Rotbagga eller Svensk Turnips,

" Purple top yellow swedish, (Gula, rödtoppiga)	70	—	75
" Skirwing's förb., rödtoppiga	70	—	75
" Laing's förb., röda, gröntopp	85	—	90
" Green top yellow, gula, grönt	70	—	75
" rödgråtoppiga, slåta, jätte-, gula	95	—	1 —

Dessa sorter ses 3 å 4 veckor tidigare än rof- vorna. Plantor, uppdragna i kallbänk eller på passande ställe å kalljord, begagnas till efter- plantering å de ställen i turnipsälten, hvarst luckor uppstått genom loppmaskens härjuingar eller af andra orsaker. Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita turnipsorterna, hvar- efter tages de röd- och gröntoppiga samt till sist rotbagga. Derför är det angeläget att odla flera sorter, så att man ej nödgas att för hastigt uppfordra föräddt.

Fodermorötter,

" Altringham, stora, röda.	115	—	1,20
" Belgiska, hvita, gröntoppiga, jätte-, förbättrade	95	—	1 —
" orangegula, gröntopp., jätte-	135	—	1,40
" mörkröda, Braunschweiger	135	—	1,40

Dessa morötters värde såsom foderväxter är all- mänt erkändt. Synnerligen äro de hvita jätte- morötterna utmärkta för dess rika afkastning. Alla moroteorter fordra en djukt arbetad jord och måste, i motsats till turnipsen, utsås så ti- digt som möjligt.

Foderpalsternackor,

" långa, stora, tjocka	—	—	1,20
" runda, stora	—	—	1,20

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lenna, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor. Utsås omkr. 18 skålp. på tunnlandet och behandlas för öfrigt som morötter.

Foderbetor eller Runkelrofvor,

" långa, röda	70	—	75
" gula	75	—	80
" " runda, röda	80	—	85
" " gula	80	—	85
" Dippe's röda Riesen-Pfal-	80	—	85
" gula Riesen-Pfal-	80	—	85

Begagnas isynnerhet gerna till foder å mjölk- kor, emedan mjölken ej deraf får den sträfvä smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användes. De sistnämnda båda sorterna lenna den rikaste afkastningen.

Socketbetor,

" äkta, hvita, vanliga	35	—	40
" hvita, imperial-	40	—	45
" Vilmorin's nya, förbättrade	75	—	80

Böra ej ses för sent; ej heller i nygödslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lermylla. För närvarande anses Vilmorins vara de bästa.

Foderkål,

" Jätte-, blå, 6 å 8 fot hög	—	—	4 —
" äkta träd- eller ko-, grön	—	—	1,60

Båda sorterna förträffliga till kreatursfoder.

Seradella, (Ornithopus sativ.) 40 — — 45

Anses som foderväxt lika god som rödklöfver. Gifver stor afkastning, äfven på lätt jord. På mycket torr sandmark, och tung lerjord trives den mindre väl. Utsås omkring 30 å 35 skålp. på tunnlandet.

Spergel, (Spergula).

" vanlig, (Sp. arvensis sativa) 75 ⁸⁰ — 80 ⁸⁵			
" stor, (Sperg. arvens. maxima) 80 ⁸⁵ — 85 ⁹⁰			

Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngöding, hotörk- ning och färbete. Den kan utsås, 15 å 20 skålp. på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra gräsfoderväxter. jorden harpas väl före sådden.

Majs, (Zea).

" brun Badensisk	40	—	45
" Amerikansk hästtand	45	—	50
" gul Badensisk	45	—	50

Alla sorterna till grönfoder.

IV. Frö till Fogelfoder:

Hampfrö , till småfoglar	30	—	35
Hirs	35	—	40
Kanariefrö	60	—	65
Roffrö	45	—	50
Salladfrö till småfoglar	—	—	2 —
Majs , till papegojor	40	—	45

V. Diverse Ekonomi- växter:

Bohvede , (Polygonum Fago- pyrum) pr kub.-fot 6 kr.	—	25	—
Hampa , (Cannabis sativa.)	—	35	—

Pr *tt.* Ort.

	Pr \mathcal{L} . Ort. Kr. ö. Kr. ö.		Pr \mathcal{L} . Ort. Kr. ö. Kr. ö.
Hampa chinesisk jätte- (<i>Cannabis sativa gigantea</i>) à p. 5 ö.	— — — 10	Tobak stor Portorico	6 — — 8
„ Piemontesisk jätte-, (<i>Cannabis sativa var.</i>)	— — — 15	„ „ Turkisk	6 — — 8
Lupiner , (<i>Lupinus</i>)		„ Amersforter, utmärkt	4 — — 6
„ hvita, (<i>Lupinus albus</i>)	30 — 3	„ storbladig, jätte-, (<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i>) à p. 5 ö.	— — — 10
„ blå, (<i>Lupinus angustifolius</i>)	30 — 3	Tobaken fordrar lätt sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppfiskas med gammal gödsel.	
„ gula, (<i>Lupinus luteus</i>)	30 — 3	Wallmo , (<i>Papaver somniferum</i> .)	
Lupinernas värde i landbruket har under de senare åren blifvit allmänt erkändt.		„ hvitblommande med blått frö	— 80 — 3
Senap , (<i>Sinapis</i>)		„ rödblommande med hvitt frö	— — — 3
„ Engelsk, gul (<i>Sinapis alba</i>)	40 — 3	„ och tillslutna fröhus	1 — — 3
pr 100 \mathcal{L} . 35 kr.		„ Jätte-, med hvitt frö, (<i>Papaver somniferum giganteum</i>)	1,60 — 4
„ Eng. brun (<i>Sinapis nigra</i>)	80 — 3	„ Opie-, (<i>Pap. somn. opififerum</i>)	3 — — 6
Solros , (<i>Helianthus annuus</i>)		Vallmo odias på många ställen utrikes i stora skala för vinnande af olja, hvilken påstås vara fullt ut så god som den bästa italienska olivoija.	
„ vanlig	80 — 3	Äpple , (<i>Pyrus Malus</i>)	1,80 — 4
„ ny, ovanligt stort frö, (<i>H. annuus macrospermus præcox</i>)	— — — 10	Päron , (<i>Pyrus communis</i>)	4,60 — 8
Fröt af solrosen gifver en utmärkt god matolja.		Plommon , (<i>Prunus domest.</i>)	50 — 3
Tobak , (<i>Nicotiana Tobacum</i> .)		Körsbär , (<i>Prunus Cerasus</i>)	1 — — 3
„ äkta Cuba-, bäst till odling	6 — — 8		
„ stor Havana	6 — — 8		

C. Frö till Blomster- och Bladväxter.

För att lätta mödan för ärade requirenter, hafva vi anordnat blomsterförteckningen, med undantag af "Modeblommor", i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvars ordningsföljd finnes angifven öfverst på hvarje sida.

Vid requisition är det bäst att angifva numren å de frösorter som önskas. Om requisitionen uppgöres efter annan, än den för året gällande katalogen, så torde detta benäget omdimmas, emedan numren omvexla hvarje år.

Portionerna af de finkorniga frösorterna äro tillräckligt stora för vanligt behof; hufvudportioner säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljas äfven efter vigt; dock ej mindre än helt ort. Sortimentpriserna gälla blott då urvalet af sorter uteslutande anförtros åt oss.

I. Modeblommor eller Sortimentblommor:

Aster:

Callistephus chinensis; *Callistemma hortensis*; *Aster chinensis*.
(Asteroides.)

Allt vårt asterfrö är af utmärktaste beskaffenhet, blott af fullkomliga blommor.

Fröt utsås i April på en ljum (icke varm) drifbänk och betäckes föga, hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tum afstånd ifrån hvarandra. I slutet af Maj utplanteras de på kall jord i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligen uppblandad jord. Alla Asteisorterna bilda stora rotklimpar, hvarfor man lätt kan upptaga och flytta dem, äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttningen iakttaga att dertill välja en mulen dag, eller hålla plantorna beszungade tills några dagar efter omplanteringen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar.

I följande färger:

à p. 5 öre, pr ort 30 öre.

1. hvit.
2. gulaktigt hvit.
3. hvit med rödt.
4. carmosinröd.
5. mörk carmosinröd.
6. mörk carmosinröd m. hvitt
7. rosenfärgad.
8. violett.
9. violett med hvitt.
10. himmelsblå med hvitt.
11. mörkblå.
12. persikoblomfärgad.

Alla 12 sorterna 50 öre.

6 sorter 25 öre.

13. blandade färger, à p. 5 ö. pr ort 25 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig från blomornas runda form.

I följande färger:

à p. 5 öre, pr ort 40 öre.

14. hvit.
15. carmosin.
16. mörk carmosinröd.
17. ljus carmin.
18. carmosin med hvitt.
19. ljusröd.
20. rosa med hvitt.
21. mörkrosa, hvitstrimmig.
22. köttfärgad.
23. mörkblå.
24. mörkblå med hvitt.
25. ljusviolett.
26. mörkviolett.
27. mörkblå.
28. äppleblomfärgad.

Alla 15 sorterna 65 öre.

- 12 sorter 50 öre.
6 sorter 25 öre.
29. blandade färger, å p. 5 ö.
pr ort 35 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga välfyllda blommor.

I följande färger:

- å p. 8 öre, pr ort 75 öre.
30. rent hvit.
31. blek svafvelgul.
32. carmosin.
33. mörk carmosin.
34. lysande carmosin m. hvitt.
35. carmin.
36. mörkröd med hvitt.
37. mörk rosa med hvitt.
38. ljus azurblå.
39. svartblå.
40. mörk lila med hvitt.
41. brun violett.
42. persikoblomfärgad.
43. äppleblomfärgad.

Alla 14 sorterna 1 kr.

- 6 sorter 45 öre.
44. blandade färger, å p. 8 ö.
pr ort 60 öre.

Fransysk Pion-Aster.

Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, väl fyllda blommor af fulländad form samt förmåga att motstå mindre tjenlig väderlek äro egenskaper, som hafva gjort denna astervarietett allmänt omtyckt.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25.
45. hvit.
46. hvit, klotrund.
47. hvit med mörk-carmosinrött centrum.
48. hvit med mörkrött.
49. hvit med rosa.
50. hvit med svartblått.
51. carmosin.
52. eldig carmosin.
53. mörk carmosin.
54. mörk carmosin med hvitt.
55. victoria (eldröd) m. hvitt.
56. liflig rosa
57. mörkrosa med hvitt.
58. mörkröd med hvitt.
59. mörkaste röd.
60. svartblå.
61. svartblå med hvitt.
62. ljusblå med hvitt.
63. äppleblomfärgad.
64. La superbe, rosenröd.

Alla 20 sorterna kr. 1,90

- 12 sorter " 1,10
6 " " — 55
65 blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort 1 kr.

Uhlands Pion-Klot-Aster.

Utmärker sig för kraftig växt och stora, utm. väl formade blommor. Särdeles utm. för grupper.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25
66. snövit.
67. carmosin.
68. carmosin med hvitt.
69. mörk carmosin med hvitt.
70. rosa med hvitt.
71. ljusblå.
72. briljant lila.
Alla 7 sorterna 60 öre.
73. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort 1 kr.

Rosen-Aster.

Oaktadt denna nyare asterform uppnår nära 2 fots höjd, växer den dock så kraftigt och blifver så stark, att den på nägorlunda lugna platser ej behöfver stödjars eller uppbindas. Hvarje stånd frambringar ett ovanligt stort antal stora och väl fyllda blommor. Man kan således med skäl påstå denna sort vara en af de allrabästa, nu odlade asterformer. Se afbildningen i föregående katalog.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25
74. hvit.
75. hvit med rosa.
76. hvit med mörklila.
77. mörk carmin.
78. mörk carmosin m. hvitt.
79. liflig rosa med hvitt.
80. ljusblå.
81. lazurbå.
82. mörkblå.
83. purpurviolett med hvitt.
Alla 10 sorterna, 90 öre.
84. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort 1 kr.

Äkta Victoria-Aster.

Betydligt lägre än förestående, men mera utmärkt för blomsterrikedom och blommornas ovanliga skönhet, hvarföre äfven denna sort lämnas till de allrabästa astrarne. Plant. böra hafva stort utrymme. Lemna föga frö.

I följande färger:

- å p. 30 ö., pr ort 4 kr.
85. hvit.
86. carmosin.
87. carmosin med hvitt.
88. carminrosa.
89. hortensiaröd.
90. rent mörkblå.
91. rent ljusblå.
92. mörkblå med hvitt.
93. lila rosa.
94. persikoblomfärgad.
Alla 10 sorterna kr. 2,75
95. blandade färger, å p. 25 ö.
pr ort kr. 3,25

Låg Victoria-Aster.

En dvergartad, 7 å 9 tum hög form af föregående. Har talrika, utmärkt väl ryllda, präktiga blmr.

I följande färger:

- å p. 30 öre, pr ort 4 kr.
96. snöhvitt.
97. carminrosa.
98. ljusblå.
99. mörkblå.
100. röd lila.
Alla 5 sorterna kr. 1,25
101. blandade färger, å p. 25 ö.
pr ort kr. 3,25

Kejsar Wilhelms-Aster.

Denna nya astersort utmärker sig för väl fyllda, sköna, dels pion- och dels rosformiga blommor af kolossal storlek. Växtsättet är kraftigt och plantorna, som mycket förgrena sig, blifva omkr. 1 fot höga.

I följande färger:

- å p. 30 ö., pr ort 4 kr.
102. hvit.
103. carminrosa.
104. carminrosa med hvitt.
105. mörkblå.
106. mörkblå med hvitt.
107. mörkviolett, med hvitt.
Alla 6 sorterna, kr. 1,60
108. blandade färger, å p. 25 ö.
pr ort 3 kr.

Schiller-Aster.

En utmärkt vacker bukett-aster.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25
109. hvit.
110. mörk carmin.
111. mörk carmin med hvitt.

Dverg-Turban-Aster.

En egendomlig astervarietett med svatgrönt bladverk; passar förtäfligt till markerade infattningar å p. 10 öre, pr ort kr. 1,25
112. mörkröd med hvitt.

Dverg-Bukett-Aster.

Vacker, rikblommig och väl passande till inf. af högre astrar.

I följande färger:

- å p. 12 öre, pr ort kr. 1,75
113. rent hvit.
114. hvit med rött centrum.
115. hvit med mörkblått.
116. carmin.
117. carmin med hvitt.
118. mörk carmin med hvitt.
119. rosa med hvitt.
120. mörkviolett med hvitt.

Alla 8 sorterna 90 öre.

121. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort kr. 1,50

Dverg-Bukett-Pyramid-Aster.
Pyramidformigt växtsätt; iofrigt som föregående.

I följande färger:

- å p. 15 ö., pr ort 2 kr.
122. hvit.
123. hvit med rosa.
124. carmosin.
125. carmin med hvitt.
126. rosenröd.

127. blodröd.
128. mörkblå.
129. ljusblå.
Alla 8 sorterna, kr. 1,05
130. bland:e färger, å p. 12 ö.
pr ort kr. 1,75

Dverg-Pyramid-Aster.

Omkring 1 fot hög; mycket grenig och riktblommande. Blommorna klotformiga, starkt fyllda.

131. bland:e färger, å p. 10 ö.
pr ort i kr.

Kokard-Aster.

En vacker och intressant form. Blommorna, som äro särdeles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita i midten, hvarföre de se ganska egendomliga ut.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort i kr.
132. carmosin med hvitt.
133. mörkröd med hvitt.
134. rosa med hvitt.
135. rödaktig lila med hvitt.
136. ljusblå med hvitt.
137. mörkblå med hvitt.
138. brunviolett med hvitt.

Alla 7 sorterna, 65 öre.

139. bland:e färger, å p. 10 ö.
pr ort. 80 öre.

Igel- eller Nål-Aster.

Äfven en intressant varietet. Alla blombladen äro sammanrullade och bilda smala, stråltormigt ställda rör.

I följande färger:

- å p. 12 ö., pr ort kr. 1,50
140. hvit.
141. mörkröd.
142. rosenröd.
143. ljusblå.
144. mörkblå.

Alla 5 sorterna 55 öre.

145. bland:e färger, å p. 10 ö.
pr ort kr. 1,25

Hög, storblommig**Chrysanthemum-Aster.**

Har stora vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa aster-sorterna.

I följande färger.

- å p. 12 ö., pr ort kr. 1,75
146. hvit.
147. hvit med rosa.
148. rosa.
149. körsbärsröd.
150. hortensiaröd.
151. lila rosa med hvitt.
152. ljusblå.

Alla 7 sorterna 75 öre.

153. bland:e färger, å p. 10 ö.
pr ort kr. 1,25

Låg, storblommig**Chrysanthemum-Aster.**

Blommor rikt; lika utmärkt som föregående, men lägre.

154. bland:e färger, å p. 15 ö.
pr ort kr. 2,25

Imbrikerade Pompon-Aster.

En mycket prydlig, rikt blommande sort med klotformiga blm.

155. bland:e färger, å p. 10 ö.
pr ort kr. 1,25

Da urvalet helt och hållet anförtros åt oss, lemnas:

- 100 sorter Aster, kr. 10 —
50 vackra sorter, kr. 5,50
25

"Löfkojor";

Cheiranthus annuus: Mathiola annua, Sommar-Löfkoja.
— *Cheir. Math. annua var. autumnalis, Höst-Löfkoja.* —
Cheiranthus; Math. incana, Vinter-Löfkoja.
(Cruciferae.)

Allt vårt löfkojfrö är af alla bästa sort, samladt af fullkomliga, i krukor odlade exemplar.

Löfkojorna tillhöra kålväxternas familj (cruciferae) och den enkla formen växer allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oafbrutet kunna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utsä fröet på olika tider eller ock, hvilket är beqvämare och säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. De engelska sommarlöfkojorsorterna blomma tidigast; dernäst de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man följande våren gör början. Fröet säås i ljum (ej varm) ärfvånk och betäckes föga. Så snart hjertbladen äro utbildade böra plantorna omskolas, med 3 tums afstånd emellan hvarandra, uti mycket sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft, och vatten då det behöves. För att så mycket som möjligt hindra plantornas onkullfälande, bör man ej så eller plantera för tät, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmen eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj utplanteras löfkojorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej kräkes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojan utplanteras på sängar, insläs om hösten i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöfk. kunna äfven användas som vinterlöfkoja och är oftast tacksammare, alltid vackrare än de sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkoja.*I följande färger:*

- å p. 15 ö., pr ort kr. 2,50
156. hvit.
157. carmosin.
158. mörk carmosinröd.

159. carminröd.

160. mörk carminröd.
161. rosa med gult sken.
162. ljusröd.
163. blodröd, (victoriaröd).
164. köttfärgad.
165. ljusbrun.
166. mörkbrun.
167. chamois.
168. mörkklila.
169. azurblå.
170. ljusblå med gult sken.
171. mörkblå.
172. ljusviolett.
173. mörkviolett.
174. ljus mordorée.
175. persikoblomfärgad.

Alla 20 sorterna kr. 2,75
12 sorter 1,70

176. blandade färger, 1:ma
å p. 15 ö. pr ort kr. 2,25

Engelsk**Buket-Sommar-Löfkoja.**

Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig buket.

I följande färger:

- å p. 25 ö., pr ort 4 kr.
177. carmosinröd.
178. rosenröd.
179. ljusblå.
180. mörkviolett.
181. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 3,25.

Engelsk**Lackbladig Sommar-Löfkoja.**

Varieteterna af denna afdelning hafva släta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredrages af många blomsterodlare.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort kr. 2,75
182. hvit.
183. mörk carmosin.
184. carmin.
185. köttfärgad.
186. svafvelgul.
187. ljusblå.
188. mörkblå.
189. violett.
190. mörkviolett.
191. persikoblomfärgad.

Alla 10 sorterna kr. 1,75

192. bland:e färger, å p. 15 ö.
pr ort kr. 2,50.

Engelsk**Storblommig Sommar-Löfkoja.**

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort 3 kr.
193. hvit.
194. carmosin.
195. mörk carmosin.
196. lysande purpur carmin.

197. carmin.
198. carminrosa.
199. högröd.
200. mörk blod-, victoriaröd.
201. aurorafärgad.
202. rosa.
203. köttfärgad.
204. kanariegul.
205. svafvelgul.
206. ljusblå.
207. mörkblå.

Alla 15 sorterna kr. 2,75

6 sorter 1,10

208. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 2,75

Eng., Pyramidformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Hålles af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor länge med stora blmr.: växtsättet pyramidformigt.

I följande färger:

å p. 20 ö., pr ort kr. 3,25.

209. rent hvit.
210. hvit med lackblad.
211. hvit med svag rosa.
212. carminröd.
213. mörkrosa.
214. rödbrun.
215. chamois.
216. canariegul med lackblad.
217. ljusblå.
218. mörkblå.
219. briljant lila.

Alla 11 sorterna 2 kr.

6 sorter kr. 1,10

220. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort 3 kr

Engelsk, ständigt blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort hafva förmåga att, sedan de förvisnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombarande skott.

I följande färger:

å port 20 ö., pr ort 3 kr.

221. hvit.
222. tegelröd.
223. carmosin.
224. köttfärgad.
225. rödbrun.
226. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,10.

227. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 2,75.

Trädlik, Jätte Sommar-Löfkoja.

Växten trädlik, blommorna stora och praktfulla; en i alla hänseenden utmärkt sort.

I följande färger:

å p. 25 ö., pr ort 4 kr.

228. hvit.
229. carmosin.
230. rosa.

231. citrongul.

232. ljusblå.

233. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

234. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 3,50.

Engelsk, tidigt blommande Höst-Löfkoja.

Om fröet utsås i April, samt tidigt med sommarlöfkojorna, och i öfrigt behandlas som dessa, då blomma de i Augusti, eller just lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis vissnade sommarlöfkojorna.

I följande färger:

å p. 30 ö., pr ort 5 kr

235. hvit.
236. carmosin med lackblad
237. carminröd.
238. ljusblå.
239. mörkblå.
240. brunviolett m. lackblad.

Alla 6 sorterna kr. 1,65.

241. bland:e färger, å p. 30 ö.
pr ort kr. 4,50.

Engelsk Bastard-Höst-Löfkoja.

Något senare än föregående.

242. bland:e färger, å p. 30 ö.
pr ort kr. 4,50.



Kejsar-Löfkoja.

Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommar något senare än de båda förutnämnda arterna mot slutet af Augusti och i September. De kunna senare på hösten upptagas, inplanteras i krukor och öfvervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följande vår af dem erhåller en tidig, rik och vacker blomstring.

I följande färger:

å p. 30 ö., pr ort kr. 4,75.

243. ljus carmosinröd.
244. carmosinröd.
245. ljus purpur.
246. rosenröd.
247. eldröd med lackblad.
248. köttfärgad.
249. kopparrosa, skön.
250. svafvelgul med lackblad.
251. blå.

252. violett.

Alla 10 sorterna kr. 2,75.

253. bland:e färger, å p. 30 ö.
pr ort kr. 4,50.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt

I följande färger:

å p. 30 ö., pr ort 5 kr.

254. rent hvit.
255. carmosinröd.
256. carminrosa.
257. rosa.
258. ljusröd.
259. köttfärgad.
260. ljusblå.
261. persikoblomfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 2,50.

262. bland:e färger, å p. 30 ö.
pr ort kr. 4,50.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sort frö, samlat af i krukor odlade exemplar.

I följande färger:

å p. 20 ö. pr ort kr. 3,75.

263. hvit.
264. mörk carmosinröd.
265. carminröd.
266. carminröd, låg, trädartad.
267. rosenröd.
268. högröd.
269. eldröd.
270. svafvelgul.
271. ljusblå.
272. mörkblå.

Alla 10 sorterna kr. 1,75.

273. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 3,25.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja.

Trädartad med yviga kronor och stora, vackra blomklasar.

274. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort. kr. 3,50.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Utmärkt för sin låga, men kraftiga, vackra växt.

275. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 3,25.

Dverg-Bukett-Vinter-Löfkoja.

Lågväxt med stora klasar af väl fyllda blommor.

276. bland:e färger, å p. 20 ö.
pr ort kr. 3,50.

Lackbladig Vinter-Löfkoja.

Har stora blommor i rena, klara färger och vackert gröna, gyllenlacklikta blad.

277. bland:e färger, å p. 20 ö.

Om urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas.

- 100 sorter Löfkoja, kr. 20 —
50 " " " 10 —
25 vackra sorter " 5 —

Gyllenlack; Lackviol.*Cheiranthus Cheiri.*

(Cruciferæ.)

Fröet är af utmärkt beskaf-
fenhet af välbildade blommor.Gyllenlacken tillhör samma fam-
lilj som löfkojan och växer vild i
södra Europa temligen allmänt på
gamla nurar o. dyl. Fröet sås i
kall drifbänk. (ej djupt) och plan-
terna utsätts sedan i djupt arbe-
tad, kraftig jord på 1 à 1 1/2 tofs
afstånd ifrån hvarandra. Vid torr
väderlek vattnas de tillräckligt.
Mot hösten upptagas de starkaste
plantorna och sätts i passande
krukor uti god, kraftig driftbänk-
jord blandad med hornspån. Öf-
vervintras som vinterlöfkojor.**Stång-Gyllenlack.***I följande färger:*

- à p. 20 ö., pr ort 3 kr.
278. kanariegul, dubbel.
279. mörkbrun, dubbel.
280. blå, dubbel.
281. blandade, dubbla sorter
à p. 15 ö. pr ort kr. 2,50.

Busk-Gyllenlack,*i följande färger:*

- à p. 20 ö., pr ort kr. 2,75.
282. gul, dubbel.
283. brun, dubbel.
284. brun, enkel.
285. blandade, dubbla sorter
à p. 20 ö., pr ort kr. 2,75.

Dverg-Gyllenlack,*i följande färger:*

- à p. 20 ö., pr ort 3 kr.
286. brun, mycket dubbel.
287. mörkbrun, enkel, storbl.
288. bronsfärgad, dubbel.
289. blå, dubbel.
290. blandade färger, à p. 20 ö.
pr ort kr. 2,75.

Askört;*Cineraria hybrida.*

(Senecionideæ)

Dessa utmärkt praktfulla blm.
behandlas så, som vi anmärkt om.
Calceolaria och blomma i så fall
samtidigt med dem. För att få
rätt stora blad- och blomrika ex.,
bör man, så snart rötterna nått
krukans vägg, ompl. ex. i allt
större krukor. Böra om vintern
ej stå varmt, högst + 50 C.

à port. 35 öre.

291. höga sorter, blandade.
292. låga sorter, blandade.

Toffelblomster:*Calceolaria hybrida.*

(Scrophulariaceæ.)

Fröet sås helst i Aug. eller bör-
jan af Sept. i flata fat eller kru-
kor med fin. sandbl. löfjord, hvara
yta före sällningen några jemma
med ett derhfil gjordt bräde. Fröet
bör ej betäckas, ntan blott lindrigtnedtryckas med brädet, hvarefter
de besädda kärnen nedsätts uti
ett annat, vattenfylldt kärl, tilldess
jorden uppsugit tillräcklig fuktig-
het, då de ställas tätt under glaset
i en sval drifbänk. För att befor-
dra groningen öfvertäckas frökär-
len med glasskivor, som åter bort-
tagas när fröet börjar gro. Så
snart hjertbladen utbildat sig, om
skolas plantorna i andra kärl. i
något kraftigare, men likväl lätt,
lös jord, på omkring i tums af-
stånd från hvarandra. Kärnen stät-
las derpå åter under glas i drif-
bänk, vattnas försigtigt och skyd-
das mot solen tilldess plant. blifvit
så försigt mna att de beqvämt
kunna fattas med fingrarna, då de
ompl., hvar för sig, först i små
och sedermera i allt större och
större krukor. De fordra om vin-
tern en ljus, sval plats nära glaset
och frisk luft så ofta vädret är
mildt. En jenn, fastän ej öfverlöf-
dig fuktighet är absolut nödvändig
för deras trefnad. Bladdlös afslä-
nas genast genom tobaksrökning
eller på annat sätt. Under knopp-
ningen och blomningen är svag
gödselvattning 3 à 4 ggr i veckan
att rekommendera.
I följande sorter:

- à port. 30 öre.
293. höga, alla vackraste,
tigrerade och punkterade
sorter, i mångfaldiga färger
med briljanta teck-
ningar.
294. höga, som föregående, men
samladt af de bästa, stor-
blommiga, flammiga sorter.
295. utm. flammiga och tigre-
rade sorter, blandade.
296. låga, riktbl., tigrerade, i
praktfulla färger.
297. låga, rikt och tidigt blom-
mande, praktfulla, flam-
miga sorter.
Alla 5 sorterna, kr. 1,25.

Chines. Majnyckel;*Primula chinensis.*

(Primulaceæ.)

Dessa utm. prydliga och tack-
samma växter blomma nästan hela
året om, dock rikast och vackrast
under vintermånaderna, då nästan
alla andra blm. saknas. Fröet
sås om våren, helst i god, lätt sandbl.
löf- och ljungjord och betäckes
föga. De besädda kärnen ställas
i en lagom varm drifbänk, hvarest
de få qvarstå till dess plant. fått
3 à 4 blad, då de omplanteras 2
tum ifrån hvarandra, i andra kärl.
När plant. fått tillräcklig styrka
ompl. de, hvar för sig 13 à 14 tums
krukor och ställas antingen i en
kall drifbänk eller i växthus och
vattnas rikligt. Öfverv. nära gla-
set vid + 5 à 60 C. De dubbla
sorterna förplantas om våren bäst
genom sticklingar. Fröet af de
dubbla sorterna lemvar i allmänhet
endast få dubbla blommor. Se af-
bildningen på omslagets sista sida.
I följande sorter:

298. alba, hvit, à port. 20 ö.
299. cupreata, kopparröd
à p. 20 ö.
300. rubra, röd, à p. 15 ö.
301. striata, strimm., à p. 25 ö.
302. blandade sorter, à p. 20 ö.
303. fimbriata alba, fransad,
hvit, storbl. p. 30 ö.
304. „ alba globosa, utm.,
à port. 60 ö.
305. „ „ pl., 10 frö, 80 ö.
306. „ erecta superba, kop-
parcarminröd
à p. 40 öre.
307. „ kermesina splendens
lysande carminröd,
à p. 45 ö.
308. „ lilacina alba margi-
nata, utmärkt, lilla m.
hvitt à p. 30 ö.
309. „ purpurea, purpuröd,
à p. 30 ö.
310. „ rubra, röd, utmärkt,
à p. 25 ö.
311. „ „ globosa, utmärkt,
à p. 50 ö.
312. „ striata, strimmig.
à p. 35 ö.
313. macrophylla (filicifolia) al-
ba, hvit, storbladig,
à p. 20 ö.
314. „ rubra, röd, à p. 20 ö.
315. „ striata, strimmig,
à p. 35 ö.

Alla 17 sorterna 5 kr.

12 vackra sorter kr. 3,75

Balsaminer;*Impatiens Balsamina* eller*Balsamina hortensis.*

(Balsaminææ.)

Fröet utsås antingen i krukor
eller och trit i en varm drifbänk.
När hjertbladen utbildat sig, om-
skolas plantorna i ett annat fönster
på 5 à 6 tums afstånd ifrån hvar-
andra och obetydligt djupare än de
ståt förut. Der få nu de unga plan-
torna qvarstå så länge som utrymmet
tillåter hvarefter de upptagas med
vidhängande rotklimp och plante-
ras i passande krukor i fet, haff-
multnad gödseljord. Då plantrot-
te na uppfylla krukorna gifvas göd-
selvattnen 2 à 3 gånger i veckan.
Exemplaren böra ej utflyttas på
fritt land för än de börjat blomma.**Rosen-Balsamin.**Har hög, trädlik, men föga
grenig växt samt stora, fätsittande,
starkt fyllda blommor.*I följande färger:*

- à p. 12 ö., pr ort kr. 1,75
316. rent hvit.
317. purpuröd.
318. granatöd.
319. rosenfärgad.
320. ljusgul.

321. chamois.
 322. mörkblå.
 323. lila.
 324. äppleblomfärgad.
 Alla 9 sorterna 1 kr.
 325. blandte färger, å p. 10 ö.
 pr ort kr. 1,25.
- Camellie-Balsamin.**
(Andrieux, förbättrad.)
 Denna sort blifver ej så hög;
 har fått sittande, starkt fyllda, mer-
 ändels fläckiga blommor
I följande färger:
 å p. 12 ö., pr ort kr. 1,75.
 326. carmin med hvitt.
 327. carminrosa.
 328. rosa med hvitt.
 329. skarlakan.
 330. lila med hvitt.
 331. violett.

- Alla 6 sorterna 65 öre.
 332. blandte färger, å p. 10 ö.
 pr ort kr. 1,25.

- Dverg-Balsamin.**
 Betydligt lägre än förestående
 sorter; men eljest lik dem.
 333. blandte färger, å p. 10 ö.
 pr ort kr. 1,25.
 334. Solferino-Balsamin, med
 lila-, carmosin- och skar-
 lakanröda strimmor; ut-
 märkt nyhet, å port. 20 ö.
 335. Atrosanguinea plenissima,
 blodröd, mycket stor-
 blommig, dubbel; prakt-
 full nyhet, å port. 20 öre.

Flamblomster;

Phlox Drummondii.

(Polemoniaceæ.)

Är en af de vackraste sommar-
 blommor för såväl fritt land, som
 för krukor. Fröet säs i drifbänk
 och hålles jemt fuktigt. Mot slutet
 af Maj planteras de i krukor eller
 på kall jord. Om man utsår fröet i
 Juli och öfvervintrar plantorna vid
 + 4 å 6° C., så erhålles kraftiga
 ex., som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25.
 336. hvit.
 337. purpuröd.
 338. rosenröd.
 339. eldröd.
 340. marmorata rosea.
 341. marmorata violacea.
 342. Prinz Leopold, högröd
 med hvit stjerna.
 343. Prince royal, lila med
 hvita strimmor.
 344. Radowitzii, röd, strimm.
 345. Wilhelm I, mörkröd, str.
 346. chamois rosa.
 347. rosa med hvit stjerna.
 348. skifferblå varieteter.

349. violetta varieteter med
 hvit stjerna i midten.
 350. Isabellina, gulaktig.
 Alla 15 sorterna kr. 1,40.
 10 sorter . . . 95 öre.
 351. blandte färger, å p. 8 ö.
 pr ort 75 ö.
 352. Phl. Dr. Heinhöldii, prakt-
 full varietet med lysande
 skarlakanröda blommor;
 utmärkt till grupper,
 å port. 20 öre.
 353. Phl. Dr. Heinh. cardina-
 lis, nyhet, lik förestående
 men ännu mera lysande,
 å port. 35 öre.

Stt Jacobsblomster;

Senecio elegans.

(Senecionideæ.)

Utsås och behandlas som flam-
 blomster; kan äfven förökas genom
 sticklingar; utmärkt gruppväxt.
Hög Stt Jacobsblomster.

I följande färger:

- å p. 8 öre., pr ort 90 ö.
 354. hvit, dubbel.
 355. lys. purpuröd, dubbel.
 356. mörkpurpurfärgad, dubb.
 357. rosenröd, dubbel.
 358. violettröd, dubbel.
 359. brun, dubbel.
 360. lilafärgad, dubbel.
 Alla 7 sorterna 50 öre.
 361. blandte färger, å p. 8 ö.
 pr ort 75 öre.

Låg Stt Jacobsblomster.

(Senecio elegans nana.)

I följande färger:

- å port 8 öre, pr ort 90 ö.
 362. hvit, dubbel.
 363. lysande purpur, dubbel.
 364. röd, dubbel.
 365. kopparfärgad dubbel.
 366. ljusviolet, dubbel.
 367. mörkbrun, dubbel.

Alla 6 sorterna 40 öre.

368. blandte färger, å p. 8 öre.
 pr ort. 90 öre.

Lejongap;

Antirrhinum majus.

(Personateæ.)

Fröet utsås om våren och hål-
 les jemt fuktigt. Så tidigt som
 möjligt utplanteras man plantorna
 på deras platser på kall jord. En
 del planteras man äfven i krukor
 och öfvervintrar dem på frostfritt
 ställe. då de följande vår blomma
 tidigt och vackert.

Höga Lejongap.

I följande färger och sorter:

- å port. 5 ö., pr ort. 40 ö.
 369. alba, hvit.
 370. Brillant, trefärgad.
 371. Crescia, mörk skarlakan.

372. Delila, carmin med gult.
 373. Firefly, skarlakan med
 gult och hvitt.
 374. Galathée, carmosinröd
 med hvitt.
 375. Ghestia, mörkt blodröd.
 376. Henry IV, cinoberöd.
 377. nigrescens, mörk purpur.
 378. Papilionaceum, hög pur-
 pur med hvitt.
 379. striatum, strimm., skön.
 Alla 11 sorterna 50 öre.
 380. blandte färger, å p. 5 ö.
 pr ort 30 ö.

Låga Lejongap.

Antirrhinum majus nanum.

I följande färger och sorter:

- å p. 5 öre., pr ort 40 ö.
 381. alba, hvit.
 382. aureum striatum, gul kar-
 mosinrödstrimmig.
 383. Aurora, aurorafärgad.
 384. Brillant, trefärgad.
 385. Crescia, mörk skarlakan.
 386. Delila, carmin med gult.
 387. Firefly, orange-skarlakan
 med gult och hvitt.
 388. Galathée, carm. m. hvitt.
 389. Henry IV, cinoberöd.
 390. kermesina splendens, ly-
 sande carmosin.
 391. luteum, ljusgul, utmärkt.
 392. Papilionaceum, purpur
 med hvitt.
 Alla 12 sorterna 55 öre.
 393. blandte färger, å p. 5 ö.
 pr ort 30 öre.

Dvergartade Lejongap.

Antirrh. majus nanissimum.

I följande färger och sorter:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25.
 394. album, hvit.
 395. album rubrum striatum,
 hvit, rödstrimmig.
 396. Brillant, trefärgad.
 397. Cinnabarinum, lysande cinob.
 398. Delila, carmin med gult
 399. Firefly, orange-skarlakan
 med gult och hvitt.
 400. Henry IV, cinoberöd.
 401. luteum rubrum striatum,
 gul, rödstrimmig.
 402. sulphureum, lysande gul.
 Alla 9 sorterna, 80 öre.
 403. blandte färger, å p. 10 ö.
 pr ort i kr.

Neglikor;

Dianthus Caryophyllus.

(Caryophyllææ.)

Neglikorna äro bland våra äldsta
 och bäst omtyckta trädgårdsblom-
 mor. Fröet säs antingen frött i en
 ljun drifbänk eller i flata, s. k.

fröfat. När plantorna blifvit ett par tum höga, planteras de på för dem jordningsjordna sängar i fet, men ej nygödsad jord. Om vintern är täckning endast nödvändig, när starkt eller ihållande barfrost är rådande. Under blomstringstiden bör man skydda neglikorna mot starkt solsen och häftiga regnskurar. De vackraste sorterna odlar man gerna i kruka. De trifvas väl i god gråstorfjord, sådan som hemtas från någon äng, der fabriks kreatur betat. Denna jord blandas med gammal kogödseljord och sand. Kruknorna böra ej vara för stora, 5 å 6 tumms vidt anses tillräckligt, helst nya och väl dränerade. Öfvervintnas i en frostfri lokal, så torr, kallt och luftigt, som möjligt.

I följande sorter:

404. brokiga, dubbla, utmärkta sorter lma, å p. 20 öre.
pr ort kr. 2,50.
405. enfärg., dubbl. tid. blom. å p. 10 öre, pr ort i kr.
406. remonterande, utmärkta sorter, å 30 frö 60 öre.
407. krukneglikor, hvaribland Bizarder, Famöser, Picotter m. fl. utm. sorter bland: rma, 15 frö 50 ö.
408. dvergneglikor, vackra, tidigt bl., dubbla, enfärg. å p. 10 öre, pr ort i kr.

Kinesiska Neglikor;

Dianthus chinensis.

(Garyophylleæ.)

Fröet utsås i Mars och plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juni kunna utflyttas på kall jord. Till de exemplar, som man ämnar öfvervintra sås fröet i Juli eller Aug. Plantorna ställas under vintern i ett kallt växthus, nära glaset och vattnas sparsamt, men luftas så ofta vädret sådant tillåter. Räknas till våra aldri bästa sommarblommor.

I följande sorter:

409. fl. pl. blandade, dubbla å p. 5 öre, pr ort 30 ö,
410. alba pl., hvit dubbel, å p. 5 ö., pr ort 40 ö.
411. „ striata pl., strimmig å p. 5 ö., pr ort 40 ö.
412. rubra striata pl., röststrim. å p. 5 ö., pr ort 40 ö.
413. Hedewigi (giganteus) å p. 8 ö., ort 75 öre.
414. „ albus grandif. fl. pl., hvit, storbl., dubbel, å p. 8 ö., ort. 75 ö.
415. „ atropurpureus fl. pl., mörkpurpur. å p. 8 ö., pr ort 75 öre.
416. „ diadematus fl. pl. vackert tecknade varieteter, å port. 15 öre, pr ort kr. 1,75.

417. Hedewigi hybridus fl. pl., i flera praktfulla färger å p. 8 öre, pr ort 75 ö.
418. imperialis fl. pl., dubbel, storblom. kejsarneglika, i flera färger, å p. 5 ö., p. ort 30 ö.
419. „ atrosanguineus pl., mörkt blodröd, mycket dubbel, å p. 5 ö., pr ort 40 ö.
420. „ plenissimus pictus, mycket dubbel, fint tecknad, å p. 8 öre, pr ort 50 öre.
421. laciniatus, vacker jätteneglika med fransade blad, å p. 8 ö., pr ort 50 ö.
422. „ fl. pl., dubbla sorter, å p. 10 ö., ort, kr. 1,20.
423. „ atropurpureus pl., dubbel, mörkröd, å p. 12 ö., ort kr. 1,20.
424. nanus atrosanguineus pl., mörkblodr. dvergnegl. å p. 10 ö., pr ort 90 ö.
425. „ cupreus pl., kopparfärgad, skön, å p. 10 ö., pr ort 90 öre.
426. „ roseus pl., rosenröd å p. 10 ö., pr ort 90 ö.
427. „ pumilus, nya variet. å p. 5 ö., pr ort 40 ö.
12 vackra sorter, i kr.

428. Dunnetti, lysande blodröd å p. 5 öre., pr ort 20 ö.
429. nigricans, skön, mörkröd, å p. 10 ö., pr ort 80 ö.
430. marginatus, vackra hvitrandiga, sorter, å p. 5 ö., pr ort 15 ö.
431. „ plenissimus, starkt fyllda utmärkta sorter å p. 10 ö. pr ort i kr.
432. oculatus marginatus med hvitt öga och hvit rand, i flera färgförändringar, å p. 8 öre, pr ort 50 ö.
433. blandade i flera färger, å p. 5 öre, pr ort 15 ö.
434. dubbla blandte i flera färger (deribl. äfven enkla) å p. 8 öre, pr ort 60 öre.
De öfriga Dianthusarterna äro upptagna bland fleråriga växter.

Petunier;

Petunia.

(Solanaceæ.)

Alla sorterna petunia äro utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter. De kunna användas på mångahanda sätt, såsom till grupper, krukor, amplar, espalier, o. s. v. De trifvas i all slags jord, blott den är närande och lös. Fröet säas i krukor och de unga plantorna omskolas i fat, eller i ett afkyldt drifbänkfonster, beskuggas några dagar för solskenet, vattnas och luftas ordentligt samt utplanteras på fritt land i början af Juni. Till exemplar, som skola öfvervintnas, utsås fröet i Juli eller i början af Augusti. Se afbildn. på omslagets framsida.

435. mirabilis, (P. violacea eller phoenicea), mörk-carmosinröda blommor, å p. 5 öre, pr ort 25 öre.
436. nycctagiflora, (Nicotiana, nycctag.; Nicot. axillaris) stora hvita blmr, å p. 5 ö., pr ort 20 öre.

Varieteter af förestående.

Petunia hybrida.

I följande sorter:

437. argentea, silfverhvit. å p. 10 ö., pr ort 50 öre.
438. Countesse of Ellesmere, ljus rosa med hvit pip. å p. 10 ö., pr ort 75 öre.
439. grandiflora carminea intus alba, storbl., caminr. m. hvit pip, å p. 20 ö.
440. „ Inimitable, storblom. praktf. med rent hvita ränder och fläckar, varierar, å p. 20 ö e.
441. „ kermesina, storblom. karmosinröd, praktfull å port. 20 öre.



Dianthus barbatus.

Borst-Neglikor;

Dianthus barbatus.

(Garyophylleæ.)

De på senare tiderna erhållna, praktfulla varieteterna af borstneglikor, göra dessa fleråriga växter förtjenta af en mera allmän uppmärksamhet, än som vanligtvis egnas dem. De äro utmärkt vackra till grupper och rabatter och ej på något sätt ömtåliga. Se afbildn.

I följande sorter:

442. grandif. marginata, storbl. grönrändiga, utm. varieteter, å port 25 ö.
 443. „ marmorata, storbl., carmin-marmorerade varieteter, å port 20 ö.
 444. „ rosea intus alba, storbl., rosa med hvit pip. å port 20 ö.
 445. „ venosa, skönt ådrade sorter, å port 20 ö.
 446. „ violacea, vackra, violetta, å port 20 ö.
 447. „ storbl., alla sorter bl. e. rma, å port 20 ö.
 448. „ fl. pl. storbl. utm. sorter blandade, hväribland en stor del dubbla, å port 30 ö.
 Alla 12 sorterna, kr. 2,25.
 6 utm. sorter, . kr. 1,25.
 449. blandade rma sorter, å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25.

Portlak ;*Portulaca.*

(Portulacææ.)

- Alla sorterna utmärka sig för stora, ytterst briljant färgade blommor. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppblandad med gammal kalk. Vill man hafva blommande portlak hela sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 å 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gångerna direkte på kalljord. De enkla sorterna forplantas sig ofta sjelfva genom utfallande frö.
 450. blandade, å port. 8 öre, pr ort 50 öre.

Dubbelblommande Portlak.

451. blandade, storbl. sorter, å port. 15 öre.

Riddarsporrar ;*Delphinium.*

(Ranunculacææ.)

Riddarsporrarne höra till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma men man kan äfven göra sådden på våren. Fordra god, väl arbetad jord.

Lökkojlik Riddarsporre.

Delphinium Consolida.

Mycket dubbla, vackra blommor.

I följande färger :

- å p. 5 ö., pr ort 25 öre,
 452. snöhv. vit.
 453. högrösa.
 454. mörkrosa.
 455. köttfärgad.
 456. mörkblå.
 457. ljusblå.
 458. ljuslila.
 459. brokig.
 Alla 8 sorterna 35 öre.
 460. blandade färger, å p. 5 ö. pr ort 15 öre.

Kandelaber-Riddarsporre.*Delph. consol. candelabr. pl.*

Utmärkt för sitt egendomliga, greniga växtsätt, och sina vackra, dubbla blommor.

461. blandade färger, å p. 15 ö.

Ranunkellik Riddarsporre.*D. Ajacis ranunculiflorus.*

vackra och starkt fyllda, klotformiga blommor. Låg växt

I följande färger :

å port. 5 ö., pr ort 30 öre.

462. hvit.
 463. rosa.
 464. tegelröd.
 465. köttfärgad.
 466. askgrå.
 467. violett.

Alla 6 sorterna 25 öre.

468. blandade färger, å p. 5 ö.

pr ort 25 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre.*D. Aj. var. Hyacinthiflorum.*

Låg växt; mycket dubbla, vackra blommor.

I följande färger :

å p. 5 ö., pr ort 15 ö.

469. hvit.
 470. tegelröd.
 471. köttfärgad.
 472. chamois.
 473. ljusblå.
 474. mörkblå.
 475. ljusviolett.
 476. vallmogrå.
 477. rödaktig lila.
 478. äppleblomfärgad.

Alla 10 sorterna 45 öre.

479. blandade färger, å 5 öre.

pr ort 15 öre.

Blomma för dagen ;*Ipomea purpurea* eller*Pharbitis hispida.*

(Convolvulacææ.)

Slingerväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kall jord. Utmärkt användbar till beklädad af mindre esplaner, pelare, korgar, höga törnrosor. o. s. v.

I följande färger :

å p. 5 ö., pr ort 15 öre.

480. hvit.
 481. hvit, blårandig.
 482. hvit, violettstrimmig.
 483. ljusst rosenröd.
 484. ljusst inkarnatröd.
 485. praktfull, mörkröd.
 486. mörkblå.
 487. lilafärgad.
 488. spec. fr. Indien, djupblå.
 Alla 9 sorterna 40 öre.
 489. blandade färger, å p. 5 ö. pr ort 10 öre.

De öfriga Ipomeasorterna finnas upptagna bland slingerväxter.

Indiansk eller Kapuciner-Krasse ;*Tropæolum majus.*

(Tropæolææ.)

Användas på fritt land till beklädad af spallier, väggar, pelare, urnor, etc och frambringar hela sommaren till sent på hösten en otalig massa, i alla nyanser mellan gult och svartrött, lysande blmr.

I följande sorter :

- å p. 5 ö., pr ort 10 öre.
 490. atropurpureum, mörkröd
 491. coccineum, skarlakanröd
 492. Dunetts new orange, lysande, rent gul.
 493. Eduard Otto, lilafärgad.
 494. luteum, rent gul.
 495. Regelianum, violett.
 496. von Moltke, blåakt. röd.
 Alla 7 sorterna 30 öre.
 497. blandade färger, å p. 5 ö. pr ort 5 ö., pr $\frac{1}{2}$ 3 kr.

Lobb's Indiansk eller Kapuciner-Krasse ;*Tropæolum Lobbianum.*

Alla hithörande arter äro slingrande och utmärka sig för talrika, lysande vackra blmr. Om de odlas i krukor och insätts i tempererad växthus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan under hela vintern.

I följande sorter :

- å p. 12 ö., pr ort. 50 öre.
 498. brillant, lysande skarl.
 499. Caroline Schmidt, röd.
 500. coccineum, multiflorum.
 501. Duc de Vivence, rödf.
 502. flammula grandifl., röd, gulfammig.
 503. geant des batailles, gulhv. vit, rödfäckig.
 504. glabrum variegatum, hvitgul, brunfäckig, olika.
 505. glory, skarlakanröd.
 506. Hookeri, mörkgul.
 507. Kitchianum, multifl., småblom. skarlakanröd.
 508. Lili Smith, ljusröd.
 509. Napoleon III, gul rödf.
 510. Queen Victoria, lysande cinoberröd.
 511. Triomphe de Hyères, lysande röd.
 512. „ du Prado, gul fäckig.
 Alla 15 sorterna kr. 1,65.
 513. blandade färger, å p. 10 ö. pr ort 40 öre.

Låg Indiansk eller Kapuciner-Krasse ;*Tropæolum majus nanum.*

Dessa sorter äro ej slingrande, de äro utm. vackra till grupper.

Fröet säs i Maj, 1 tum djupt med 8 å 10 tum mellanrum, direkte på grupperna. Se afb. på omsl. framsida.

I följande sorter:

- å p. 5 ö., pr ort 15 öre.
 514. *atrococcineum*, mörkröd.
 515. *Beauty*, gul, rödflamm.
 516. *coeruleum roseum*, blåaktigt röd.
 517. *Crystal palace gem*, gul, rödmarmorerad.
 518. *King Teodor*, nästan svart.
 519. *purpureum Cattles*, mörk purpurbrun.
 520. *spotted*, fläckig.
 521. *Yellow*, rent gul.
 Alla 8 sorterna 35 öre.
 522. blandade färger, å p. 5 ö. pr ort 10 öre.
 523. *King of Tom Thumb*, mörk skarlakanröd, utmärkt å p. 12 ö., pr ort 40 öre.

Liten Indiansk eller Kapuciner-Krasse;

Tropaolum minus.

Småblommiga, till alla delar mindre än de öfriga sorterna; utmärkt vackra till beklädnad af mindre spalier etc.

I följande sorter:

524. *coccineus*, skarlakanröd. å p. 5 ö., pr ort 25 öre.
 525. *luteus*, gul, å p. 5 öre. pr ort 15 öre.

Välluktande Ärtblomster;

Lathyrus odoratus.

(Leguminosæ.)

Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utmärkt vackra, mycket välluktande. Växten, som blifver 6 å 8 fot hög, kan begagnas till beklädnad af väggar, plank, éspalier, flätverk, o. s. v. Fröet utsås på kaljörd.

I följande färger:

- å p. 5 ö., pr ort 8 öre.
 526. hvit.
 527. svart purpur.
 528. svart purpur m. ljusbl.
 529. mörkröd.
 530. röd, hvitstrimmig.
 531. rödspäcklig.
 532. svartbrun, flammig.
 533. Krönprinsessa af Preussen, köttfärgad.
 534. *invincible scarlet*, skarl.
 Alla 9 sorterna 40 öre.
 535. blandade, å port. 5 öre. pr *fl.* 3 kr., pr ort 5 öre.
 Öfriga sorter *Lathyrus* återfinnas bland slingerväxterna.

Sammetsblomster;

Tagetes.

(Senecionideæ.)

Utsås och behandlas som aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infattning. Alla ha dubbla blmr.

I följande sorter:

- å p. 5 ö., pr ort 30 öre.
 536. *erecta aurantiaca*, guldf.
 537. „ *sulphurea*, svafvelgul.
 538. „ *plenissima*, blekgul.
 539. „ *nana*, lågväxta sorter.
 540. *lucida*, glänsande, (egentligen flerårig.)
 541. *patula nana*, låga sorter.
 542. „ *pulchra*, gul m. brun.
 543. „ *pumila*, lågväxt brun.
 544. „ *aurca*, skön, guldf.
 545. „ *ranunculoides*, *ranunculik*, mycket dubl.
 546. *signata*, finbladig.
 547. „ *Pumila*, dvergartad.
 Alla 12 sorterna 50 öre.
 548. blandade, höga, dubbla. å p. 5 ö., pr ort 20 öre.
 549. blandade, låga, dubbla, å p. 5 ö., pr ort. 20 öre.

Stjufmorsblomster;

Viola tricolor:

(Violaceæ.)

De nu, under namn af *Viola tricolor maxima* eller *V. tricolor varietatis hortensis*, så allmänt omtyckta, storblommiga formerna af stjufmorsblomman eller penséen hafva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjufmorsblomman (*Viola tricolor*) och altaiviolen (*Viola altaica*). De utmärka sig genom sina stora, skönt formade och kolorerade blommor, men ur arta lätt om exemplaren blifva gamla, eller få för länge kvarstå på samma ställe. Det är därför bäst att hvarje år utså frö till nya plantor, eller uppdraga sådana genom sticklingar. Fröet säs helst 2 gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång på våren. De som blifvit sådda året förut blomma alltid tidigare och rikare än dem man sät på våren. De fordra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorter fortplantas säkrast genom sticklingar.

I följande färger och sorter:

- å p. 10 ö., pr ort kr. 1,25.
 550. hvita sorter.
 551. hvitkantade, violetta.
 552. *carmosin*- och *purpurmarmorerade* sorter.
 553. brunröda, vackra sorter.
 554. aurikelfärgade sorter.
 555. nigra, kolsvarta sorter.
 556. gula sorter.
 557. guldkantade sorter.
 558. ljusblå sorter.
 559. flammiga sorter.
 560. *Baron de Rothschild* praktfulla, brunfläckiga.
 561. *gloriosa superba*, utm., skönt tecknade sorter.

Alla 12 sorterna kr. 1,10.

562. blandade färger, å p. 10 ö. pr ort kr. 1,25.
 563. *Kaiser Wilhelm*, praktl., ultramarinblå med purpuroviolettt öga, å p. 30 ö.
 564. *Odiérs*, nya, femfläckiga, utm. sorter, å port. 30 ö.
 565. *nana*, låg, klotformig, vackra färger, å p. 20 ö., pr ort kr. 2,50.

Stockrosor;

Altaea rosea,

(Malvaceæ.)

I sitt numera betydligt förbättrade tillstånd höra dessa ställiga blommor till trädgårdens vckraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsås tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolas på en säng i god jord. Om hösten upplagas de och antingen inslås i sand i en tom drifbänkåda, eller planteras i små krukor och öfvervintras frostfritt. Följande vår upplanteras de på för dem bestämde, djupt grädda och gödslade ställen på fritt land, hvarst ett de blomma, till dess de förstöras af stark frost.

I följande färger:

- å p. 15 ö., pr ort 2 kr.
 566. hvit med violett.
 567. gulaktigt hvit.
 568. hvit med lila.
 569. mörkpurpur m. violett.
 570. skarlakan.
 571. mörk carmin.
 572. *carmosin*.
 573. ljus rosa.
 574. mörk rosa.
 575. ljusröd.
 576. rödlik lila.
 577. köttfärgad.
 578. svafvelgul.
 579. ljusgul med röd lila.
 580. mörkgul.
 581. mörk chamois.
 582. *carmosinviolett*.
 583. askgrå, röddårad.
 Alla 18 sorterna kr. 2,50.

- 12 sorter 1,70.
 584. blandade färger, 1 ma. å p. 10 ö., pr ort kr. 1,50.

Chater's Stockrosor.

En ny, utomordentligt vacker och praktfull sort
 585. blandade, bästa färger, å p. 30 öre, pr ort 4 kr.

Trumpetblomster;

Salpiglossis variabilis; Salp. sinuata ell. *Salp. straminea.* (Solanaeæ.)

En med petunian nära befundad, 2 å 4 fot hög växt. Fröet ut-

sås tidigt om våren i krukor men får ej betäckas med jord, utan blott jemnt nedtryckas, hvarefter krukorna täckas med glasskivfor och ställas i en bänk. När plantorna uppnått erforderlig utveckling, omskolas de och utpl. i början af Juni på grupper. Se arb. på omsl:s framsida.

586. höga sorter, blandade, å p. 5 ö., pr ort 50 öre.

587. låga sorter, blandade, å p. 5 ö., pr ort 50 öre.

588. var. grandiflorus, å p. 10 ö., pr ort kr. 1,30.

Tuppkam;*Celosia cristata.*

(Amaranthaceæ.)

För att erhålla exemplar med stora och välbildade kammar, omskola man plantorna, nyss efter det de uppkommit, i ett varmt drifbänkfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarna börjat bilda sig upp-tagas plant. m. klump och inplanteras i passande krukor. ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med starkt gödselvattnet.

I följande färger:

å p. 10 öre, pr ort kr. 1,50

589 carmosin.

590 ljus carmosin.

591 mörkpurpur.

592 mörkrosa.

593 eldröd.

594 cinoberröd.

595 amaranthröd.

596 guldfärgad.

Alla 8 sorterna 70 öre.

597 bland:e färger, å p. 10 ö. pr ort kr. 1,25.

598 låga, bland:e, å p. 10 ö. pr ort kr. 1,25.

Underblomster;*Mirabilis jalappa.*

(Nyctagineæ.)

Praktfull, 2 å 3 fot hög växt, som blommar till sent på hösten. Fröet säs om våren och plantorna sättas i 3 å 4 toms krukor, som ställas i ljum drifbänk samt vattnas och luftas ordentligt. Utplanteras i Juli på fritt land i god, lös och närmande jordmån. Se afbildn. på omslagets sista sida.

I följande färger:

å p. 5 öre, pr ort 15 öre.

599 hvit.

600 hvit med gult.

601 carmosin med hvitt.

602 carminröd.

603 rosa.

604 rosa med gult.

605 högröd.

606 rent gul.

607 gul med rödt.

608 chamois.

Alla 10 sorterna 40 öre.

609 bland:e färger, å p. 5 ö. pr. 1/2 5 kr., pr ort 10 öre.

Wallmo;*Papaver somniferum.*

(Papaveraceæ.)

Alla de anförda vallmosorterna utm. sig för stora väl fyllda blommor i lysande färger. Fröet säs höst eller vår i fet, lös jord.

I följande färger:

å p. 5 ö., pr ort 15 öre.

610. hvit.

611. hvit med purpur.

612. purpur på svart.

613. incarnatröd med violett.

614. askgrå.

615. vallmogrå.

616. svartbrun med cinnober.

617. nästan svart.

618. ljusblå med cinnober.

619. mörklila.

620. mordorée på askgrått.

Alla 11 sorterna 45 öre.

621. bland:e färger, å p. 5 ö. pr ort 10 öre.

Pionlik Wallmo:*Pap. somn. var. pæoniflorum.**I följande färger:*

å p. 5 ö. pr ort 15 öre,

622. hvit.

623. hvit med rosa sken.

624. purpur.

625. präktig skarlakan.

626. skarlakan med hvitt.

627. högrosa.

628. cinnober på violett.

629. mörk mordorée.

Alla 8 sorterna, 35 öre.

630. bland:e färger, å p. 5 ö. pr ort 10 öre.

Fjäderlik Wallmo:*P. somn. laciniatum Murselli.**I följande sorter:*

å p. 5 ö., pr ort 15 öre.

631. fl. pl., dubbel, utmärkt.

632. lilacina, lila med rödt.

633. splendens, rosa m. hvitt.

Ranunkel-Walmo;*Papaver Rhoeas.*

634. bland:e färger, å p. 5 ö., pr ort 15 öre.

Zinnia;*Zinnia elegans.*

(Senecionideæ.)

Zinniaarterna hafva lysande blommor och äro särdeles användb. till grupper. Fröet utsås någorunda tidigt i bänk och plantorna böra ej utpl. för än väderleken hunnit blifva någrl. sommarlik. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.

I följande färger och sorter:

å port. 5 öre, pr ort 20 öre.

635 alba, hvit.

636 atroviolacea, mörkviolett.

637 aurea guldfärgad.

638 coccinea, skarlakan.

639 purpurea, purpur.

640 sulphurea, svalvelgul.

Alla 6 sorterna 25 öre.

641 bland:e färger, å p. 5 ö. pr ort 15 öre.

Dubbel Zinnia;*Zinnia elegans fl. pleno.**I följande färger:*

å p. 8 ö., pr ort 60 öre.

642 alba, hvit.

643 atrococcinea, mörk skarlakanröd.

644 atropurpurea, mörkröd.

645 aurantica, orangeröd.

646 carnea, ljusröd.

647 coccinea, skarlakan.

648 kermesina, carmosin.

649 lilacina, gredelin.

650 lutea, gul.

651 purpurea, purpurfärgad.

Alla 10 sorterna, 75 öre.

652 bland:e färger, å p. 5 ö. pr ort 50 öre.

II. Frö till Dekorativa Bladväxter.

till större eller mindre grupper på fritt land.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Abutilon; (Malvaceæ)

653 „ Thompsoni, 10 frö . . . — 40 — —
„ öfriga sorter, se krukväxter.
En utmärkt vacker växt, såväl för krukor, som till plant. på grupper. Bladen äro ljus-

gröna, gulfläckiga och blommorna klockform..
gula, rödmarmorerade Öfverv. frostfritt.
Fortpl. genom sticklingar eller frösådd.

Acanthus; (Ejörnklo, (Acanthaceæ))

654 „ latifolius, bredbladig . . . — 5 — 25

	å Port. Ort. Kr. ö. Kr. ö.	
655	<i>Acanthus lusitanicus</i> . . .	— 10 — 50
656	„ <i>mollis</i> , mjukbladig . . .	— 5 — 20
	Praktfulla omkring 1 fot höga växter med antika bladformer. Öfverv. frostfritt.	
	Amaranthus; Råfsvans (Amaranthaceæ.)	
657	„ <i>amabilis tricolor</i>	— 50 — —
658	„ <i>bicolor ruber</i>	— 8 — 30
659	„ <i>chlorostachys</i>	— 30 — —
660	„ <i>Henderi</i>	— 50 — —
661	„ <i>melancholicus</i>	— 5 — 20
662	„ <i>olbiensis atropurpureus</i>	— 20 — 75
663	„ „ <i>carineus compactus</i>	— 30 — —
664	„ <i>tricolor</i>	— 8 — 30
665	„ <i>salicifolius</i>	— 20 — 75

Alla 9 sorterna kr. 2,10.

Alla sorterna äro ettåriga, omkr. 1 à 2 fot höga; fordra lös, närande jordmän. Fröet säs i drifbänk. *Amaranthus amab. tricolor* är 1 1/2 fot hög med långa, breda, rosenfärgade, gula och eldröda blad. *A. Henderi* är den erkänt vackraste af de nya sorterna, har nedåt böjda, briljant färgade blad. *Amaranthus bicolor* och *melancholicus* utm. sig för sina röda blad och äro äfven användbara till blad- & blomstergupper. *A. chlorost.* är stor, trädartad m. hängande, ljusgula blomax och mycket decorativ. *A. olb.* äro värdefulla nyh. med lysande röda blad och stjelkar, atropurp. pyramidform. och carminat. af låg, sammanträngd form. *A. tricolor* har trefärg. blad. *A. salicif.* är en utm. pyramidlik, 2 fot hög växt med långa, smala, vågiga blad i flera vackra färgskiftningar.

	Aralia; Aralia (Araliaceæ.)	
666	„ <i>japonica</i>	— 30 — —
667	„ <i>racemosa</i>	— 30 — —
668	„ <i>spinosa</i>	— 25 — —

Alla tre utmärkta bladväxter, som under betäckning utthårda vintern på kalljord.

	Artemisia; Gråbo eller <i>Malört</i> , (Eupatoriææ.)	
669	„ <i>annua</i> , ettårig	— 10 — 40
670	„ <i>argentea</i> , silfverbladig	— 30 — —
671	„ <i>gracilis</i> (sp. St Petersburg).	— 10 — 40

A. annua & *gracilis* blifva under sommaren omkring 6 fot höga och hafva ett pyramidalt växtsätt. *A. argentea* blir lägre och kan användas till markerade garneringar o. s. v. samt bör öfverv. vid + 5 à 6° C. och fortpl. genom sticklingar. Fröet af alla sorterna säs i krutor eller bänk.

	Atriplex; Mell ell. <i>Molla</i> (Atriplicææ.)	
672	„ <i>hortensis</i>	— 5 — 5
	En 3 à 4 fot hög växt med mörkröda blad, som fortplantar sig genom sjelfsäd.	

	Balsamita; Frumynta , (Corymbiferaæ.)	
673	„ <i>grandiflora</i> , storblomm.	— 10 — —
	Storbladig, 6 fot hög växt med gula, kokardlika blmr.; tål vintern ute.	

	Barbarea; Cruciferaæ.	
674	„ <i>vulgaris fol. var.</i>	— 10 1 —
	En tvåårig växt, som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till infattningar. Blommar och sätter frö andra året, men blir då oduglig som infattningsväxt, och bör derfor säs hvarje år.	

	Beta; Beta eller <i>Mangold</i> (Atriplicææ.)	
675	„ <i>vulgaris var. brasiliensis</i>	— 5 — 5

	å Port. Ort. Kr. ö. Kr. ö.	
	Behandlas som vanliga rödbeter. Bladstjolkarna variera i flera färger. Kan om hösten inpl. i krutor och användas till dekorationer i bordsnuggor och kalla växthus.	

	Bocconia; Bockonia , (Papaveraceæ.)	
676	„ <i>cordata</i>	— 20 — —
677	„ <i>frutescens</i>	— 25 — —
678	„ <i>japonica</i>	— 20 — —
	Alla tre utmärkta växter m. prydliga, ehuru små blmr.; öfvervintras frostfritt.	

	Bonapartia; Bonap. (Asphodoleæ.)	
679	„ <i>junceæ</i> (<i>Agave geminifl.</i>)	— 40 — —
	Stättlig växt med långa, smala blad	

	Brassica; Kål , (Cruciferaæ.)	
680	„ <i>oleracea variegata</i> , bland.	— 10 — 40
	Palmträd-, jätte- och fjäderkål, användas till prydnadsväxter för sina vackra, brokiga blad.	

	Canna; Blomsterrör , (Cannaceæ.)	
681	„ <i>Annei superba</i>	— 10 — 40
	Bladen lifligt gröna; blommorna ljust skarlaganröda, med punkter och streck.	

682	„ <i>Bihoreli splendens</i> , ny	— 15 — 75
683	„ <i>Bonetii major</i>	— 8 — 30

684	„ <i>Bonetii semperflorens</i>	— 10 — 50
	Bladen mörkgröna, med stark metallglans.	

685	„ <i>coccinea vera</i> , vacker	— 10 — 40
686	„ <i>compacta elegantissima</i>	— 10 — 40
687	„ <i>Deputé Henon</i> , ny	— 10 — 40
688	„ <i>discolor floribunda</i>	— 25 1, 50

	Bladen bruna; blommorna skarlaganröda.	
689	„ <i>discolor violacea</i> , utm.	— 15 — 60
690	„ <i>elegantissima rustica</i>	— 10 — 40

	Bladen gröna, med fina, mörkbruna kanter.	
691	„ <i>floribunda</i> , vacker	— 8 — 30
692	„ <i>gigantea vera</i> , utm.	— 8 — 30
693	„ <i>Hostei</i> , utm. vacker	— 20 1, —
694	„ <i>Marechal Vaillant</i> , ny	— 10 — 40
695	„ <i>musæfolia hybrida</i> , storbl.	— 8 — 30
696	„ <i>Prince imperial</i> , ny	— 25 1, —
697	„ <i>purpurea hybrida</i> , skön	— 10 — 40
698	„ „ <i>spectabilis</i> , utm.	— 10 — 50
699	„ <i>speciosa</i> , vacker	— 10 — 40
700	„ <i>spectabilis</i> , vacker	— 8 — 30
701	„ <i>Warzewiczii</i> , vacker	— 10 — 50
702	„ „ <i>rosea</i> , vacker	— 10 — 50
703	„ <i>Warzewiczoides nobilis</i>	— 10 — 50
704	„ „ <i>nova</i> , brunådrade blad	— 10 — 50
705	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	— 20 1 —

	Ny, vacker, strimmig och fläckig.	
	20 sorter kr. 2,30	
	12 vackra sorter 1,30	

706	„ alla sorter blandade	— 8 — 30
	Cannaartena höra till de vackraste och tacksamaste bladväxter vi ega och utmärka sig dessutom äfven för rätt vackra blommor. De äro mycket lättskötta och kunna öfverv. vid + 10 à 12° C.	

	Cannabis; Hampe , (Urticæææ.)	
707	„ <i>sativus var. gigantea</i>	— 5 — 15
	Ettårig, 6 à 8 fot hög, vacker bladväxt.	

	Centaurea; Klint , (Compos.-Cynareæ.)	
708	„ <i>candidissima</i>	— 40 — —
709	„ <i>gymnocarpa</i>	— 20 — —

Båda arterna hafva rent silfverhvita, vackert formade blad, Att på en fin gräsmatta, hafva

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- små runda sängar, planterade med endast dessa växter, är utm. vackert.
- Cerastium; Cerast.** (Alsineæ.)
- 710 " *Biebersteinii* — 20 1, 80
711 " *tomentosum* — 20 1, 80
Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter, till bildande af girlanger på gräsmattor, infattningar, o. s. v. Tåla vintern ute.
- Chamæpeuse,** (Cichoraceæ.)
- 712 " *Cassebonæ* — 10 1, 25
713 " *diacantha* — 40 —
Trenne tistelartade växter, hvars blad äro ställda rosettliskt och prydda med systematiskt sittande, vitaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och utplanteras om våren i god jord. Se afbildningen.



Chamæpeuse diacantha.

- Chenopodium; Gåsfot.** (Atripliceæ.)
- 714 " *atropicis* — 5 — 30
Ettårig, 1½ fot hög, rödbladig växt. Utsås i bänk och utplanteras sedan.
- Cineraria; Askört.** (Senecionideæ.)
- 715 " *acanthifolia*, vacker, ny — 20 1 —
716 " *argentea populifolia*, ny — 20 1 —
717 " *candidissima* — 30 2, 50
718 " *maritima* — 8 — 40
" öfriga sorter, se modeblommor.
Utm. för vackert formade grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfverv. i tempererad hus.
- Entelea; Entelea,** (Tiliaceæ.)
- 719 " *arborescens*, trädartad — 30 —
Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfverv. i tempererad hus; fortpl. genom steklingar.
- Erianthus; Ullgräs,** (Gramineæ.)
- 720 " *Ravennæ* — 10 1 —
Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydl. blomvippor. Befäckt, und. sträng köld.
- Eucalyptus; Praktmossa.** (Myrtaceæ.)
- 721 " *giganteus* — 20 —
722 " *globulus* — 20 —
Eucalyptusarterna blifva i sitt hemland, Australien, ofta öfver 400 fot höga och räknas därför till verdens största träd. Ofvann. arter, synnerligen E. glob. kunna med fördel anv. i stora bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bakgrunden eller midten, allteftersom gruppen är belägen. Öfverv. i tempererad växthus. Tåla ej att beskåras.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- Ferdinanda,** (Senecionideæ.)
- 723 " *eminens* (Cosmophyllum)
" *caliciaefolium* — 30 —
Uppnår betydlig höjd; bladen stora, ljusgröna, vålluktande. Öfverv. i tempererad växthus.
- Gunnera,** (Urticaceæ.)
- 724 " *scabra* — 30 —
Ståttlig dekorationsväxt med stora antikt form. blad. Pl. bäst i korgar, hvilka om sommaren nedsänkas i lös, fet jord och om hösten åter upptagas för att frostfritt förvaras.
- Gynnerium; Pampasgräs,** eller *Prairiegräs,* (Gramineæ.)
- 725 " *argenteum* — 15 —
726 " " *fol. var.* — 25 —
727 " " *kermesinum* — 30 —
728 " " *violaceum* — 15 —



Gynnerium argenteum.

- Obestr. de ståtl. och vackraste af alla kända gräs. De tre sistnäm. äro ytterst praktfulla. Behandlas som Gunnera. Se afbildningen.
- Helianthus; Solros,** (Senecionideæ.)
- 729 " *argyrophyllum*, silfverbl. — 5 — 40
730 " *macroph. gigant.*, stor — 5 — 20
Ettåriga växter. Den sistnämnda är 10 à 15 fot hög och har ofantligt stora blommor. Fröet sås direkte på fritt land.
- Heracleum; Björnsfoka** eller *Herkulesört,* (Umbellifereæ.)
- 731 " *eminens* — 5 — 10
732 " *giganteum* — 5 — 10
Jättelika växter med ofantligt stora, antika blad och väldiga blomlockar. Blifva ofta 10 à 12 fot höga. Fröet ligger ofta ett år i jorden innan det gro.
- Holcus; Hirs,** (Gramineæ.)
- 733 " *saccharatus; sockerhirs,* — 5 — 10
5 à 6 fot hög. Vacker i bladgrupper. Behandlas som majs; se vidare ekonomiväxter.
- Knautia; (Dipsaceæ.)**
- 734 " *montana* — 25 —
Flerårig, 10 à 12 fot hög växt med gula skabiosalika blommor. Vacker såsom mitelväxt i bladgrupper.
- Melanthus; Honungsblomster;** (Rutaceæ.)
- 735 " *major*, stor — 30 —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Vacker bladväxt, som under sommaren kan utplanteras i det fria; öfverv. vid + 6 å 80 C. Fordrar kraftig jord och riklig vattning.

Nicotiana; Tobak, (Solanaceæ.)

- 736 " *glauca* — 8 — 40
737 " *Tabacum macrophylla*
var. *gigantea* — 5 — 10
738. " " *purpurea grandiflora*. — 5 — 20
Alla äro ettåriga och taga sig väl ut bland bladgrupper; synnerligen utm. äro *macroph.* och *purp. grandifl.* Fröet utsås i bänk och pl. utsätas sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmån. Se vidare ekonomiväxter.

Perilla; Perilla, (Labiatae.)

739. " *arguta* (nankinensis) . . . — 5 — 20
740. " *nankinensis fol. atropurpureis laciniatis* — 5 — 25
Ettåriga omkr 1½ fot höga växter. Den första har bruna, metallglänsande blad. P. n. *atropurp. lacin.* har mörkare, fransade blad, och är mycket vacker. Se afbildningen.



Perilla nankinensis.

Pyrethrum; Batramsört, (Senecionideæ.)

741. " *parthenifolium, aureum* . . . — 15 1,50
" öfriga sorter, se fleråriga blomsterv.
En utmärkt skön 6 tum hög infattningsväxt med friskt, gulgrönt bladverk och nätta, hvitablmr. Kan ej nog rekommenderas till garnering kring blomster- & bladväxtanordningar på finare gräsmattor.

Rheum; Khabarber, (Polygoneæ.)

742. " *crassinervium* — 8 — 40
743. " *oleraceum* — 10 — —
744. " *undulatum* — 5 — 10
745. " " *Queen Victoria* — 5 — 10
Alla särdeles vackra, isynnerhet som fristående eller gruppvis förenade på vackra gräsmattor. Se vidare: sparrisväxter.

Ricinus; Underträd, (Euphorbiaceæ.)

746. " *africanus* — 10 — 20
747. " *atrosanguineus, ny* . . . — 20 — 40
748. " *bourboniensis arboreus* — 15 — 30
749. " *communis* — 8 — 15
750. " " *minor* — 5 — 10
751. " *elegantissimus* — 15 — 30
752. " *giganteus glaucus, ny* . . . — 20 — 40
753. " *purpureus, major* — 10 — 20
754. " " *minor* — 10 — 20
755. " *roseus, rosenröd* — 10 — 25
756. " *sanguineus* — 5 — 10

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

757. *Ricinus sanguineus minor* . . . — 8 — 15
758. " *sanguineus tricolor* . . . — 8 — 15
Alla 13 sorterna kr. 1,35.
759. " blandade vackra sorter. — 10 — 20
Alla sorterna äro ettåriga och blifva 5 å 6 fot höga. Böra utsås i Mars eller början af April. Odlas i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de småningom vänjas vid den yttre luften. Utpl. i Juli på varma ställen i fet jord. Höra till de tacksammaste och ställ. bladväxter för fritt land. Se afbildningen.



Ricinus major.

Salvia; Salvia, (Labiatae.)

760. " *argentea* (S. *ætiopis atlantica; candidissima*) . . . — 10 — 50
Vacker; har stora hvita blad; öfverv. frostfr.

Selinum; (Umbelliferae.)

761. " *decipiens* (Melanoselin.) — 25 — —
En präktig, palmlik växt. Öfverv. vid + 50 C. Fröet groor ett år efter seningen.



Solanum laciniatum.

Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)

762. " *arboreum* utmärkt — 35 — —
Hvita, doftande blmr; röda frukter.
763. " *atropurpureum* — 8 — 40
764. " *Balbisii* (S. *viscosus*;
inflatum eller *decurrens*) — 8 — 40
765. " *citrullifolium, (violaceum)* — 8 — 40

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

766. *Solanum corniculatum* . . . — 10 1 —
767. " *Fontanesianum* . . . — 10 1 —
768. " *laciniatum*, (pinnatifid.) — 8 — 40
769. " *marginatum* — 15 1 —
770. " *reclinatum* — 15 1 —
771. " *robustum*, praktfull . . . — 20 — —
772. " *verbascifol.* (bahamense) — 20 — —
773. " *Warzewiczoides* — 35 — —

De här anförda sorterna af detta intressanta och högst talrika släkte utmärka sig alla, såväl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt som för sina prydliga blmr. I bladväxksamlingar äro de af stor nytta. De flesta af dessa sorter kunna fortpl. genom sticklingar och öfverv. vid vanlig kammarvärme. På fritt land fordra de varma skyddade ställen och god jord. Se afbildn. å föreg. sida.

Sorghum, se Holcus.

Stachys; Stinknässla, (Labiatae.)

774. " *lanata* — 15 — —
Flerårig frilandsv. med hvita blad; anv. till infattningar; blomstänglarne böra afskräras.

Suaeda; (Chenopodiace.)

775. " *dendroides* — 15 — —
En ny, ettårig ntm. prydnadsväxt, lätt att odla. Den har pyramidformigt, cypresslikt växtsätt och blir omkr. 8 å 10 fot hög.

Teleckia eller Bupthalmum;
(*Oxöga, (Corymbifereae.)*)

776. " *cordifolia* hjertbladig . . . — 8 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Flerårig, 6 å 8 fot hög med stora, ljusgröna blad och gula blommor.

Wigandia; Vigandia (Convolvulaceae.)

777. " *caracassana* — 35 — —
778. " *Vigierii* — 35 — —

Praktf. bladv. Fröet sås i krukor och betäckes föga eller allsintet. Pl. uppdr. i bänk och öfverv. vid + 12 å 17° C. nära glaset.

Zea; Turkiskt hvete, (Gramineae.)

779. " Mays var, *caragua* — 8 — 10
780. " " fol var. (*Z. japonica*) — 8 — 10
781. " " *gracilima, Miniatur-*
Mays, utm. vackr. — 8 — 10
782. " " amerikansk hästtand- — 5 — 5
783. " " brun Badensisk — 5 — 5
784. " " gul Badensisk — 5 — 5

Alla 6 sorterna 35 öre.

Maysen användes allmänt såväl i större som mindre grupper. Den förstn. uppår en höjd af 6 å 7 fot; *Z. japonica* deremot endast omkring 2 fot, men är utmärkt för sina vackra, hvitrandiga blad. Fröet utsås någorlunda tidigt i kruka, hvarefter plantorna omskolas och vårdas under glas i en ljum bänk, till dess de skola planteras på fritt land.

Då urvalet oinskr. anförts åt oss, lemnas:

- 50 sorter vackra bladväxter (frö) 5 kr.
25 " " " " 2 " "
12 " " " " 1 "

III. Frö till Dekorationsgräs.

(Familj: Gramineae.)

Nedannämnde gräsarter kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som fristående på gräsplaner, i buketter, o. s. v. De flesta fordra en något fuktig, god jordmån och mot den starkaste solhettan skyddade ställen.

A. Ettåriga gräsarter;

Agrostis; Hven.

785. " *dulcis* — 5 — 20
786. " *nebulosa* — 10 — 60
787. " *pulchella* — 5 — 20

Till garnering, planter, i småkrukor o. s. v.

Anthoxanthum; Vårbrodd.

788. " *gracilis* — 5 — 25

Vackert garneringsgräs.

Avena; Hafre.

789. " *sterilis*, intressant gräs — 5 — 15

Brachypodium; Axsvingel.

790. " *distachyum* — 10 — —

791. " *platystachyum* — 8 — 40

Briza; Darrgräs.

792. " *geniculata* — 10 — 60

793. " *maxima* — 5 — 25

794. " *minima* — 5 — 25

Alla sorterna vackra i buketter.

Brizopyrum; Darrax.

795. " *siculum* — 5 — 35

Vacker till infattningar.

Bromus; Losta.

796. " *briziformis* — 5 — 10

797. " *lanuginosus* — 5 — 20

798. " *patulus* — 5 — 20

Allasamman utmärkt vackra i buketter.

Chloris; Strålräs.

799. " *cuticulata* — 8 — 40

800. " *elegans* — 8 — 40

801. " *polystachya* — 8 — 40

Vackra egendomliga gräs: för fröets groning fordras mycken värme och fuktighet.

Chrysurus; Guldsvans.

802. " *cynosuroides* (Cyn. aur.) — 5 — 25

Coix; Tårgräs.

803. " *chinensis* — 8 — 40

804. " *exaltata* — 5 — 20

805. " *Lacryma, Jobs tårar.* — 5 — 15

Allasamman vackra och intressanta: fröet liknar vattendroppar. Se afbildn. å nästa sida.

Eleusine; Eleusingräs.

806. " *coracana* (Cynosurus) — 5 — 20

807. " *indica* (Chloris repens;
Cynosurus pectinatus) — 10 — 80

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

808. *Eleusine oligostachya* . . . — 5 — 20
Eragrostis; Kärleksgräs.
 809. „ *amabilis* . . . — 10 — —
 810. „ *cylindrica* (Poa cylindr.) — 10 — 60
 811. „ *elegans* . . . — 8 — 20
 812. „ *namaquensis* . . . — 10 — 60
 813. „ *Purshii* (Eragr. diandra.) — 10 — 60
 Umärkt fina, vackra gräs, som äfven kunna odlas i krukor och användas till prydnad på blomsterbord, o. s. v.



Coix Lacryma.

- Hordeum; Korn.**
 814. „ *jubatum* . . . — 8 — 30
Lagurus; Harsvans.
 815. „ *ovatum* . . . — 5 — 20
 816. „ „ *compactus* . . . — 10 — 40
Panicum; Åkerhirs.
 817. „ *altissimum* . . . — 8 — 40
 818. „ *colonum* . . . — 5 — 20
 819. „ *cruscorvi*, *Kråkfot.* . . . — 8 — 40
 820. „ *crusgalli*, *Tuppfot.* . . . — 8 — 40
 821. „ *oryzoides* . . . — 10 — 70
 De båda förstnämnda arterna äro högväxta och passa väl till grupper.
Penisetum; Fjädergräs.
 822. „ *longistylum* . . . — 8 — 40
 823. **Stearia japonica** . . . — 10 — 50
 824. „ *macrocheta* . . . — 8 — 40
 825. „ *persica* . . . — 5 — 20
 Vackra till större grupper.
 Zea, Mays, se blad- & ekonomiväxter.
 826. **Gräsarter, blandade, vackra till buketter, prö. 10 kr.** — 5 — 15
B. Fleråriga gräsarter:
Agrostis; Heen.
 827. *argentea* . . . — 15 — 80
Andropogon; Skägg-gräs.
 828. „ *giganteus* . . . — 15 — 80
 829. „ *provincialis* . . . — 8 — 50
Arundo; Rör.
 830. „ *Donax; Jätterör.* . . . — 15 — 90
 831. „ *festucoides aurea* var. — 20 — —
 Den förstnämnda uppstår, om den planteras fritt i ett kallt växthus, 14 à 18 fots höjd.

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- Bromus; Losta.**
 832. „ *Gussonii* . . . — 5 — 30
 833. „ *longiflorus*, 4 fot hög . . . — 5 — 20
 834. „ *secalinus giganteus* . . . — 5 — 20
 Högväxta gräsarter, hvars blomvippor äro särdeles vackra i buketter.
 835. **Chloropsis blanchardiana** 10 — 50
 Prydligt gräs med rosenröda ax
 836. **Diplachne, fascicularis** (Leptochloa polystachya) — 8 — 25
Elymus; Elm.
 837. „ *arenarius, Sandelm.* . . . — 5 — 15
 838. „ *canadensis* . . . — 5 — 20
 839. „ *Caput Medusæ* . . . — 8 — 25
 840. „ *crinitus* . . . — 10 — —
 841. „ *giganteus* . . . — 5 — 20
 842. „ *glaucifolius* . . . — 10 — —
 843. „ *Hystrix* . . . — 5 — 20
 Storväxta gräs till grupper.
Erianthus; Ullgräs.
 „ *Ravennæ*; se bladväxter.
 844. „ *violascens* . . . — 15 — —
 Stora gräsarter; betäckas vid stark frost.
Festuca; Svingel.
 845. „ *stipoides* . . . — 10 — —
 846. „ *viridis* . . . — 5 — 20
 Vackra gräsarter, egna sig särdeles väl till infattningar, sås på kalljord.
 847. **Gymnothrix japonica** — 15 1 — —
 848. „ *latifolia*, 6 à 7 fot hög — 25 — —
 Mycket vackra och dekorativa.
 Gynnerium, se bladväxter.
 849. **Lasiagrostis argenteus** — 10 — 60
 Särdeles vacker; har silverhvita blomvippor.
Melica; Perlgräs.
 850. „ *altissima*, silfvervit . . . — 10 — 60
 851. „ *exasperata* . . . — 8 — 40
 Umärkt vackra i buketter, o. s. v.
Panicum; Åkerhirs.
 852. „ *plicatum* . . . — 20 — —
 853. „ *sulcatum* . . . — 10 — 80
 Utm. sköna, tropiska gräsarter med breda, veckade, palmlika blad. Odlas i krukor och öfverv. vid + 10 à 15° C. Förträffliga till dekorerung på blomsterbord o. s. v.
 854. **Paspalum elegans** . . . — 8 — 50
 Öfvervintnas som förstående; kan utplanteras i det fria under sommaren.
Stipa; Fjädergräs.
 855. „ *capillata* . . . — 18 — 40
 856. „ *elegantissima* . . . — 20 — —
 857. „ *gigantea* . . . — 8 — 40
 858. „ *pennata* . . . — 8 — 50
 859. „ *splendens* . . . — 8 — 50
 860. „ *tortilis* . . . — 8 — 40
 Alla arterna höra till de finaste gräsen och äro vackra i buketter. Se afbildn. å nästa sid.
 Då urvalet önskr. anförtros åt oss, lemnas:
 25 sorter ettåriga gräsarter (frö) — 1, 50
 12 „ „ „ „ — 20 — —
 25 „ fleråriga „ „ — 2 — —
 12 „ „ „ „ — 1 — —

IV. Frö till Slingerväxter:

Åf nedannämnde slingrande växter böra alla de, hvarom ej annorlunda föreskrifves, utsås i kruka eller driftbänk och i Juni utplanteras på de för dem afsedda platserna på kalljord.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Abobra; Spaltrefva, (Cucurbitaceæ.)

861. „ viridiflora — 25 — —
Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna; blmrna gröna, välukt.; frukterna röda. Passar till beklädnad af mindre éspalier, flätverk o. d. Öfverv. vid + 6 å 8° C.

Ampelopsis; Jungfruvin eller Vildvin, (Vineriferae.)

862. „ hederacea — 5 — 10
Hastigt växande, omtyktslingerväxt. Præktig till bekl. af lusthus, éspalier, murar o. d. Tål vintern och fortpl. gen. sticklingar.

Bignonia eller Tecoma; Trumpetblomster, (Bignoniaceæ.)

863. „ radicans — 15 — 75
Snabbväxande med prakfulla, orangegulva blommor. Utgår vintern i södra Sverige och bör planteras vid en mot solsidan liggande mur. I kallt växthus bör den planteras fritt, för att trivas väl.



Stipa pennata.

Bryonia; Hundrofva, (Cucurbitaceæ.)

864. „ alba — 5 — 30
Bekant slingerväxt. Förträfflig att bekläda större föremål. Tål vintern; fortplantas ofta genom utfallande frö.

Bryonopsis; (Cucurbitaceæ.)

865. „ erythrocarpa — 15 — 75
Vacker med skarlakaröda frukter af ett körsbärs storlek.

Cajophora; Fackelbärare, (Loaceæ.)

866. „ lateritia (Loasa lateritia) — 10 — —
867. „ Herbertii — 10 — —
Ettåriga, medelhöga sligerv. med märkvärdiga orange- eller skarlakaröda blommor.

Calampelis; (Bignoniaceæ.)

868. „ scaber — 15 — —
Prakfulla skarlakaröda blmr. Passar till beklädnad af mindre éspalier, korgar o. s. v. Förvaras torr öfver vintern.

Celastrus; Celaster, (Celastrineæ.)

869. „ scandens — 15 — —
Trädartad växt; användbar till beklädnad af pelare, o. s. v. Tål vintern och kan förökas genom afläggare eller sticklingar.

Cobæa; (Bignoniaceæ.)

870. „ scandens — 20 2, 50
871. „ „ albiflora — 35 — —

Hastigt växande, vackra med klockformiga stora blmr. Odlas i temp. växthus, men kunna under sommaren utplanteras i det fria.

Coccinia; Rödrefva, (Cucurbitaceæ.)

872. „ indica (Bryonia grandis) — 30 — —
Hastigt växande, till bekl. af murar och andra större föremål utm. väl passande växt med mörkgröna blad och hvita blmr. Förökas lätt med stickl. hvilka öfvervintras i växthus eller boningsrum.

Cucumis; Gurka, (Cucurbitaceæ.)

873. „ Grossularia — 15 — —
874. „ prophetarum, Prophetgurka — 15 — —

Ettåriga, gurkartade växter.

Cucurbita; Pumpa; Gräskar eller Kurbits, (Cucurbitaceæ.)

875. „ Anguriepumpa — 10 — 30
876. „ Courge gouffré — 10 — 40
877. „ gul jätte-melompumpa — 10 — 40
878. „ Herkulesklubba — 10 — 25
879. „ Centnerpumpa — 10 — 30
880. „ Flaskpumpa — 10 — 25
881. „ Apelsinpumpa — 10 — 40
882. „ Pomeranspumpa — 10 — 40
883. „ Turbanpumpa — 10 — 30
884. „ Biskopsmössa, fl. sorter — 10 — 40
885. „ Pilgrimsflaska — 10 — 30
886. „ Valparaisopumpa — 10 — 40
887. „ digitata — 15 — —
888. „ perennis — 15 — —
889. „ blandade sorter, *H.* 6 kr. — 5 — 10
12 olika sorter kr. 1 — 6
6 „ „ — 50

Lämpliga till bekl. af pelare, lusthus m. m. Den sistn. tål vintern ute endast under god betäckning; se vidare bland köksväxterna, under rubriken gurkartade växter.

Cyclanthera; Flikrefva, (Cucurbitac.)

890. „ explodens — 10 — 80
891. „ pedata — 5 — 30

Ettåriga, mycket hastigt växande med vackert löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstn. vid lindrigaste beröring öppnar sig och våldsamt utkastar kärnorna. Sås på kalljord.

Echinocystis; (Cucurbitaceæ.)

892. „ lobata — 20 — —
Utm. slingerväxt hvarmed man på kort tid kan öfvertäcka lusthus, staket, murar o. s. v. Har fömlikiga blad och talrika hvita, väluktande blmr. Frukten är af ett duffägg storlek. Fröet sås på kalljord.

Glycine; (Papilionaceæ.)

893. „ chinensis, 4 st. frö — 60 — —
Prakfull trädartad växt för kalljord. Har ljusblå, utm. vackra, i rika klasar hängande blmr. Fordrar ett varmt, skyddat läge, god jord och betäckning under vintern.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Gronovia; (Cucurbitaceæ.)

894. „ *Humboldtii* — 40 — —
Vacker, mycket snabbt växande; prydligt löf-
verk och en mängd gula blommor.

Involucraria; (Cucurbitaceæ)

895. „ *Lepiniana*, 5 frö — 75 — —
Praktfull nyhet till bekl. af lusthus m. m.
Frukterna äro mörkröda, af hönsäggs storlek.

Ipomea; *Blomman för dagen*,
(Convolvulaceæ.)

A. Ettåriga:

896. „ *bona nox* (Calonyction
speciosum) — 5 — 20
897. „ *coccinea* (Quam. cocc.) — 5 — 15
998. „ *hederacea atrovioleacea*
(Pharbitis; Ip. barbata) — 5 — 25
899. „ *hederacea superba* — 5 — 25
900. „ *limbata* (Pharb. limb.) — 5 — 15
901. „ *mexicana* (violac. vera) — 10 — 50
902. „ Nil (Pharb. eller Ip. coerulea;
Ip. triloba; Pharb.
scabra & punctata) — 5 — 20

B. Fleråriga:

903. „ *digitata* (Convolvulus dig.)
purpuröda blommor — 15 — —
904. „ *ficiifolia* (Ip. bonariensis;
Conv. Hookerian.) prakt-
fulla, purpuröda blmr — 15 — —
905. „ *Hardingii*, st. lilaf. blmr — 25 — —
906. „ *Learii* (Pharbitis) pur-
puröd — 25 — —
907. „ *rubro coerulea* utmärkt — 25 1, 50
908. „ „ *coerulea*, alba, utm. — 30 2 —
7 sorter ettåriga 35 öre.
6 „ fleråriga kr. 1, 25.

Alla dessa arter hafva praktf. blmr. hvilka
öppna sig om morgnarna och vara endast för
en dag. Ip. bona nox gör dock härifrån ett
undantag; dess stora, praktf. blmr. öppna sig
mot aftonen. Alla de ettåriga arterna odlas
ute, hvaremot de fleråriga, som härstamma
från tropiska trakter, böra öfverv. vid + 10
å 15° C. och höra till växthusens skönaste
slingerväxter. Se afbildningen.



Ipomea hederacea.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Lapageria; (Philesiaceæ.)

909. „ *rosea*, 3 frö — 60 — —
En af de vackraste rankväxter för växthus
eller boningsrum; har sköna, rosen- eller
carmosinröda, lifjelika blommor.

Lathyrus; *Artblomster*, (Leguminosæ.)

A. Ettåriga:

910. „ *azureus*, blå — 5 — 10
911. „ *clymenum*, röd, hv. & blå — 5 — 10
912. „ *luteus*, gul — 5 — 10
„ *odoratus*, se Modeblmr.
913. „ *speciosus*, röd — 5 — 10
914. „ *tingitanus*, mörkröd — 5 — 10
915. „ *blandade* — 5 — 10
5 sorter ettåriga 20 öre.

B. Fleråriga:

916. „ *grandiflorus*, röd, stor — 25 — —
917. „ *latifolius*, röd — 10 — 40
918. „ „ *albus*, hvit — 20 — —
919. „ „ *roseus*, rosenröd — 10 — 40
Såväl de ett- som fleråriga sorterna äro my-
cket vackra och tacksamma slingerväxter.

Lophospermum; *Kamfrö*, (Scro-
phulariaceæ.)

920. „ *scandens* — 30 — —
Särdeles vackra blmr. som trivas väl äfven i
boningar. De köttiga rotknölarne böra ej
vattnas under vintern. Om våren kunna de
omplanteras i frisk jord och begagnas till att
bekläda mindre föremål. Se afbildningen.



Lophospermum scandens.

Maurandia; (Scrophulariaceæ.)

921. „ *antirrhinifl.*, blå m. hvitt — 15 — —
922. „ *Barclayana*, violett — 15 — —
923. „ *Laceyana*, blåaktigt ro-
senröd — 15 — —
924. „ *purpurea grandifl.*, stor-
blmig, purpuröd. utm. — 15 — —
925. „ *semperfl.*, blåakt. röd — 15 — —
Alla 5 sorterna 70 öre.

926. „ *blandade* sorter — 15 — —
Dessa utm. nätta och prydliga växter egna
sig förträfl. till amplar, infattningsfätker,
blomsterkorgar o. d. De äro lätta att odla
och blomma mycket tacksamt. Öfvervintras
i boningsrum eller tempererad växthus. Se
afbildningen å nästa sida.

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.



Maurandia.

Melothria; (Cucurbitaceæ.)

927. " cucumerina — 5 — —
928. " pendula — 8 — —
Slingerv. med små, prydliga svartgröna frukter och vackra blad. Passa väl till bekl. af höga törnosstammar, häng. guirlander o. s. v.

Momordica; Balsangurka, (Cucurbitaceæ.)

929. " Balsamina — 15 — —
930. " Charantia — 15 — —
Vackra, intressanta slingerväxter för varma växthus och boningsrum; ha vackra skarlakaröda frukter.

Mukia; (Cucurbitaceæ.)

931. " scabrella — 15 — —
Präktig med hjertformiga flåkiga blad och röda frukter.

Periploca; (Asclepiadææ.)

932. " græca — 15 — —
Trädartad slingerväxt för fritt land.

Phacelus; Böna. (Leguminosæ.)

933. " multiflorus, rödblommig — 5 — 5
934. " bicolor, röd m. hvitt — 5 — 5
Fröet säs på kalljord.

Rhynocarpa; (Cucurbitaceæ.)

935. " dissecta — 25 — —
936. " foetida — 25 — —
937. " Gerardii — 25 — —
Smärre slingerväxter med inskurra, nästa blad och skarlakaröda frukter. Passa till små flätverk, korgar, o. s. v.

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Scyphanthus; Skälblomster, (Loacææ.)

938. " elegans (Grammatocarpus volubilis) — 30 — —
Vacker ettårig växt med sköna, underbart formade blommor. Fordrar varma och lugna ställen på kalljord.

Sicyos; Hårgurka, (Cucurbitaceæ.)

939. " angulata — 5 — 20
Ettårig; användes att bekl. större föremål.

Sicyosperma; Skärmrefva, (Cucurbitaceæ.)

940. " gracile — 20 — —
Som föregående; bladen 3—5 flåkiga; hvitaktiga blommor och svarta frukter, förökar sig ofta genom sjelfsådd.

Thladiantha; Gulrefva, (Cucurbitacæ.)

941. " dubia — 40 — —
Mycket praktf. slingerväxt för kalljord; har talrika, gula, något klocklika blommor. Fordrar god jord, varmt läge och löfoätkning under barfäst.

Thunbergia; (Acanthaceæ.)

942. " alata, blekgul med svart — 15 — —
943. " " alba, hvit med svart — 15 — —
944. " " aurantiaca, guldgul med svart svalg . . . — 15 — —
945. " " Barkerii, rent hvit — 15 — —
946. " " blandade — 15 1, 25
Präktfulla för mindre äspalier, amplar och blomsterkorgar; böra ej utplanteras i det fria för än sommarvärmnen är pålitlig, på lugna, skuggrika platser.

Trichosanthes; Ormgurka, (Cucurbitaceæ.)

947. " anguinea — 10 — 25
948. " colubrina — 10 — 50
Odlas som drifgurkor; de smala, ormlika frukterna blifva ofta 1½ å 2 fot långa; se äfven köksväxter.

Tropæolum; Krasse, (Tropæoleææ.)

949. " canariense — 15 — 50
" majus, Lobb. & minus, se Modeblommor bland sortimenterna.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

50	sorter vackra slingerväxter (frö)	kr. 5,50
25	" " " " " "	3 —
12	" " " " " "	1,50
12	" " höga slingerväxter	1 —
12	" " medelhöga "	1,25
12	" " låga "	1,50

V. Frö till ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför slägtnamnet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras sedan i slutet af Maj eller i början af Juni på fritt land. Alla de öfriga, obetecknade sorterna säs på kalljord så tidigt som möjligt och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

*** Abronia; (Nyctaginææ.)**

950. " umbellata, m. gult svalg — 8 — 50
Välluktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar m. m. Är ömtålig för rött och fuktigt väder.

*** Acroclinium; (Senecionidææ.)**

951. " roseum, rosenröd . . . — 5 — 15
952. " " fl. alba, hvit . . . — 5 — 15
Vackra immorteller; fördra sol och en varm, sandblandad jordmån. Se afbildn. å nästa sida.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Adonis; Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ.)

953. " æstivalis, tidig — 5 — 8
954. " autumnalis, pr. 4 kr. — 5 — 8
Vackert, fint löfverk och röda blommor. Se afbildningen på omslagets sista insida.

* **Ageratum;** Lefverbalsam, (Eupatorineæ.)

955. " mexicanum, blå — 5 — 30
956. " " albifl. nan., hvit, låg — 10 — —
957. " " nanum, lågväxt — 10 — —
Vackra för krukor och i grupper; fordra kraftig jord och mycket sol.



Acroclinium roseum.

Agrostemma; Klätt eller Akerkrans, (Caryophyllææ.)

958. " cœli rosa, Himmelsrosen — 5 — 15
959. " " rosa fimbriata nana, låg, vacker — 10 — 60
960. " " " fl. pl. dubb., utm. — 15 — —
Små nätta växter med vackra, röda och vita blmr. Fröet af den sistn. lemnar omkring 6 å 10 % väl fyllda, sköna blommor.

* **Alonsoa;** (Scrophulariaceæ.)

961. " incisæfolia var. grandifl. (Hemimeris) — 5 — 30
962. " Warszewiczii — 8 — 50

Vackra, skarlakanröda blmr. Kunna äfven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 å 8° C. Utplanterade i det fria, lemna de hela sommaren en mängd blommor och få meget frö.

Amaranthus; Råfsvans, (Amaranthaceæ.)

963. " Abyssinicus — 25 — —
964. " caudatus — 5 — 10
965. " " viridis, grön — 5 — 10
966. " " cruentus, mörk — 5 — 10
967. " " monstrosus — 5 — 10
968. " " sanguineus, blodröd — 5 — 10
" öfriga sorter, se bladväxter

Alla 6 sorterna 40 öre.

Den förstn. är en vacker nyhet, trädartad och mycket dekoratif. Dessa egendomliga växter kunna alla användas; äfveni bladgrupper. Fröet kan utsås om hösten.

Ammobium; (Senecionideæ.)

969. " alatum — 5 — 20

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Eternell med hvita blmr. som användas till buketter, o. s. v. Blommorna böra aftagas medan de äro halfspruckna.

* **Anagallis;** Arfve, (Primulaceæ.)

970. " grandifl. carnea, köttfärg. — 10 — —
971. " " coccinea, skarlakanr. — 10 — —
972. " " coerulea, blå — 10 — —
973. " " cupreata sanguinea, kopparfärgad, vacker — 10 — —
974. " " Eugenie, blå — 10 — —
975. " " Napoleon III, brunr. — 10 — —

Alla 6 sorterna 50 öre.

Allesammen, äro hybrider af *A. collina* & *Monelli*. De utmärkas sig för talrika, vackra blmr. och äro särdeles passande för umsodling. Omplant. om våren i god och lätt jord. Se afbildn.



Anagallis grandiflora.

* **Anthemis;** Åkerkulla, (Senecionideæ.)

976. " arabica (Cladanthus pro-liferus) — 5 — 25
2 å 3 fot hög grupp- eller rabattväxt med gula, vackra blommor.

Antirrhinum majus, se modeblommor.

* **Arctotis;** Björnöra, (Cynareæ.)

977. " breviscapa — 10 — —
Något trädartad med vackra, gula blmr. Kan öfverv. inomhus och forplantas med sticklingar. Utplanteras om våren på soliga rabatter, i mager jord

Artemisia, se bladväxter.

* **Asperula;** Madra, (Rubiaceæ.)

978. " setosa — 5 — 15
Präktig, långa blommande, väluktande gruppväxt med blå blommor.

* **Aster;** Aster eller Stjernblomster, (Asteroideæ.)

979. " tenellus (Felicja; Kaulfussia ciliata) — 8 — 50
" öfriga sorter, se modeblommor.
Ski lers sig betydligt från de vanliga, bland modeblommorna anförda astersorterna; blommorna äro violetta med gul disk; passar till små grupper och infattningar.

Atriplex, se bladväxter.

* **Bartonia;** (Loasææ.)

980. " aurea — 5 — 20
Vacker. 1 å 2 fot hög decorationsväxt med guldgula, af 5 orangefärgade fläckar prydda blmr.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Ömfåliga för starka regnskuror, hvarföre några exemplar böra odlas i krukor.

Beta, se bladväxter.

* **Bidens**; *Brunskära*, (Senecionideæ.)

981. „ *astrosanguinea* (Dahlia Zimapanii) — 15 — —
1 å 1½ fot hög med vackra svartröda blmr, användbar för rabatter. Växten bilda rotknölar som kunna öfvervintras i sand, torrt och frostfritt samt om våren utplanteras.

* **Blitum**; *Smultronspenat*, (Chenopodiaceæ.)

982. „ *capitatum* — 5 — 40
Denna växt är af värde endast för sina, i bladvinklarna sittande, smultronlika frukter.

* **Brachycome**; (Asteroidæe.)

983. „ *iberidifolia*, blå — 10 — 60
984. „ „ *alba*, grandifl., hvit — 10 — 60
985. „ „ *rosea*, röd — 20 — —
1 å 1½ fot höga, till infattningar passande växter med cinerarielika blommor.

* **Brevallia**; (Scrophulariaceæ.)

986. „ *abreviata*, skön, röd — 25 — —
987. „ *elata*, blå, storblommig — 10 — —
Omkring 1 å 1½ fot höga, isynnerhet för krukodling passande växter.

* **Cacalia**; (Senecionideæ.)

988. „ *sonchifolia* (Emilia sonchifolia) — 8 — 40
989. „ „ *lutea*, orangefärgad — 8 — 40
1½ å 2 fot höga, till grupper och rabatter passande växter: vackra i buketter.

Cajophora (Loasa), se slingerväxter.

* **Calandrinia**; (Portulacæe.)

990. „ *grandiflora* — 8 — 50
991. „ *speciosa* — 8 — 50
992. „ *umbellata* (Talinum; eller Portulaca prostrata) — 10 — 80
Ha fina prydliga, rösenöda blmr; kunna med fördel odlas i boningsrum och öfverv. frostfritt.

* **Calceolaria**; *Toffelblomster*, (Scrophulariaceæ.)

- „ *hybrida*, se modeblommor.
993. „ *pinnata* — 15 — —
994. „ *scabiosæfolia* — 10 — —
995. „ *california* — 8 — 50
Af 1½ å 2½ fots höjd. Blommorna gula, talrika; vackra till grupper och infattningar.

Calendula; *Ringblomster* eller *Solsicka*, (Cynareæ.)

996. „ *hybrida* — 5 — 15
997. „ *officinalis* ranunculoides — 5 — 15
998. „ „ *superba* — 5 — 15
999. „ *pluvialis*, *Regnvisaren* — 5 — 15
1000. „ „ *Pongeei* fl. pl. dubbel — 8 — 40
C. hybr. & pluvialis ha hvita blmr. Densare formerna af C. off. utm. sig för v. eker byggnad och lifliga, i gult och orange varier. färger. Förtjenta af uppmärksamhet. Se afb. dningen på inslagets sista insida.

Calliopsis ell. **Coreopsis**; *Skönhetsöga*, (Senecionideæ.)

1001. „ *bicolor* (Coreopsis tinctoria) — 5 — 20
1002. „ „ *maculata* — 5 — 30
1003. „ „ *nana*, låg — 5 — 30

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1004. **Calliopsis bicolor nana**
marmorata — 5 — 30
1005. „ *bicolor nana purpurea* — 5 — 30
1006. „ „ *nigra speciosa* — 5 — 20
1007. „ „ *splendens* — 5 — 20
1008. * „ *cardaminifolia* — 8 — 40
1009. * „ *coronata* — 8 — 40
1010. * „ *Drummondii* — 5 — 20

Alla 10 sorterna 50 öre.

Alla sorterna äro utm. praktblm., väl förtjenta af att odlas på grupper, rabatter och i krukor. De talrika, på långt afstånd lysande blmnna variera i gult och brunt. De låga sorterna blifva 1 å 2, de högväxta 3 å 6 fot höga.

* **Callirhoe** ell. **Nuttalia**; (Malvac.)

1011. „ *pedata* — 10 — 80
1012. „ „ *nana* — 10 — 1—
1013. „ *verticillata* — 10 — 1—
Vackra gruppv., m. talrika, lifl., rosenr. blmr.

Campanula; *Klockblomster* eller *Blåklocka*, (Campanulaceæ.)

1014. * „ *attica*, låg, blå, rikblmig — 10 — 80
1015. * „ *Loreyii*, blå och hvit — 10 — 70
1016. „ *speculum*, *Venusspiegel* — 5 — 20
1017. „ „ fl. albo, hvit — 5 — 20
1018. „ „ fl. lilacino, gredelin — 5 — 20
1019. „ „ *grandiflora*, blå — 5 — 20
1020. „ „ „ *alba*, hvit — 5 — 20
1021. * „ *stricta*, ljusblå — 10 — —

Alla 8 sorterna 50 öre.

Ettåriga, mycket vackra som kantblm till större och mindre grupper. Fröet till en del sorter är mycket fint, hvarför man bör vara försigtig, att det ej säd djupt.

Cannabis, se bladväxter.

* **Capsicum**; *Spansk pepp.*, (Solanac.)

1022. „ *annuum*, blandade — 5 — 10
Odlas för dess vackra och användbara frukter.

Centaurea; *Klint*, (Cynareæ.)

1023. * „ *americana* — 8 — 50
1024. „ „ *cyanus*, *Blåklint* eller *Kornblomster*, blandade — 5 — 15
1025. * „ *depressa*, vacker, blå — 5 — 15
1026. * „ *involutrata*, gul — 5 — 20
1027. * „ *moschata*; *Bisamblostm.* — 5 — 20
1028. * „ „ *alba*, *Bisamb.*, hvit — 5 — 20
1029. * „ *suaveolens*, gul, vällykt. — 5 — 20

Alla 7 sorterna 30 öre.

Prydliga, för rabatter passande blommor.

Centaureidium; (Cynareæ.)

1030. „ *Drummondii* — 8 — 50
2 å 3 fot hög rabattväxt med gula blommor.

* **Centranthus**; *Baldrian*, (Valerian.)

1031. „ *macroziphon*, röd — 5 — 20
1032. „ „ fl. albo, hvit — 5 — 20
1033. „ „ fl. carneo, köttfärg. — 5 — 20
1034. „ „ *nanum*, lågväxt — 5 — 20
Vackra. 1½ fot höga prydnadsväxter.

Cerithe; *Vaxblomster*, (Boraginæe.)

1035. „ *aspera*, utmärkt vacker — 5 — 30
1036. „ *aureiculata* — 5 — 30
1037. „ *gymnandra* — 5 — 20
1038. „ *major* — 5 — 20
1039. „ *retortum*, brokiga blad — 5 — 20

Alla 5 sorterna 25 öre.

à Port. Ort.

Kr. ö. Kr. ö.

Samtliga sorterna äro vackra, 1 à 2 fot höga, passande till rabatter

Cheiranthus; Löfkoja, (Cruciferae.)

1040. " maritimus. *Strandlöfk.* — 5 — 15
 1041. " " fl. alba, hvit . . . — 5 — 20
 1042. " " compactus. — 5 — 20
 1043. " " " albus — 5 — 25

Omkring 1 fot höga, graniga växter som trivas i mager, sandbl. jord och äro omtyckta kantblommor. Öfriga sorter, se modeblommor.

*** Chlora; (Gentianaee.)**

1044. " grandiflora. (C. perfoliata grandiflora) . . . — 30 — —

Har utm. vackra, gul blommor odlas bäst i krukor, enär den är ömtålig för dålig väderlek. Bildar små nätta buskar och är förträffl. till dekorationer på blomsterbord, o. s. v.

Chrysanthemum; Prestkrage eller Guldblomster, (Senecionideae.)

1045. " carinatum, hvit . . . — 5 — 15
 1046. " " annulatum, flerfärg. — 5 — 25
 1047. " " atrococcini, mörkr. — 5 — 25
 1048. " " Buridgeanum . . . — 5 — 25
 1049. " " Dunetti fl. pl., hvit — 10 — 80
 1050. " " luteum, gul . . . — 10 — 80
 1051. " " purpureum, purpurf. — 5 — 30
 1052. " " venustum — 5 — 25
 1053. " coronarium, hvit . . . — 5 — 15
 1054. " " luteum, gul . . . — 5 — 15
 1055. " " pomponicum album plenum, hvit, dubbel. — 10 — 75

Alla 11 sorterna 60 öre.

Allesamman utmärkta grupp- och rabattväxter. Varieteterna af C. carinatum blifva omkring 1½ fot höga med blommor i lysande färger. C. coronarium blifva 3 à 4 fot höga men pomponicum betydligt lägre.

*** Chrysocephalum; Guldhufvud, (Helichryseae.)**

1056. " strictum, gula blommor — 8 — 50

Vacker eternell: fo drar solrika platser.

Clarkia; Klarkia, (Onagrarieae.)

1057. " elegans, violettröd . . . — 5 — 15
 1058. " " alba, hvit — 5 — 30
 1059. " " carnea pl., köttfärg. — 5 — 20
 1060. " " rosea, röd — 5 — 20
 1061. " " violacea, viol., dubb. — 5 — 20
 1062. " " pulchella, röd — 5 — 15
 1063. " " fl. albo, hvit — 5 — 15
 1064. " " fl. pl. dubbel — 5 — 40
 1065. " " integripetala, röd . . . — 5 — 20
 1066. " " " fl. pl, röd, dubb. — 5 — 40
 1067. " " marginata, rödhvit — 5 — 20
 1068. " " " fl. pl., dubbel. — 15 — 80
 1069. " " nana (Tom Tumb) låg — 5 — 20
 1070. " " pulcherrima, carmin. — 5 — 25

Alla 14 sorterna 75 öre.

1071. " blandade, pr *℔*. 8 kr. — 5 — 15
 Alla Clarkia, och isynnerhet varieteterna af C. pulchella, äro verkliga prydnadsväxter, förtjänta af att allmänt omhuldas. De flesta blifva 1½ à 2 fot höga, mycket rikblommiga och förtäfliga att planteras på grupper. De dubbla sorterna äro äfvenledes mycket vackra. Seafbildningen på omslagets sista insida.

*** Cleome; (Capparideae.)**

1072. " speciosissima — 10 — —

à Port. Ort.

Kr. ö. Kr. ö.

3 à 4 fot hög, till blomsterbord bäst passande växt med egendomliga; rätt vackra blommor odlas helst i krukor.

*** Clianthus; Praktvicka, (Papilionac.)**

1073. " Dampierii. (Donia form.) — 35 — —
 Är egentl. flerårig, men emedan den är kinkig att öfverv. och des-utom blm:ar lättast och rikast om den behandlas såsom ettårig, hafva vi uppiagigt den här. Forrar god, kraftig, sandbl. löf- och ljungjord samt en sval, luftig, plats i kast eller drivbänk. Vid vattningen bör noga tillses att-trålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantrivas. De i rika klasar hängande blurna äro stora skaralakraöda.

*** Clintonia; (Lobeliaceae.)**

1074. " elegans, blå — 15 — —
 1075. " " pulchella, blå — 20 — —
 1076. " " alba, hvit — 20 — —
 1077. " " atrocinerea, — 20 — —

Smååttå växter med vackra blm: odlas och användas som den blå Lobelian, men äro ömtåligare än den för ojämlig väderlek. Coccinea, se slingerväxter.

Coix, se dekorationsträs.

Collinsia; (Scrophulariaceae.)

1078. " bartiaefolia, rosenröd . . . — 5 — 20
 1079. " " fl. alba, hvit — 8 — 40
 1080. " " bicolor candidissima . . — 5 — 20
 1081. " " fl. alba, hvit — 5 — 15
 1082. " " fl. carnea, höttfärgad — 5 — 10
 1083. " " major, pr *℔*. 4 kr. — 5 — 10
 1084. " grandiflora, blå, stor . . . — 5 — 15
 1085. " " multicolor, mångfärgad — 5 — 10
 1086. " " marmorata — 5 — 10
 1087. " " verna utm. vacker . . . — 8 — 40

Alla 10 sorterna 50 öre.

Alla dessa, utm. vackra blm:kunna användas till infattningar. Om de odlas i krukor och nätt uppbindas, äro de mycket prydliga på blomsterbord och dylikt. Allesamman kunna äfven sås om hösten och blomma då betydligt rikare och tidigare. Se afbildn. på omsl. första insida.

Commelina; (Commelinaceae.)

1088. " coelestis — 10 — 60
 1089. " " alba — 10 — 75
 1090. " " variegata — 10 — —

2 à 3 fot höga med blå eller blåhvita blm. De knölikrötterna kunna om hösten upptagas, öfvervintnas i torr sand och nästa vår utplanteras på grupper då de blomma tacksamt.

Convolvulus; Vinda eller Jungfruskört, (Convolvulaceae.)

1091. " tricolor, trefärgad — 5 — 8
 1092. " " azureus, himmelsblå . . . — 5 — 8
 1093. " " fl. alba, hvit — 5 — 8
 1094. " " fl. plena, dubbel — 8 — 50
 1095. " " monstrosus, mörkblå . . . — 5 — 10
 1096. " " splendens, mörkblå. — 5 — 10
 1097. " " subcoeruleus, blå — 5 — 10
 1098. " " unicalis, purpurblå . . . — 8 — 50
 1099. " " variegatus, strimmig — 5 — 10

Alla 9 sorterna 45 öre.

1100. " " blandade, pr *℔*. 4 kr. — 5 — 8
 Kända, allm. omtyckta prydnadsblommor, som kunna användas till bredare infattningar.

*** Cosmidium; (Senecionideae.)**

1101. " Buridgeanum, svartröd — 5 — 20
 1102. " filiforme, guldgul — 8 — 50

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Emedan dessa vackra gruppväxter fordra en längre sommar än den som råder hos oss, bör man utså tröet i Juli eller Aug., öfvervintra pl. nära glaset i ett temp. växthus och lösljande vår utpl. dem på varma platser i det fria hvarefter de rikligt blomma.

Crepis; Krefe, (Cicoraceæ.)

1103. „ barbata (Tolpis barb.) gul — 5 — 15
1104. „ rubra (Cockhausiar.) röd — 5 — 15
1105. „ fl. alba, hvit . . . — 5 — 15

Användbara på rabatter.

Cucurbita & Cucumis, se köksträdgårds- & slingerväxter.

* **Cuphea; (Lythraceæ.)**

1106. „ miniata, högröd . . . — 10 — —
1107. „ purpurea, i flera färger — 10 — —
1108. „ silenoides, purpurröd — 10 — —

Fordra god jord och solrika platser, kunna användas till grupper och infattningar.

Cyclanthera, se slingerväxter.

Cynoglossum; Hundtunga, (Boraginææ.)

1109. „ linifolium, Hvitförgätmig-ej, pr $\frac{1}{2}$ kr. — 5 — 8
Känd, omtyckt 1 à 1½ fot hög kantblomma.

* **Datura; Spikklubba, (Solanaceæ.)**

1110. „ ceratocaula, 3 à 4 f. hög — 8 — 40
1111. „ fastuosa, 2 à 3 f. hög — 5 — 25
1112. „ „ Huberina, dubbel — 10 — —
1113. „ „ Hub. alba, hvit, dub. — 10 — —
1114. „ guajaquilensis, hvit . . . — 15 — —
1115. „ Metel, hvit . . . — 5 — 30
1116. „ meteloides, hv. m. viol. — 5 — 30
1117. „ Stramonium, Vanlig Spikklubba . . . — 5 — 25

Alla 8 sorterna 55 öre.

Dat. Stramon. är starkt giftigt; blmna hvita, rätt vackra. Alla dessa utm. prydnadsblm kunna lika fördelaktigt användas på rabatter, som i blomster- och bladgrupper. Om man i Juni sår fröet, och öfverv. pl. vid + 12 à 15° C. så erhålles sköna, blomsterrika exempl., som följande vår kunna utpl. på fritt land i fet jord, på varma, lugna ställen der de fullkomligt utvecklas och ofta gifva moget frö.

Delphinium; Riddarsporre, (Ranunculaceæ.)

1118. „ cardiopetalum, (peregr.) — 5 — 20
Låg garneringsväxt med vackra, blå blm. Öfriga arter, se modeblm & fleråriga växter.

* **Dianthus; Neglika, (Caryophyllææ.)**

1119. „ Gardnerianus . . . — 10 — 80
En bekant och omtyckt prydnadsväxt. Öfriga sorter, se modeblm & fleråriga växter.

* **Dolichos, (Papilionaceæ.)**

1120. „ astrosanguineus . . . — 10 — 80
1121. „ giganteus . . . — 10 — 50
1122. „ Lablab (Lablab vulgaris) — 5 — 15
Slingerväxter; fordra s. luga, lugna platser.

Dracocephalum; Drakhufvud, (Labiataææ.)

1123. „ moldavicum album . . . — 5 — 10
1124. „ „ coeruleum . . . — 5 — 10

Smånätta växter med kraftsmigt sittande röda, hvita eller blå blommor.

Echinocystis, se slingerväxter.

Eleusine, se dekorationsgräs.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Erodium; Kamnfva, (Geraniaceæ.)

1125. „ gruinum . . . — 8 — —
Har intot värde som blomsterväxt men är egenomlig derför, att fröhusens spröt vid kuffigen väderlek böja sig ifrån hvarandra och då luffen är torr återsluta sig samman. Användas derför till hygrometrar.

Frysinum; (Crucifereæ.)

1126. „ arkansanum, ljusgul . . . — 8 — 40
1127. „ Perowskianum, mörkgul — 5 — 15
Omkring 1 fot höga till kantblommor på grupper väl passande växter, som blomma till långt in på hösten.

Eschscholzia; (Papaveraceæ.)

1128. „ californica, gul, $\frac{1}{2}$ 10 kr. — 5 — 20
1129. „ „ fl. alba, hvitaktig — 5 — 20
1130. „ „ rosea, rödaktig . . . — 5 — 20
1131. „ crocea, mörk saffransgul — 5 — 30
1132. „ „ dentata sulph., gul — 5 — 15
1133. „ tenuifolia . . . — 5 — 20

Alla 6 sorterna 25 öre.

Kända, vackra växter till grupper, rabatter och bredare infattningar. Föröka sig själva genom utfallande frö.

Eucharidium; (Onagrarieæ.)

1134. „ concinnum grandifl. . . — 8 — 20
1135. „ „ flora alba . . . — 10 — 80
Vackra, med Clarkia nära beslägtade, 1 à 1½ fot höga grupp. behandlas som Clarkia.

* **Eucide; (Loasææ.)**

1136. „ bartonioides . . . — 20 — —
Utm. vacker med mörk- och utvändigt ljusgula blm. Odlas helst i krukor under glas och nyttjas till dekorationer.

Eutoca, (Hydrophyllææ.)

1137. „ viscida, blå . . . — 5 — 20
1138. „ „ flora alba . . . — 5 — 20
1139. „ Wrangeliana . . . — 5 — 10
Låga, med Nemophila nära beslägtade, till infattningar i tvenliga, vackra växter.

* **Gaillardia; (Senecionideæ.)**

1140. „ Drummondii (G. bicolor var. Drumm.; G. picta) — 5 — —
1141. „ Drummondii Josephus — 5 — —
1142. „ „ marginata . . . — 5 — —
1143. „ „ semiplena . . . — 15 — —

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och hvitt varierande blommor. Se afbildningen.



Gaillardia Drummondii.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- * **Gamolepis;** (Senecionideæ.)
1144. „ *Tagetes* (G. annua) . . . — 8 — 40
6 à 8 tum hög infattningsväxt med gula, ej
fula blommor.

Gilia, (Polemoniaceæ.)

1145. „ *achillæfolia*, blå . . . — 5 — 10
1146. „ *capitata*, blå . . . — 5 — 10
1147. „ *nivalis*, hvit . . . — 5 — 10
1148. „ *tricolor*, trefärgad . . . — 5 — 10
1149. „ „ *alba*, hvit . . . — 5 — 10
1150. „ „ *rubra*, rödaktig . . . — 5 — 10

Alla 6 sorterna 25 öre.

Smånätta, till garneringar tjemliga växter med
färika små blommor. Fortplantas genom ut-
fallande frö.

Godetia, (Onagrarieæ.)

1151. „ *amoena* fl. *alba* . . . — 5 — 15
1152. „ *Lindleyana*, (Oenothera) — 5 — 15
1153. „ „ fl. pl., dubbel . . . — 5 — 20
1154. „ *rosea* *alba* Tom Thumb — 5 — 20
1155. „ *rubicunda* (Oenothera) — 5 — 20
1156. „ *the bride* . . . — 5 — 20
1157. „ *the bride maculata*, röd,
fläckig, utm. nyhet . . . — 10 — 50
1158. „ *Whitneyi*, storblommig
utmärkt vacker . . . — 5 — 20

Alla 8 sorterna 25 öre.

Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blom-
sterälskarens synnerliga uppmärksamhet. De
stora blarna variera i isenröd och hvitt
med mörkare fläckar. De flesta arterna fort-
plantas stundom genom utfallande frö.

* **Gomphrena;** *Klotamaranth,* (Ama-
ranthaceæ.)

1159. „ *globosa*, purpurrod . . . — 5 — 20
1160. „ *Haageana* (*aurea*) . . . — 5 — 20
Kända och omtyckta evighetsblomster, som
passa till vinterbuketter o. s. v. Som grupp-
växter på kall jord äro de äfven vackra, men
böra ej utplanteras förr än de blomma.

* **Gramanthes;** *Skriftblomster,* (Cras-
sulaceæ.)

1161. „ *gentianoides* (Crassula) — 30 — —
1 à 2 tum hög, till infattning af mindre, starkt
solbelysta grupper, passande växt med färika,
lysande röda blommor. Fordrar mager jord.
Gronovia, se slingerväxter.


Gypsophila; *Gipsblomster,* (Caryo-
phyllaceæ.)

1162. „ *elegans* . . . — 5 — 10
1163. „ „ *flöre roseo* . . . — 5 — 10
1164. „ *muralis* . . . — 5 — 25
1165. „ *Saxifraga* (Tunica) . . . — 5 — 30
Små, men mycket pryd. växter; lämpliga till
kantblommor och särdeles vackra i buketter.
Se afbildningen.

Helianthus; *Sotros* ell. *Solvändare,*
(Senecionideæ.)

1166. „ *annuus* fl. pl., dubbel — 5 — 10
1167. „ „ *grandifl. plenissimus* — 8 — 50
1168. „ „ *nanus*, låg . . . — 5 — 25
1169. „ *californicus* fl. pl. . . — 3 — 30
Fordra mycken näring och böra ej planteras
tillsammans med mindre växter, som deraf skul-
le kunna skadas. Se afbildningen på omsla-
gets sista insida.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.



Gypsophila eller Tunica Saxifraga.

* **Helichrysum;** *Strålblomster* eller
Evighetsblomster, (Senecionideæ.)

1170. „ *brachyrhynchum* . . . — 8 — 50
1171. „ *bracteatum album*, hvit — 8 — 40
1172. „ „ *aureum*, gul . . . — 8 — 40
1173. „ „ *nanum album*, låg — 10 — 80
1174. „ „ „ *luteum*, låg, gul — 10 — 80
1175. „ *compositum album*, hvit — 10 — 80
1176. „ „ *atroseum*, mörkröd — 10 — —
1177. „ „ *atrosangineum* . . . — 30 — —
1178. „ „ *Borussorum Rex*, hv. — 10 — —
1179. „ „ *brunneus*, brun . . . — 10 — —
1180. „ „ *nanum atrococcin*. — 10 — —
1181. „ „ *minimum album* . . . — 25 — —
1182. „ „ „ *aureum* . . . — 25 — —
1183. „ „ „ *roseum* . . . — 25 — —
1184. „ „ „ *rubrum* . . . — 25 — —
1185. „ *elegans* (*Morna elegans*) — 10 — —
strictum, se *Chrysocephalum*.

1186. „ *blandade* . . . — 8 — 60
Fordra soliga platser och en god lueker jord.
Allasman höra till de varkraste eterneller-
na och böra odlas i hvarje trädgård. Isynner-
het äro varieteterna af *H. comp. utmärkta*.
H. comp. minimum äro omkring 2 fot höga med
färika, små, klotformiga, mycket dubbla blm.,
som egna sig till vinterbuketter. Se afbildn.

* **Heliophila;** *Solvän,* (Crucifereæ.)

1187. „ *araboides* . . . — 10 — —
1188. „ *dissecta* . . . — 10 — —
Dessa växter öppna sina prydliga, blå blm
endast då de belysas af solen, hvartör de böra
planteras på soliga ställen. Odlas säkrast un-
der glas i en kall driffbänk och utplanteras
då de börja blomma.

Hibiscus; *Ibisblomster,* (Malvaceæ.)

1189. „ *calisurus* . . . — 5 — 20
Tacksamt blommande, 1 1/2 fot hög rabattväxt.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

* **Hunnemannia**, (Papaveraceæ.)

1190. " fumariefolia — 10 — —
Egentl. tvåårig, men blommar första året, om fröet sås t. ex. i Mars. Man kan äfvenså se-
nare. Öfverv. pl. frostfritt och om våren pl. dem
på kalljord. Den är 2 å 3 fot hög och har vack-
ra, gula, tulpanlika blommor.

Iberis; *Flåkrag*, (Cruciferæ.)

1191. " amara, hvit, pr *fl.* 4 kr. — 5 — 8
1192. " " grandifl. storblommig — 5 — 10
1193. " hesperidifolia, rent hvit — 5 — 15
1194. " odorata, hv. väluktande — 5 — 8
pr *fl.* 4 kr.
1195. " umbellata, violett — 5 — 25
1196. " " alba, hvit — 5 — 20
1197. " " carnea, köttfärgad. — 5 — 50
1198. " " purpurea, pupurröd. — 5 — 30
1199. " " Dunnettii, mörkpurp. — 5 — 30

Alla 9 sorterna 40 öre.

1200. " blandade, pr *fl.* 8 kr. — 5 — 15
De här anförda Iberis äro alla mycket vackra
och tacksamma grupp- och infattingsv. De
röda, vita och violetta sorterna, blandade om
hvarandra, bilda mycket vackra grupper. Föröka
sig ofta genom utfallande frö.

Impatiens balsamina, se modeblommor.
Ipomea, se modeblmr & slingerväxter.



Helichrysum bracteatum.

* **Ipomopsis**, (Polemoniaceæ.)

1201. " Beyrichiana, (Gilia B.) — 5 — —
1202. " coronopifolia, (Gilia ell.
Ipom. picta; Cantua pin-
natif; Polem. rubrum) — 5 — —
1203. " elegans (Gilia elegans) — 5 — —
1204. " " aurantiaca, guldgul — 5 — —
1205. " " cupreata, kopparröd — 5 — —
1206. " " lutea, gul. — 5 — —

Alla 6 sorterna 25 öre.

1207. " blandade sorter — 5 — 40
Dessa utm. prydl. växter lyckas bäst, om de
behandlas som tvååriga. Plantorna sättas i så
fall i kruka och öfverv. i temp. växthus helt
nära glasf. Vintertiden äro de mycket känsliga
för fuktighet, isynnerhet om sådan samlar sig
på bladen, hvarför men vid vattningen måste
använda all möjlig försigtighet. Om våren utpl.
de på fritt land, men måste äfven der skyd-
das mot rå väderlek. Se afbildningen.

Jonopsidium, (Cruciferæ.)

1208. " acaule, (Cochlearia ac.) — 10 — 80

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1 å 2 tum hög, till infattningar af mindre grup-
per mycket fördelaktig växt med tal. lika små,
porslinshvita blommor.

* **Kaulfussia**, (Asteroideæ.)

1209. " amelloides, blå — 5 — 30
Infattningsväxt; 1 å 1½ fot hög.

Lasthenia, (Senecionideæ.)

1210. " californica (glaberrima) — 5 — 20
1 fot hög infattningsväxt m. gula blommor.

Lathyrus, se modeblmr & slingerväxter.

Lavatera, *Poppelros*, (Malvaceæ.)

1211. " trimestris, röd — 5 — 35
1212. " " fl. alba, hvit — 5 — 35
1213. " " blandade — 5 — 35

Allmänt kända, omtyckta, omk. 3 fot höga väx-
ter m. stora ljusröda och hvita blmr. Se af-
bildningen på omslagets sista insida.

* **Leptosiphon**; (Polemoniaceæ.)

1214. " hybridum, fl. vackra färg. — 10 — 50
Nätta, tacksamt och länge blommande växter;
användbara på rabatter och mindre grupper
med god, men ej fet jord.



Ipomopsis elegans.

Linaria; *Flugblomster*, (Scrophularineæ.)

1215. " bipartita alba, hvit — 5 — 15
1216. " " splendens, violett — 5 — 20
1217. " Cymbalaria, *Aaronskäg* — 15 — —
1218. " macroura (Antirrh. linif.) — 5 — 25
1219. " triornithophora (Iusita-
nica) violetteröd. — 10 — —

Med undantag af L. Cymb., som är omtyckt
till ampelar och klippanlägg. samt L. trior-
nitoph., som är en 3 å 6 fot hög, förtr. rabattv.
äro dessa växter blott 8 å 12 tum höga och
på sa ypperligt till garneringsblommor.

Linum; *Lin* eller *Hör*, (Lineæ.)

1220. " grandiflorum, mörkröd — 5 — 20
1221. " " roseum, rosenröd — 8 — 40

L. grandiflorum, är en af de allrabästa som-
marblmr, en utm. prydnadsväxt för grupper.

Loasa (Cajophora), se slingerväxter.

* **Lobelia**, (Lobeliaceæ.)

1222. " Erinus, blå — 5 — 50
1223. " " coelestina, blå m. hv. — 5 — —
1224. " " compacta alba, hvit, — 15 — —
1225. " " erecta, blå m. hvitt — 15 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1226. *Lobelia* Er. erecta bicolor,
blå med hvitt, låg . . . — 15 — —
1227. „ *Erinus* erecta kermesina — 15 — —
1228. „ „ Kaiser Wilhelm; ny-
het, mörkblå blommor — 30 — —
1229. „ „ Paxtoniana, blå med
hvitt, låg, till infattn. — 10 — —
1230. „ „ speciosa, (Crystallpa-
lace), mörkblå . . . — 10 — —
1231. „ „ compacta, tätväxt — 15 — —
1232. „ „ erecta, låg, skön — 15 — —
1233. „ „ stricta multiflora, ut-
märkt nyhet . . . — 15 — —

Alla 12 sorterna kr. 1,55.

1234. „ *Erinus* blandade . . . — 8 — 40
Varieterna af *L. Erinus* äro utm. nätta, allm.
omt. växter, som lämpa sig såväl till odl. i
krukor och amplar, som till grupper, infattn.
o. s. v. Om de öfverv. i temp. växthus eller
boningsrum och följ. vår utpl. så blomma de
betydligt tidigare än när de säas om våren.



Lupinus nanus.

Lupinus; Vargböna eller *Lupin*,
(Papilionaceæ.)

1235. „ affinis, 1 fot hög, blå — 5 — 15
1236. „ Hartwegii, 1½ å 2 fot h. — 5 — 15
1237. „ hybridus albus coccineus,
hvit och röd . . . — 5 — 15
1238. „ „ Dunnetti atrovio-
lata, mörkviolett . . . — 5 — 15
1239. „ „ atrococcineus, röd . . . — 5 — 15
1240. „ „ nigrescens, mörk . . . — 5 — 15
1241. „ „ superbus, violett . . . — 5 — 10
1242. „ „ luteus, 2 å 3 fot, gul . . . — 5 — 8
1243. „ „ Menziesii, 2 fot, gul . . . — 5 — 30
1244. „ „ mutabilis, 4 å 6 f., hvit
m. gult, vålluktande . . . — 5 — 8
1245. „ „ Cruikshanskii, blå,
violett eller purpur — 5 — 10
1246. „ „ nanus, 1 å 1½ fot . . . — 5 — 15
1247. „ „ pilosus, 2 å 3 fot, röd . . . — 5 — 10
1248. „ „ coerulesus, 2 å 3 f., blå . . . — 5 — 10
1249. „ „ albus, 2 å 3 fot, hvit . . . — 5 — 10
1250. „ „ venustus, violettblå . . . — 5 — 10
15 sorter 65 öre.
1251. „ „ höga sorter blandade . . . — 5 — 8
1252. „ „ medelhöga, blandade . . . — 5 — 15

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1253. *Lupinus*, låga, blandade. — 5 — 15
Alla förträffliga grupp- och rabattväxter. *Lup.*
affinis, *Menziesii* och *nanus* kunna användas
till infattn. kring de högre sorterna, se äfven
Ekonomväxter. Se afbildningen.

Malope; Praktmalva, (Malvaceæ.)

1254. „ trifida grandiflora . . . — 5 — 15
1255. „ „ grandiflora fl. alba — 5 — 15
1256. „ „ blandade . . . — 5 — 15
Vackra gruppväxter med stora, lysande, röda
och hvita blommor.

Malva, Kattost, (Malvaceæ.)

1257. „ „ crispata, 6, å 8 f., krusbl. — 5 — 10
1258. „ „ mauritiana, 6 å 8 f., röd — 5 — 15
1259. „ „ miniata, 2 å 3 f., röd — 8 — 40
1260. „ „ zebrina, (maur. zebrina)
4 å 5 fot, strimmig . . . — 5 — 20
Vackra rabattväxter.

* **Martynia; Elefantsnabel, (Perso-
nateæ.)**

1261. „ „ Craniolaria (Cr. annua) — 10 — 40
1262. „ „ formosa (fragrans) . . . — 10 — 40
1263. „ „ lutea — 10 — 40
1264. „ „ Proboscidea — 10 — 40
Från 1½ till 3 å 4 fot höga, vackert blmde
växter, som passa till dekorationer på blom-
sterbord etc. Fröet bör, innan det säas, uppju-
kas i varmt vatten eller försigtigt affilas, el-
jest gror det långsamt och osäkert. Plant. vär-
das i varm drifbänk tills de blomma.

Mathiola; Löfkoja, (Cruciferae.)

1265. „ „ bicornis — 8 — 50
Har ytterst tatr. vållukt., men till useendet
obetyd. blmr. som framkomma till sent på hö-
sten. Tjenl. till inf. Öfr. sorter se mödelb.

Matricaria; Sötblomst., (Senecionideæ.)

1266. „ „ capensis — 8 — 40
1267. „ „ eximea — 8 — 40
1268. „ „ nana fl. pl. — 30 4 —
Omkr. 1½ fothöga växter med en mängd hvita,
dubbla blmr. Mycket passande till grupper.
Den sistn. är en nyhet af stort värde för grupper.
Den har talrika, snöhvita blommor och växten
är jernhögt och tät.

* **Mesembryanthemum; Isplanta,
(Ficoideæ.)**

1269. „ „ crystallinum, vanlig . . . — 5 — 20
1270. „ „ pommeridianum, gul . . . — 8 — 50
1271. „ „ tricolor, trefärgad . . . — 8 — 50
1272. „ „ fl. alba, hvit — 8 — 50
Den förstn. användes äfven till spenat. *M.*
tricolor är utmärkt vacker till infattningar och
grupper. Blmarna äro stora, röda eller hvita
och lysa på långt afstånd, men öppna sig blott
då solen skiner, hvarföre de böra planteras
på solrika platser.

Mimosa; Sensitiva, (Mimosææ.)

1273. „ „ pudica — 8 — 50
En häud växt, hvars blad äro så känsliga att
de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans.
Odlas bäst i en halvvarm kast. eller drifbänk.
Kan öfverv. i boningsrum, men fordrar mycket
ljus och bör vattnas försigtigt.

* **Mimulus; Muskulblomster** eller
Gyckelblomster, (Scrophulariaceæ.)

1274. „ „ cardinalis — 10 — —
1275. „ „ grandiflora, storbl. — 20 — —
1276. „ „ cupreatus, låg — 30 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1277. *Mimulus cupreatus*, fl. pl.,
dubbelblommande . . . — 35 — —
1278. „ *cupr. tigrinus* (*pardinus*) . . . — 15 — —
1279. „ „ *tigrinus* fl. pl. . . . — 30 — —
1280. „ *luteus quinquevulnerus*
 maximus — 15 — —
1281. „ „ *moschatus*, gul . . . — 20 — —
Alla 8 sorterna kr. 1,50.

Varieteterna af *M. cardin* blifva 2 å 3 fot höga med skarlakänroda blmr och äro förträffliga rabattv. *M. cupreatus* med dess variet heter utm. blmr och äro vackra grupp- eller infattningsväxter; liksom *M. luteus*. De bästa och vackraste variet. fortpl. bäst genom stickl. eller delning; de planteras i kruka och öfverfrostritt. Om man tidigt på våren ompl. dem och ställer dem nära glaslet i ett temp. växthus. så kan man redan i April hafva rika, vackert blommande ex. af dessa prakty. Se afbildn.



Mimulus tigrinus fl. pl.

Mirabilis Jalappa, se modeblommor.

Momordica, *Springgurka*, (*Cucurbitaceæ*.)

1282. „ *elaterium* (*Ecbalium* off.) — 8 — 40
Är ej vacker, men intressant därför att dess mognade frukter vid beröring öppna sig och utkasta frö och saft. De öfriga sorterna finnas upptagna bland slingerväxter.

Nemesia, (*Scrofulariaceæ*.)

1283. „ *floribunda* — 8 — 50
1284. „ *versicolor* — 8 — 50
1285. „ „ *compacta* alba . . . — 10 — 75
1286. „ „ *bicolor* — 10 — 75
Dessa smånätta växter blifva 1 å 1½ f. höga. De fyra sistn. äro hybrider. Blmnra äro talrika och vackra, blå, hvita eller violetter. Användbara till grupper och som kantblommor. Kunna äfven odlas i kruka.

Nemophila; *Kärleksblomster*,
(*Hydrophyllææ*.)

1287. „ *atomaria*, hvit m. svarta punkter, pr *ll.* 4 kr. — 5 — 8
1288. „ *cramboides*, himmelsblå, med svarta punkter — 5 — 10
1289. „ „ *alba nigra*, hvit med svart centrum . . . — 5 — 35
1290. „ „ *oculata*, himmelsblå med hvitt — 5 — 10

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1291. *Nemophila, discoidalis*, nästan svart — 5 — 15
1292. „ *disc. elegans*, brun m. hvitt — 5 — 20
1293. „ „ *marmorata*, marmorf. — 5 — 15
1294. „ „ *vittata*, svart m. hvitt — 5 — 15
1295. „ „ *insignis*, blå, pr *ll.* 4 kr. — 5 — 8
1296. „ „ *alba*, hvit, pr *ll.* 5 kr. — 5 — 10
1297. „ „ *marginata*, blå med hvit rand, pr *ll.* 5 kr. — 5 — 10
1298. „ „ *purpurea rubra*, rödaktigt blå, ny — 5 — 25
1299. „ „ *maculata*, hvit, violett — 5 — 8
1300. „ „ *grandiflora*, storblommig — 5 — 15
1301. „ „ *purpurea*, mörkviol. — 5 — 10
Alla 15 sorterna 70 öre.
1302. „ blandade, pr *ll.* 5 kr. — 5 — 10
Allmänt omtyckta till grupper och infattn. För att ständigt hafva blommande ex., bör man så om hösten, i April och i slutet af Maj. Fortpl. sig ofta genom sjelfsäd. Öfvervintrade pl. blomma, om de tidigt på våren omplanteras och ställas nära glaslet i tempererat växthus, redan i April och Maj.

Nigella; *Jungfrun i det gröna*,
(*Ranunculaceæ*.)

1303. „ *damascena*, pr *ll.* 5 kr. — 5 — 10
1304. „ „ *nana* fl. pl., låg . . . — 5 — 10
1305. „ *Fontanesiana*, blå . . . — 5 — 15
1306. „ *hispanica*, vacker . . . — 5 — 15
1307. „ „ *alba*, hvitaktig . . . — 5 — 15
1308. „ „ *atropurpurea*, röd . . . — 5 — 20
Alla 6 sorterna 25 öre.

Utm vackra. N. dam. är omkr. 1½ fot hög, de öfriga arterna lägre passande till kantblommor. Alla vackra i buketter.

Nuttallia, se Callirhoë.

* **Nyctarine**, *Honungsblomster*, (*Scrophulariaceæ*.)

1309. „ *capensis* — 12 — —
1310. „ *selaginoides* — 8 — 50
Smånätta med vackra, fintdoftande blommor. Fordrar varma, skyddade ställen på kalljord; odlas äfven i kruka.

* **Ocimum**; *Basilika*, (*Labiataeæ*.)

1311. „ *Basilicum* var. *crispum* — 8 — 50
Odlas såväl i krukor som på fritt land, hufvudsakligen för sin utmärkta välukt.

Oenothera; *Nattljus*, (*Onagariææ*.)

1312. „ *acaulis*, hvit och purp. — 10 — —
1313. „ *Drummondii*, 2 å 3 f., gul — 8 — —
1314. „ *Lamarkiana*, 4 å 5 f., gul — 5 — 20
1315. „ *longiflora*, 2 å 3 f., gul — 5 — —
1316. „ *macrantha*, storblmig . . . — 8 — —
1317. „ *odorata*, 2 å 3 fot, gul — 5 — —
„ öfriga sorter, se *Godetia*.

Alla 6 sorterna 35 öre.

Dessa vackra växter förtjena mera uppmärksamhet än som vanl skänkes dem. Låupa sig förtr. till pl'ant. på rabatter. *O. acaulis*, *Drummondii*, *Lamarkiana* & *odorata* äro två- och fleråriga, men blomma redan första året. De blifva störst och vackrast om de sås och behandlas som två-åriga. *O. longiflora* & *odorata* äro väluktande. Några sorter förplanta sig stundom genom sjelfsäd.

Onopordon, se bladväxter.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Orobus; Skogsärta, (Papilionaceæ.)

1318. " Fischerii, mörkröd . . . — 8 — 40
1½ à 2 fot hög, prydlig växt.

* **Oxalis; Hårklöfver; Gökmat, (Oxal.)**

1319. " corniculatus fol. purpureis, brunbladig . . . — 10 — —
1320. " rosea, rosenröd . . . — 10 — —
1321. " Valdiviana, gul . . . — 10 — —

Den första är en af de bästa ettåriga infattningväx. som genom sina mörka blad gör ett vackert afbrott mot den omg. gråsmattan. O. rosea & Valdiv. ha utm. vackra bmr och tunna plant. i krukor för att anv. till dekorationer i växthus och boningsrum Se afbildningen.



Oxalis Valdiviana.

* **Palava; (Malvaceæ.)**

1322. " flexuosa . . . — 10 — —
1 à 1½ fot hög gruppväxt med talrika, vackra, lilafärgade blmr.

Papaver; Vallmo, (Papaveraceæ.)

1323. " giganteum, stor, kvit . . . — 5 — 10
1324. " monstrosum . . . — 5 — 10
" öfriga sorter, se Modeblommor och fleråriga blomsterväxter.
Perilla, se bladväxter.
Petunia, se modeblommor.

* **Phacelia; (Hydrophyllæ.)**

1325. " congesta, blå . . . — 5 — 10
1½ fot hög; tjenlig till grupper, rabatter eller bredare infattningar eller sådd.

* **Phalacroa; (Eupatoriaceæ.)**

1326. " coelestina Wendlandii . . . — 15 — —
Utm. vacker, med blå blmr. Odlad i krukor och under sommaren några gånger omplant och toppad, blommor den rikl. under höst- och vintermånaderna. Unga öfverv. plantor kunna med fördel användas om våren till grupper. Förökas genom sticklingar.

Phacelus, se slingerväxter.

Phlox, se modeblommor.

Polygonum; Bokvete, (Polygonæ.)

1327. " orientale, mörkröd . . . — 5 — 30
1328. " album, hvit . . . — 8 — 40

Vackra prydnads- för grupper och rabatter. P. orient. blifver 6 à 8 fot hög; kan med fördel användas äfven bland bladväxter; hvarest dess mörkröda blommor göra god effekt.

Portulaca, se modeblommor.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Reseda; (Resedaceæ.)

1329. " alba . . . — 5 — 20
1330. " cristallina . . . — 5 — 30
1331. " odorata, pr \mathcal{L} . 5 kr. . . — 5 — 10
1332. " " " ameliorata . . . — 5 — 15
1333. " " " pyramidbukett . . . — 15 — 75
1334. " " " multifl. compacta . . . — 10 — 50
1335. " " " gigantea pyram. — 10 — 50
1336. " " " grandiflora, pr \mathcal{L} . 5 kr. — 5 — 10

Alla 8 sorterna 50 öre.

De tvänne första sakna välukt och odlas blott för bukettfabrikation. Alla sorterna R. od. ameliorata utm. sig för stora, välbildade, starkt väluktande blommor och stark, yvig växt.



Rhodanthe Manglesii.

* **Rhodanthe; Rosenblomster, (Senecionideæ.)**

1337. " atrosanguinea, mörkröd — 20 — —
1338. " maculata, fläckig . . . — 10 — 1 —
1339. " alba, rent hvit . . . — 15 — —
1340. " Manglesii, rosenröd . . . — 10 — 1 —

Dessa sköna evighetsbl. blifva omkr. 1 fot höga och bora, om de odlas på kalljord, skyddas mot fuktigt och kyla. Se afbildningen.

Rynchocarpa, se slingerväxter.

Ricinus, se bladväxter.

* **Sabbatia; (Gentianeæ.)**

1341. " campestris . . . — 30 — —
" En liten mycket tåck växt med talrika vackert rosenröda bmr; är tyvärr för bräcklig att odlas på kalljord. Trifves bäst under glas i kall driftänk.

Sa piglossis, se modeblommor.

* **Salvia; (Labiataæ.)**

1342. " coccinea, skarlakarvöd — 10 — 75
1343. " " pumila liten . . . — 10 — 90
1344. " " superba, (Pseudo-coccinea) . . . — 10 — —
1345. " " splendens, lysande . . . — 20 — —
1346. " Horminum . . . — 5 — 15

Alla 5 sorterna 50 öre.

S. coccinea med dess varieteter äro mycket vackra gruppväxter. De kunna öfverv. uti temp. växthus ell. boningsrum och blomma, när de på våren utpl. mycket tåck am. S. Horminum är utm. för sina iflera nyanser skiftande blomskärmar, kan anv. på grupper.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Sanvitalia; (Senecionideæ.)

1347. " procumbens, gul . . . — 8 — 50
1348. " " fl, pl, gul, dubbel — 10 — 75
Låga, krypande växter med tatrika blmr. Särdeles passande till infattningar.

Saponaria; *Såpört.* (Caryophyllææ.)

1349. " multiflora, hvit och röd — 5 — 20
1350. " " alba, hvit . . . — 5 — 20
Begagnas till infattningar o. s. v.

* **Scabiosa;** *Ångsvädd* eller *Enkelblomster*, (Dipsacææ.)

1351. " atropurpurea (Asterocephalus) i fl. färger. — 5 — 20
1352. " " grandiflora (majör) i flera färger . . . — 5 — 20
1353. " " miniata, mönjeröd — 5 — 20
1354. " " nana, striata plena — 5 — 20
1355. " " plena, dubbel . . . — 5 — 30
Alla 5 sorterna 20 öre.

Mycket vackra blmr för grupper och buketter. Odlas äfven i kruka för dekor. af blomsterbord o. s. v. Se afbildn. på omslagets sista sida.

Scyzanthus; *Sitsblomster* eller *Spaltblomster*, (Scrophulariææ.)

1356. * " Grahamii, lila, rosenröd — 5 — —
1357. " grandifl. oculat., storbl. — 5 — —
1358. " pinnatus, hvit med lila — 5 — —
1359. " " humilis, låg . . . — 5 — 20
1360. " " retusus, carmin m. gult — 8 — 50
2 å 4 fot höga, prydliga, mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter. Den sistnämnda sorten odlas bäst i krukor under glas i kall driftbänk eller kast.

Schizopetalum; *Spaltblad*, (Cruciferaæ.)

1361. " Walkerii — 10 — —
1½ å 2 fot hög rabattv. m. grönhvita, väl-luktande, morgon och afton öppna blommor.
Scyzanthus, se slingerväxter.

Sedum; *Fetört* eller *Fetknoppar*, (Crassulææ.)

1362. " coeruleum azureum . . . — 10 — —
4 å 5 tum hög med blekblå blmr. Kan användas som infattning kring soligt belägna blomstergrupper.

Senecio, se modeblommor.

Sicyos, se slingerväxter.

Sicyosperma, se slingerväxter.

Silene; (Caryophyllææ.)

1363. " Armeria, mörkröd, blekröd o. hvit, 1 å 1½ f. — 5 — 15
1364. " Atocion, blekr., 8 å 10 t. — 5 — 10
1365. " Bergerii (Regia) carmo-sinröd, 2 å 3 fot hög — 5 — 15
1366. " compacta, carm., 1 å 2 f. — 10 — —
1367. " ornata, brunröd, 1 å 1½ f. — 8 — 40
1368. " pendula (rosea græca; scabrifolia) rosenröd, häng., 8 å 12 tum. — 5 — 10
1369. " " fl. alba hvit, 8 å 12 t. — 5 — 10
1370. " " ruberrima, carmin, blad och stj. brun. — 5 — 20
1371. " " rub. fl. pl., omkr 5% af blmrna blifva dubbla — 10 — 50
1372. " " procumbens, röd, 6 å 8 t. — 5 — 15

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1373. Silene Pseudo-Atocion, ljus, i fot hög . . . — 5 — 10

1374. " reticulata carmosin, 2 f. — 5 — 20
Alla 12 sorterna 65 öre.

Alla här anfödda Silena äro vackra, rikblommiga grupp- och rabattv. S. compacta, som egentl. är 2-årig, en verkf. praktv. S. Atocion, pend. & procumbens passa välförl. infattning.

* **Solanum;** *Trollbär*, (Solanaceæ.)

1375. " Gilo — 8 — 40
1376. " heterogonum — 10 — —

1377. " Lycopersicum racemigerum — 5 — —
1378. " Melongena; (*Äggpl.*) — 5 — 25

öfriga sorter, se bladväxter. Dessa växter utm. sig för sina stora, vackra frukter. Odlas i fet jord, antingen i krukor eller på varma ställen å fritt land.

* **Sphenogyne;** (Senecionideæ.)

1379. " anthemoides (Arctotis cernua, pinn. & paradoxa) — 8 — 40
1380. " speciosa, guldgul . . . — 8 — 40

Nätta växter med vackra, nånkingula och violetta blmr, men mycket spensliga och ömtåliga för regn, hvarför man bör odla några exemplar i krukor

* **Statice;** *Ormrot*, (Plumbagineæ.)

1381. " Bonduelli, gul — 5 — 20
1382. " Thouinii, porslinsblå — 5 — 20

Vackra växter, hvars afskurna o. torkade blmr kunna anv. till vintr. buketter, kiansar o. s. v

Tagets, se modeblommor.

Thunbergia, se slingerväxter.

* **Thitonia;** (Senecionideæ.)

1383. " helianthiflora — 8 — —
1384. " tagetiflora — 8 — —

6 å 8 fot höga med orangef. blmr. Plant. böra, eftersom de växa. fl. gånger ompl. i större krukor, öfverv. i temp. växthus och om sommaren utpl. i god, fet jord på varma, lugna platser. Blifva, om de väl behandlas, verkliga praktväxter.

* **Trachymene;** (Umbelliferaæ.)

1385. " coerulea (Didisc. coerulea) — 10 — —
2 å 3 fot hög med blå blmr; odlas bäst under glas i kruka; användes till dekora-ioner.

Trifolium; *Klöfver*, (Leguminosæ.)

1386. " incarnatum — 5 — 5
1387. " suaveolens, — 5 — 20

Den förste användes till grupper, den sistn. till bredare infattningar.

Trichosanthes, se gurk- och slingerv.

Tropæolum, se salladv. och modeblmr.

Tunica, se Gypsophila Saxifraga.

* **Verbena;** *Fernört*, (Verbenacææ.)

1388. " Aubletia — 8 — 40
1389. " " Drummondii . . . — 8 — 50
1390. " " grandifl., storblmig — 8 — 40
1391. " " nana candelabra, utmärkt nyhet — 15 — —

1392. " pulchella, lilafärgad. . . — 8 — 40
1393. " pulcherrima, violett . . . — 5 — 30

i å 3 fot höga växter med carmo-sinröda, stundom hvitröda blmr. Om de säs tidigt, blom-ma de första året. Man kan äfven så senare sätta pl. i krukor, öfverv. dem i temp. hus och följande vår utpl. dem på kalljord. De blomma mycket rikt och äro vackra till grupper.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- * **Veronica; Årenpris, (Scrophulariaceæ.)**
1394. „ glauca, blå — 10 —
1395. „ syriaca, ljusblå — 10 —
3 å 4 tum höga, täcka växter med talrika, blå och blåvita blmr. Anv. till garneringar af mindre grupper eller att pl. i krukor.

- Vicia; Vicka, (Papilionaceæ.)**
1396. „ Gerardii, violett — 5 — 30
1397. „ Pseudocracca — 5 — 30
Passa till att bekläda mindre flätverk o. s. v.
Viola, se modeblmr & flerår. blomsterv.

- Viscaria; Tjärblomster, (Caryoph.)**
1398. „ oculata, rosenröd — 5 — 15
1399. „ „ Buridgei, hvit — 5 — 20
1400. „ „ Dunetti, lilafärgad — 5 — 20
1401. „ „ elegans picta, purp.f. — 8 — 40
1402. „ „ splendens, lys. röd — 5 — 25
Utm. vackra, omkr. 1 fot höga, med talrika, ganska stora, lifligt färgade blmr. Användas till grupper och infattningar.

- * **Whitlavia; (Hydrophyllæ.)**
1403. „ grandiflora, blå — 5 — 15
1404. „ „ alba, hvit — 5 — 15
1405. „ „ gloxinoides, blåhvit — 5 — 15
1 å 1½ fot höga med små, blå eller hvita, gloxinieklia blmr. Särdeles passande att odlas i krukor till dekorationer på blomsterbord o. s. v. eller att planteras i grupper.

- Xeranthemum; Pappersblomster, (Cynareæ.)**
1406. „ annum, rubrum, röd — 10 — 60
1407. „ „ compactum coeruleum — 10 — 80
1408. „ „ „ plenissimum atrop. — 10 — 80
Vackra immort till buketter, kransar o. s. v. Blmnas röda färg höjes om de doppas i vatten, blandadt med litet tsafvelsyra. Se afbildn.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.



Xeranthemum annum.

- * **Zinnia; (Senecionideæ.)**
1409. „ Haageana, (mexicana) — 10 — —
1410. „ „ fl. pl., utm. nyhet — 35 — —
1411. „ „ pumila fl. pl. — 8 — —
Den första är utm. passande till infattn.; har orangeröda blmr. Z. Haageana fl. pl. är en utm. nyhet, hvars blmr. som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket dubbla, skönt orangegula. Ensamstående exemplar deraf bilda en vacker, tät, klotformig buket.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

200 sorter ettåriga växter (frö)	kr.	12	—
100 " " " " " "	"	6	—
50 " " " " " "	"	3	—
25 " " " " " "	"	1, 50	—
12 " " " " " "	"	—	80

VI. Frö till Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter:


De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett ♀, blifva störst och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör säs för tidigt. Det utsås antingen i krukor, drifbänk eller på kall jord och då de flesta tvååriga växter hafva tjocka, långa rötter, som vanligtvis lida af att blifva stympade, måste de, innan plantorna blifvit stora, planteras i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem tåla ej våta eller barfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar, men ej kunna derät egna mycken tid, äro de mångåriga blomsterväxterna af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig själft. Dock böra de hwart tredje, fjerde eller femte år omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter jordra djup, lös och god men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtåligare sorterna betäckas om vintern med torrt löf och granris, granbarr eller ljung, men ej förr än frosten nedträngt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsättas sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. flera Umbelliferæ och Ranunculaceæ m. fl. ligger ofta ett helt år och ännu längre i jorden innan det gror, hvarför man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, eller antaga att fröet är odugligt. I år hafva vi dock uteslutit större delen af sådana frösorter, som gro långsamt, emedan det är mycket för dyrt att ständigt hafva nytt frö deraf, då omsätningen af dessa sorter ej varit stor.

- Achillea; Rölleka, (Senecionideæ.)**
1412. „ filipendula (tanacetifolia.)
2 å 3 fot hög, gul — 15 — —

Rabatväxt som starkt utbreder sig genom rot skott, hvarföre man hvarje år bör med en spade bortrensas det öfverflödiga.
Achanthus, se bladväxter.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- Aconitum; Stormhatt,** (Ranunculaceæ.)
1413. „ pallidum, hvitgul . . . — 5 — 50
Till planterig i kanten af buskpartier.
Adenophora, (Campanulaceæ.)
1414. „ latifolia 2 f. hög, blå . . . — 15 — —
Vacker rabattv. med hängande, kloeklika blmr.
Adonis; *Gossen i det gröna,* (Ranunculaceæ.)
1415. „ vernalis 6 tum, guldgul — 5 — 20
Särdeles vacker. Blomma tidigt på våren.
Fröet grov långsamt. Se afbildningen.



Adonis vernalis.

- Aethionema,** (Cruciferae.)
1416. persica, rosenröd . . . — 30 — —
Särdeles vacker infattningsväxt.
Agrostemma; Åkerkrans eller Klätt
(Caryophyllea.)
1417. †, coronaria, *Studentnegl.* — 5 — 25
1418. †, „ fl. alba, hvit . . . — 5 — 15
1419. †, „ „ bicolor, tvåfärgad — 5 — 15
1420. †, „ „ carminea splendens
lysande röd . . . — 8 — —
1421. †, „ Flos Jovis, *Jupiters-*
blomsner, 1½ fot hög, röd — 5 — 15
Praktiga grupp- och rabattv. Den första, bör
skyddas mot barfrost och fuktighet.
Alyssum; Gråddrädra eller Stenört,
(Cruciferae.)
1422. „ argenteum, 2 à 3 f. hög,
silfverhvit, skön . . . — 10 — —
1423. †, Benthamii, 1 fot h., hvit — 5 — 30
1424. „ Wierzbeckii, 1 f. h., gul — 10 — —
Den första, bör öfverv. frostfritt och om våren
utpl. A. Benth. egnar sig till infattn. och kan
behandlas som ettårig; den sistnämnda är en
vacker rabattväxt
Ammobium, se ettåriga blomsterväxter.
Amsonia, (Apocynæe.)
1425. „ salicifolia . . . — 15 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- 1 à 2 fot hög rabattv med prydliga, ljusblå
blmr och till buketter passande grönt. Befäctes
mot sträng köld.
Anchusa, Oxtunga, (Boraginæe.)
1426. †, italica (paniculata) 4 à 6
fot hög, blå . . . — 5 — 25
1427. „ sempervirens, 1 à 1½ f. h. — 5 — 30
Egna sig förtr. till rabatter. Blomma mycket
rikt med blå blommor till sent på hösten.
Anemone; Sippa eller *Anemon,*
(Ranunculaceæ.)
1428. „ chinensis, utmärkt . . . — 15 — —
1429. „ coronaria, i sköna färger — 25 — —
1430. „ japonica (Atragene jap.)
„ rödaktig, vacker . . . — 40 — —
1431. „ „ alba (Honorine Jo-
bert) hvit, vacker . . . — 45 — —
1432. „ Pulsatilla (Pulsat. vul-
garis) *Gökskälla* . . . — 10 — —
1433. „ sylvestris, hvit . . . — 10 — —
Alla 6 sorterna kr. 1,35.
Allesammans tidigt blommande rabattv. A.
sylv. kan användas till bredare infattn. Rot-
knölarne af A. coronaria böra förvaras torra öf-
ver vintern och utplanteras om våren, sedan
de fått svälla i vatten.
Apocynum; Flugfälla, (Apocynæe.)
1434. „ Androsemifolium . . . — 25 — —
De små blmrna hafva rörliga ståndare, hvilka
sammansluta sig och fasthålla de insekter, som
vilja henta honung ur blomman. Trifves i god
trädgårdjord och fortplanter sig ofta genom
rotskott.
Aquilegia; Akeleja, (Ranunculaceæ.)
1435. „ alpina . . . — 10 — —
1436. „ californica . . . — 15 — —
1437. „ canadensis, gul och röd — 10 — —
1438. „ „ elatior, hög, röd . . . — 10 — —
1439. „ „ rosea gigantea . . . — 10 — —
1440. „ coelestina . . . — 10 — —
1441. „ formosa fl. pl., dubbel — 8 — —
1442. „ glandulosa, blåhvit, stor-
blommig, präktig . . . — 25 — —
1443. „ hybrida fl. pl. . . . — 15 — —
1444. „ leptoceros, blå med gult — 10 — —
1445. „ Skinnerii, gul med rödt — 15 — —
1446. „ „ cupreata . . . — 20 — —
1447. „ sibirica compacta viola-
cea pl. rödhvit, dubb. — 20 — —
1448. „ „ fl. pl., dubbel . . . — 15 — —
1449. „ spectabilis, mörkblå med
gult och grönt . . . — 20 — —
1450. „ Vervæneana, blom. obe-
tydl., bladen brokiga — 10 — —
1451. „ viridissima . . . — 15 — —
1452. „ vulgaris Durandii pl. i
flera färger . . . — 10 — —
1453. „ „ fl. pl., i flera färger — 10 — —
1454. „ „ stellata fl. pl., stjern-
lik, i flera färger . . . — 10 — —
1455. „ „ tricolor fl. pl. — 10 — —
15 vackra sorter 2 kr.
Dessa utm. vackra, 1, 2 à 2½ fot höga, i Juni
blmande gupp- och rabattv. böra ej saknas i
någon trädgård. Alla arterna med undantag af
A. canadensis & Skinnerii, som behöfva en tunn

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

granrisbetäckning mot barfrost, äro mycket hårdiga och fåla de strängaste vintrar.

Arabis; Gäsört eller *Glis* (Cruciferae.)

1456. „ alba, hvit — 8 — 40

1457. „ blepharophylla, röd — 35 — —

Blomma redan i April eller Maj och passa till bredare infatn. Mycket eftersökta af bier.

Aralia, se bladväxter.

Armeria; Gräsneqlika eller *Trift*, (Plumbagineae.)

1458. „ cephalotes. (A. formosa;

latifol.; Statice cephal;

formosa; Pseudoarmeria)

2 fot hög, rosenröd — 15 — —

1459. „ dianthoides, i f. h., ljusr. — 5 — 20

1460. „ maritima alba, hvit. — 25 — —

Den förstn. är en verklig praktblm, som dock ej tål våra vintrar, utan bör öfverv. frostfritt och om våren utplanteras A. maritima är mycket omtyckt till infattningar och användes äfven till grupper.

Artemisia, se bladväxter.

Asphodelus; Afodill, (Asphodelae.)

1461. „ albus, hvit. — 12 — —

1462. „ luteus, gul — 10 — —

Praktfulla rabattv. med knipvis hängande blommor. Betäckas mot sväng frost.

Aster; Stjernblomster eller *Aster*, (Asteroideae.)

1463. „ alpinus, 4 å 6 tum h., blå — 20 — —

1464. „ spectabilis (elegans; speciosus) 2 å 3 f. h., blå — 12 — —

Den förstn. blommor redan i Maj och Juni; är en af de vackraste fleråriga infattningsväxter.

Astrantia; Stjernfoka, (Umbelliferae.)

1465. „ helleborifolia — 15 — —

1 å 2 fot hög rabattväxt med fina, vackra blommor i Juni och Juli.

Aubrietia; (Cruciferae.)

1466. „ deltoidea, (Alyssum For-

setia) — 15 — —

1467. „ græca, storblommig — 15 — —

Låga; blomma i April, Maj å Juni; passa till infattningar och att plantera på stenpartier.

Balsamita, se bladväxter.

Baptisia; (Papilionaceae.)

1468. „ australis, blå — 15 — —

1469. „ leucantha, hvit — 12 — —

2 å 3 fot höga rabattväxter med vackra blad och blommor.

Barbarea, se bladväxter.

Bellis; Tusenskön, (Asteroideae.)

1470. „ perennis, fl. pl. l. ma — 30 6 —

Fröet, samlat af de bästa dubblasorter, lemnar omkring 50 proc. utmärkta blommor.

Betonica; (Labiatae.)

1471. „ grandiflora, i ½ fot, röd — 10 — —

Rabattväxt med stora blommor i Juli, Aug.

Bocconia, se bladväxter.

Bryonia, se slingerväxter.

Campanula; Klockblomster, (Campanulaceae.)

1472. †, „ americana (acuminata;

asteroides obliqua) 2 å 5

fot hög, blå; betäckes — 15 — —

1473. „ carpathica, i fot hög, blå — 8 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1474. Campanula carpathica alba

i fot hög, hvit — 10 — —

1475. „ grandis, 2 å 3 f., ljusblå — 10 — —

1476. „ „ fl. alba, 2 å 3 f., hvit — 10 — —

1477. „ „ Medium; *Marieklöcka*,

2 å 3 f., ljusblå; hvit — 5 — 35

1478. „ „ calycanthema, skön — 25 — —

1479. „ „ alba, hvit, skön — 25 — —

1480. „ „ fl. alba, hvit. — 5 — 35

1481. †, „ „ pl., dubbel hvit — 10 — —

1482. †, „ „ cœerulea pl., dub-

bel blå — 10 — —

1483. „ persicifolia, 2 å 3 f. hög,

vacker, blå. — 10 — —

1484. „ „ alba, 2 å 3 fot, hvit — 10 — —

1485. „ „ pyramidalis, 6 å 8 f., blå — 10 — 50

1786. „ „ alba, 6 å 8 fot, hvit — 10 — —

1487. „ „ rhomboidea fl. pl., dub-

bel blå, utm. vacker — 20 — —

1488. „ Trachelium (urticaefol.)

2 å 3 fot hög, violblå — 20 — —

Alla 17 sorterna 2 kr.

Alla dessa i Juni, Juli å Aug. blommande växter, äro särdeles vackra på rabatter. Till infatn. af större grupper äro C. carpathica & rhomboidea väl passande C. medium äro praktfulla på grupper; kunna äfven med fördel odlas i krukor för dekoration. C. pyram. är om den väl behandlas, en af våra bättre praktväxter och borde användas mera. Om den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärl. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvattnet, under sommaren en öppen plats i det fria och om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal. Andra sorter, se ettåriga blomsterväxter.

Catananche; Kasselblomster, (Gichoraceae.)

1489. „ cœerulea, 3 fot hög, blå — 5 — 30

1490. „ „ bicolor, 3 f. h., tvåfärg. — 5 — 30

Prydliga rabatt- och krukv., som blomma i Juli och Aug. Säkrastr. är att odla några st. i krukor, öfverv. dem frostfritt och om våren utplantera dem. På fritt land böra de betäckas väl öfver vintern.

Cerastium, se bladväxter.

Chelone; Sköldblomster, (Scrophulariaceae.)

1491. „ „ barbata, 2 å 3 fot, röd — 8 — 50

Vacker, i Aug. och Sept. blommande rabattväxt. Bör väl betäckas om vintern, eller öfver vintras i en frostfri lokal.

Clematis, se slingerväxter.

Colchicum; Tidlösa eller *Nakna Jungfrun*, (Melanthaceae.)

1492. „ „ autumnale, rosenröd — 10 — 50

Bidrar stora rotnölar och, om våren, stora, breda blad, som vissa om sommaren. Mot hösten framkomma de vackra krokuslika blommorna. Fröet ger långsamt.

Commelina, se ettåriga blomsterväxter.

Convallaria; Liljeconvalje, (Smilacineae.)

1493. „ „ japonica, i å 2 fot hög — 5 — 30

1494. „ „ majalis rosea, rosenröd — 30 — —

C. maj. är mycket vacker till infattning af ormbunkegrupper. C. japon. planteras på rabatter och i kanterna af buskpartier.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Coreopsis, (Senecionideæ.)

1495. " (Calliopsis) Atkinsonii, 3
å 4 fot h., gul med brunt — 5 — —
1496. " grandifl., 2 å 3 fot, gul — 10 — —
1497. " lanceolata (Chrysomela)
3 å 4 fot hög, gul. — 8 — —
Präktiga rabattväxter, som blomma från Juli
till sent på hösten.

Crambe; *Strandkål*, (Cruciferæ.)

1498. " maritima — 5 — 8
Bildar vackra grupper på gräsmattor; se köks-
växter, rubriken Sparrisväxter.



Delphinium hybridum.

Crucianella; *Korsblad*, (Rubiaceæ.)

1499. " stylosa, rosenröd — 5 — 20
Endast några tum hög infattningsväxt med frisk,
fin grönska och prydliga blommor, hvilka, så
väl som bladen, användas i buketter.

Delphinium; *Riddarsporre*, (Ra-
nunculaceæ.)

1500. " chinensis, i f. h., fl. färg. — 5 — —
1501. " " pumilum, låg, fl. färg. — 8 — —
1502. " formosum, 2 fot hög, blå — 10 — —
1503. " " coelestinum, 2 fot hög
ljusblå, vacker — 15 — —
1504. " hybridum, 2 å 5 fot, i
många olika nyanser — 8 — 40
1505. " nudicaule, utmärkt — 25 — —
" öfriga sorter, se modeblommor.

Alla 6 sorterna 65 öre.

Alla höra till de vackraste grupp och rabatt.
D. chin. kunna alla behandlas som ettåriga,
men blifva då ej så kraftfulla och vackra, som
då plant. öfver. Af D. form. och dess var. fås
praktf. grupper. Fröet grov otta långsamt. Se afb.

Desmodium; (Leguminosæ.)

1506. " paniculatum, 2 å 3 fot
hög, röd — 15 — —
Vacker rabattväxt med prydliga blommor i
Juli och Augusti.

Dianthus; *Neglika*, (Caryophylleæ.)

1507. " atrococcineus, 1 fot hög,
skarlatanröd — 8 — 50
1508. " cruentus, 1 å 2 f., blodr. — 8 — 50
1509. " deltoideus; *Angsneglika*,
låg, röd — 8 — 40

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1510. *Dianthus deltoideus*, albus,
låg, hvit — 8 — 40
1511. " *dentosus*, 1 fot hög, röd — 10 — —
1512. " *plumarius*; *Fjädernegl.*
8 å 10 tum hög — 5 — 20
1513. " " fl. pl., dubbel — 30 — —
1514. " " nanus, fl. pl., låg. — 30 — —
1515. " *sanguineus*, blodröd — 8 — 50
1516. " *superbus*, 2 f., hvit & röd — 10 1 —
1517. " " grandifl., storblmig — 10 1 —
" öfriga sorter, se modeblommor.

Alla 11 sorterna kr. 1,25.

Utmärkt, på flerfaldigasätt, irabater, krukor,
grupper o. s. v. användbara prydnadsväxter.
Till infatta. äro D. deltoideus & plumarius,
synnerligen den låga formen, utmärkt väl pas-
sande, D. barbatus, caryophyllus och
chinensis finnas upptagna bland
modeblommorna.



Dianthus dentosus.

Diclythra; *Blomsterlyra*, (Fumariæ.)

1518. " *spectabilis* — 35 — —
Känd och omycket prydnadsväxt för såväl fritt
land, som för krukor. Fröet grov långsamt.

Digitalis; *Fingerborgsblomster*, (Sero-
phulariaceæ.)

1519. " *ferruginea gigantea* — 8 — 40
1520. " *grandiflora* (ambigua) 2
fot hög, blekgul — 8 — 40
1521. †, *lanata*, 2 fot hög, hvit
med brunt — 8 — 40
1522. †, *purpurea*, 2 å 3 fot, röd-
fläckig, vacker — 5 — 10
1523. †, " *alba*, 2 fot, hvit — 5 — 20
1524. †, " *gloxinaeflora*, prakt-
fulla varieteter — 8 — 40

Alla 6 sorterna 35 öre.

Präktiga, i Juni och Juli blommande rabatt-
växter. Till grupper passa bäst D. purp. med
dess varieteter.

Dodecatheon, *Gudsgåfva* eller
Gudsblomster, (Primulaceæ.)

1525. " *Meadea*, 1 fot, lilafärgad — 30 — —
Utm. vackra, i Maj & Juni blommande växter
för fritt land eller krukor. På kalljord betäc-
kas de under vintern.

Erigeron; *Binka*, (Asteroideæ.)

1526. " *speciosus* (Stenactis
speciosum) 2 å 3 fot hög — 5 — 30
Särdeles vacker grupp och rabattväxt med blå
blommor. i Juni, Juli och Aug.

Gaillardia; (Senecionideæ.)

1527. " *Bosselarii*, praktfull — 8 — —
1528. " *grandiflora*, storblomm. — 8 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Utm. från 1½ till 3 å 4 fot höga praktv. Blomrna äro stora, mycket vackra, gula med brunt och rött; framkomna under sommaren och hösten.

Galega; (Leguminosæ.)

1529. „ officinalis, 3 å 5 fot hög — 5 — 30
Vacker, i Juni och Aug. blom. rabattväxt.

Georgina eller Dahlia; Georgin, (Asteroideæ.)

1530. „ variabilis, vanlig . . . — 35 6,50
1531. „ Liliput, småblommig — 25 4,50
Fröet samlat af de vackraste dubbla sorter.

Geum; Neglikrot, (Rosaceæ.)

1532. „ chilense (coccineum) . . . — 8 — 50
1533. „ coccineum — 10 — 80

Dessa pryddiga 1 å 1½ fot höga växter pl. bäst i krukor, öfverv. frostr. och utpl. om våren i god jord. De utveckla hela sommaren en mängd praktiga, högröda blommor.

Gerardia; (Scrophulariaceæ.)

1534. „ grandiflora — 25 — —
Utm. vacker, sällsynt växt, likande Penstemon & Digitalis till form och växtsätt.

Gypsophila; Gipsblomster, (Caryophyllæ.)

1535. „ acutifolia, 3 å 4 fot hög — 5 — 25
1536. „ glauca (Stevenii; repens) 1½ å 2 fot hög, hvit — 5 — 30
1537. „ paniculata, 3 å 4 f. hög — 5 — 20

Hafva små, ofantligt talrika, vita blm. Anv. mycket till buketter, hvartil de äro särdeles vackra. Skyddas mot barfrost.

Hedysarum; Tupphufvend, (Leguminosæ.)

1538. „ caucasicum, 2 å 3 f., röd — 20 — —
1539. „ coronarium, 2 å 3 f., röd — 5 — 20
1540. „ „ fl. albo, 2 å 3 f., hvit — 5 — 20
1541. „ sibiricum, 3 f., violetteröd — 10 — —

Särdeles vackra under Juni och Juli blom. rabattväxter. H. coron. äro ömtliga för sträng frost och fuktighet; böra därför öfvervintras frosfritt och torrt samt om våren utplanteras på grupper.

Helianthus; Solros, (Senecionideæ.)

1542. „ Maximilianus, gul . . . — 15 — —
6 å 8 fot hög, om hösten blom. växt; passande bland fleråriga bladväxter, i kanten af större buskpartier eller som fristående på gräsplaner.

Hemerocallis; Daglilja, (Liliaceæ.)

1543. „ graminea, 1½ fot, gul — 25 — —
Ganska vackra blad och blommor.

Hepatica; Sippa; Blåsippa eller Anemon, (Ranunculaceæ.)

1544. „ triloba, fl. rubra, röd . . . — 35 — —
Tidigt blommande växt; kan inplanteras i krukor och drivas till blomning i Februari och Mars. Ar mycket vacker.

Heraclium, se bladväxter.

Hesperis; Natviol, (Cruciferae.)

1545. †, matronalis, 3 fot, röd — 5 — 20
1546. †, „ fl. alba, 3 fot, hvit — 5 — 20
1547. †, tristis, 1½ f., grå, välukt. — 5 — 20

Blomma i Juni och Juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten väluktande blommor; Fortplantas ofta genom själsädd.

Hieracium; Hökblomster, (Cichor.)

1548. „ aurantiacum, 1½ fot hög — 10 — 75
Användes till bredare infattningar, Fortplantas oftast genom utfallande frö.

Hyoseyamus; Bolmört, (Solanaceæ.)

1549. „ orientalis, 2 fot, violett — 30 — —
Tidigt om våren blommande rabattväxt.

Iberis; Flüppkrage, (Cruciferae.)

1550. „ sempervirens, 8 å 12 t. — 10 — —
1551. „ semperflorens, 1 fot hög — 10 — —
1552. „ Tenoreana, 10 tum hög — 10 — 50

Egna sig allesamman till infattningar. De båda första, kunna plant. i krukor och drivas till blomning i Mars och April. Betäckas under stark barfrost.

Ipomea, se slingerväxter.

Iris; Svärdslilja, (Irideæ.)

1553. „ anglica, i flera färger — 20 — —
1554. „ hispanica (Xiphium) i flera färger — 20 — —

Dessa praktfulla grupp- eller rabattväxter bör de finnas i hvarje blomsterträdgård.

Knautia, se bladväxter.

Lathyrus, se modebl. & slingerväxter.



Hesperis matronalis.

Lavandula; Lavendel, (Labiatae.)

1555. „ spica, pr. U. kr. 2,60 . . . — 5 — 5
En bekant, väluktande infattningsväxt, hvars behandling angifves under rubrik kryddväxter bland köksträdgårdsväxterna.

Leontice; Lejonblad, (Berberideæ.)

1556. „ Leontopetalum, äkta . . . — 20 — —
Denna intressanta, sällsynta växt har tidigt om våren gula blm. Tål ej barfrost eller vinterfuktighet, hvarför de på fritt land stående exempl. deremot böra skyddas. Säkrast är dock att plant. några exempl. i krukor, öfvervintra dem frosfritt och utplanta dem om våren på passande platser.

Lilium; Lilja, (Liliaceæ.)

1557. „ Martagon, utmärkt . . . — 10 — —

Linaria; Flugblomster, (Scrophulariac.)

1558. „ alpina, mörkblå — 25 — —
„ andra sorter, se ettåriga blomsterv.
Synnerligen vacker till klippläggningar, stenpartier och amplar; blommor under sommaren

Linum; Lin eller Hör, (Linæe.)

1559. „ alpinum, himmelsblå . . . — 12 1 — —
1560. „ anglicum, 2 å 3 fot, ljusblå — 12 — —
1561. „ candidissimum, hvit . . . — 25 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1562. *Linum campanulatum grandiflorum*, gul — 12 1 —
1563. " *narbonense*, 1 å 2 f., blå — 12 — —
1564. " *perenne*, 2 å 3 fot, blå — 5 — 20

Alla 6 sorterna 75 öre.

Förträffliga grupp- och rabattväxter, blom. i Juni och Juli. *L. campanul.* öfverv. säkrasti växthus vid + 5 å 6°; de öfriga fördras tunn betäckning under stark barfrost.

Lobelia, se ettåriga och krukväxter.

Lunaria; Månviol, (Grueiferæ.)

1565. † " *biennis (annua) judæ silfverpenningar*, 1 å 2 fot, purpurrod ell. hvit — 10 — —
Särdeles vacker för rabatter, och grupper, bör säs hvarje år. Se afbildningen.



Lunaria biennis.

Lupinus; Lupin, (Leguminosæ.)

1566. " *Douglasi*, blå; violett — 10 — 50
1567. " *elegans*, violett — 10 — 40
1568. " *grandifolius (macroph.)* brun eller violett — 5 — 15
1569. " *laxiflorus* — 8 — 40
1570. " *mexicanus*, blå; blåhvit — 5 — —
1571. " *perennis*, blå; violett — 5 — 20
1572. " *polyphyllus*; blå; violett — 5 — 15
1573. " " *albus*, hvit — 5 — 15
1574. " " *atropurpureus*, mörk — 10 — —

Alla 9 sorterna 60 öre.

Utm. 2 å 4 fot höga, från Juni till i Aug. blommande rabattv. Fördras god jord och en tunn granisbetäckning mot barfrost.

Lychnis; Studentneglika eller Tjårblomster, (Caryophyllæ.)

1575. " *calcedonica*, 3 å 5 f., röd — 5 — 20
1576. " " *fl. albo*, hvit — 5 — 30
1577. " " " *carneo*, ljusröd — 5 — 30
1578. " " *fulgens*, 2 å 2½ f., skarlr. — 10 — —
1579. " *grandiflora gigantea*, 1 fot hög, skarlakandröd — 10 — —
1580. " *Haageana (hybrida)* i fot hög, i många färger — 10 — —
1581. " " *atrocoerulea*, mörkr. — 15 — —
1582. " *Sieboldii (grandifl. alba)* 1 fot, hvit, varierar — 20 — —

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

1583. *Lychnis Viscaria splendens*, 1 fot hög, carmosinröd — 8 — 60

Alla 9 sorterna 80 öre.

Dessa praktf. under Juli och Aug. i alla nyanser från hvit till mörkröd varierande blommor, äro förtjenta af den största uppmärksamhet. De kunna användas såväl till grupper och rabatter, som till odling i krukor. Tillsist nämn. ändamål äro *L. grandifl.* *Haageana* och *Sieb. vackerast*. Ute fördras dessa sorter en tunn betäckning mot barfrost.

Lythrum; Fackelblomster, (Lythraræ.)

1584. " *Salicaria (roseum superbum)* 2 å 3 fot hög, röd — 10 — —
1585. " *virgatum*, 3 å 4 fot, röd — 10 — —
Mycket vackra till rabatter; fördras en god, något fuktig jordmån.



Myosotis alpestris.

Macheranthera; (Asteroideæ.)

1586. " *glabra*, 1½ fot hög, blå — 25 — —
Riktblom. rabattväxt; kan äfven användas till bredare infatt. Blmtr i Juni och Augusti.

Malva; Kattost, (Malvææ.)

1587. " *Morenii (Alcea var.)* 1½ fot hög, rosenröd — 8 — 40
1588. " *moschata*, 2 å 3 fot, hvit — 10 — —
Vackra rabattväxter. Den sistnämnda har en svag bisamlukt.

Michauxia; (Campanulææ.)

1589. " *campanuloides, (strigul.)* — 25 — —
4 å 5 fot hög rabattv. med talrika, stora, hvita, något blåviolettera blmtr i Juli och September.

Monarda; (Labiææ.)

1590. " *elegans*, röd — 15 — —
1591. " *splendens*, röd — 25 — —
Sköna rabattväxter, hvars blad lemna ett hellsamt och välsmakande the.

Morina; (Dipsacææ.)

1592. " *longifolia*, rosenröd — 25 — —
Tistellik växt med vackra blommor.

Mysotis; Förgätmigej, (Boraginææ.)

1593. " *alpestris*, blå och hvit — 8 — 40
1594. " " *fl. albo*, hvit — 15 — —
1595. " " *fl. roseo*, rödaktig — 10 — —
1596. " *azorica*, mörkblå — 35 — —
1597. " *oblongata*, storbl. vacker — 20 — —
1598. " *palustris*, äkta, blå — 10 — 80
1599. " *sylvatica*, blå — 8 — 50

Alla 7 sorterna i kr.

å Port. Ört.
Kr. ö. Kr. ö.

å Port. Ört.
Kr. ö. Kr. ö.

Dessa allmänt ömtyckta blm, äro mycket vackra till grupper, infattn. och krukor. *M. azorica* öfverv. inomhus och bl. palustris trives endast på fuktiga ställen: de öfriga växa och blomma rikt i god trädgårdsjord; fordra skydd mot bärstoft. Se afbildningen på föreg. sida.

Obeliscaria; Obeliskblm. (Senecon.)

1600. „ *columnaris* (Rudbeckia column. & columnifera; Rathibida sulcata) . . . — 30 —
6 à 7 fot hög med stora, gula blm i Juli och Sept. Planteras på stora rabatter eller i kanten af buskpartier.

Oenothera; Nattljus. (Onagraricæ.)

1601. „ *Fraserii*, 1 fot hög, gul — 10 —
1602. „ *fruticosa major*, storbl. — 10 —
1603. „ *glauca*, 1 à 2 fot, guldgul — 10 —
1604. „ *grandiflora major*, gul, . . . — 10 — 75
Praktf. från Juni till hösten blom. grupp & rabattv. hvilka, liksom de ettåriga arterna, förtjena uppmärksamhet af blomsterodlare. *O. fruticosa* kan med fördel plant. i kruka och användas till dekorationer.

Onopordon, se bladväxter.

Orobis; Skogsärta. (Papilionacæ.)

1605. „ *lathyroides*, 2 à 3 f., blå — 10 —
Vacker, i Maj och Juli blommande rabattväxt.

Papaver; Wallmo. (Papaveracæ.)

1606. „ *bracteatum*, 2 f., högr, — 8 — 40
1607. „ *orientale*, 2 f., skarl.-röd — 8 — 50
1608. „ *spicatum*, tegelröd . . . — 10 —

Vackra, från Juni till Sept. blom. rabattväxt. Stora, praktf. högröda blm. Anv. med fördel till plantering i kanten af från vägarne något afstågsna buskpartier.



Penstemon hybridum.

Penstemon; (Scrophulariacæ.)

1609. „ *hybrida formæ*, utmärkt vackra, blandade . . . — 30 —
Dessa sköna, 2, 3 à 4 fot höga, mycket tack-samt blom. grupp. fåla ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utpl. om våren. De böra förkas genom sticlångar.

Phygelius; (Scrophulariacæ.)

1610. „ *capensis*, 2 à 3 fot hög — 20 —
Vacker grupp. Birna äro 1½ tum långa, skarlutanröda. Behandlas som Penstemon.

Physalis; Fudekör. (Solanacæ.)

1611. „ *Älkekengi* . . . — 10 —

1612. *Physalis edulis* . . . — 10 —
1613. „ *giganteus* . . . — 10 —
Utm. sig för sina om hösten vackra, i orange-gula hylsoi innesluta frukter.

Phytëma; (Campanulacæ.)

1614. „ *spicata*, 1 fot hög, blå — 30 —
Polemonium; Venusvagn. (Polemoniaceæ.)

1615. „ *coeruleum*, 2 à 3 fot, blå — 5 — 15
1616. „ „ *album*, hvit . . . — 5 — 15
Vackra, från Maj till i Aug. blommande rabattväxter; fortplantas genom sjelfsådd.

Polygonum; Bohvete. (Polygonæ.)

1617. „ *polymorphum ajanense* — 15 —
Vacker i buketter. 1 fot hög, hvit.

Potentilla; Femfingerört. (Rosacæ)

1618. „ *atrosanguinea*, 2 à 3 f. — 15 —
1619. „ *aurea*, 1 fot hög, gul — 8 — 40
1620. „ *colorata (formosa; nepalensis)* 2 f. hög, ljusröd — 10 1 —
1621. „ *insignis*, 1 à 2 fot, gul — 12 —
1622. „ *Mac Nabiana*, 2 à 3 fot skarlakanröd med gult — 12 —
1623. „ *hybrida*, blandade färg. — 12 —
1624. „ „ *fl. pl. dubbla*, bland. — 35 —

Alla 7 sorterna 95 öre.

Sköna, från Juni till sent på hösten ständigt blom. rabattv. De dubbla äro verkliga praktväxter för såväl krukor, som tritt land.



Potentilla hybrida fl. pl.

Primula; Majnyckel eller Gullvifva. (Primulacæ.)

1625. „ *Aurikula, Aurikler*, bl. f. — 35 5 —
1626. „ „ *Luikeraurikler*, bl. — 25 —
1627. „ *cortusoides*, röd . . . — 15 —
1628. „ *elatior (veris var. inodora)* i flera färger . . . — 10 1,25
1629. „ *luteola, citrongul* . . . — 25 —
1630. „ *suaveolens*, svagt välukt. gul eller röd, vacker . . . — 8 — 50
1631. „ *veris, gul eller mörkröd* — 5 — 25
Alle 7 sorterna kr. 1,15.

Tidigt om våren bl., vackra grupp-, rabatt- eller infattningsv. *P. cortus* och *luteola* böra betäckas eller öfvervintras frostfritt. Pulsatilla, se Anemone.

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

à Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

Pyrethrum; Batransört, (Senecion.)

1632. „ carneum, 1 à 2 f., ljusr. — 10 I —
1633. „ roseum, 1 à 2 f., rosenr. — 10 I —
1634. „ hybrida, enkla, varieteter — 15 — —
1635. „ „ dubbla varietetor . . . — 25 — —
„ parthenifol. aur., se bladväxter.

De låda förstn. arterna lemna det bekanta persiska insektpulvret. De hybrida formerna hafva allesamman från Juni till Aug. utm. stora blmr i de mest lysande färgnyanser. De höra till våra präktigaste grupp- och rabtvl. och kunna desutom användas i frukor till dekorerung af växthus, boningsrum, blomsterbord o. s. v. Behöfva god lös jordmån och för säkerhets skull en tunn ljung- eller granrisbetsättning under barfrost.

Ranunculus; Smörblomster eller Ranunkel, (Ranunculaceæ.)

1636. „ asiaticus superbissimus. — 20 — —

En af de vackraste kända grupp., utomord. praktf., varierande i alla möjliga nyanser, fr. rent hvitt, gult, violett o. s. v. i llsvart. Om fröet utsås tidigt, blma en del exemplar redan första året. Rötterna upptagas om hösten, förvaras torrt och frostfritt samt utplanteras följande år i god kraftig jordmån.

Rheum, se bladväxter,

Rudbeckia; (Senecionideæ.)

1637. „ amplexicaulis, ny . . . — 8 — 50
1638. „ fulgida (crysomela; aspera) 1 à 2 fot hög, mörkgul med svartrodt . . . — 8 — —

1639. „ (Neumanniana) speciosa guldgul med mörkrödt . . . — 8 — —

Särdeles ståtliga, från Juni till Sept. och Okt. blom. prydnadsväxter för bredare rabatter eller kanterna kring buskpartier. Se afbildningen.



Rudbeckia amplexicaulis.

Sopolia; (Solanaceæ.)

1640. „ carniolica, vacker . . . — 10 — 50
Blommar i April och Maj.

Scutellaria; Hjelmört eller Getnos, (Labiatae.)

1641. „ macrantha, 6 t. h., violblå — 15 — —
1642. „ peregrina, 2 à 3 f., violett — 10 — —

Den förstn. passar till pl. på klippanläggning den senare på rabatter. Blma i Juni & Aug.

Sedum; Fetört eller Fetknopp, (Crassulaceæ.)

1643. „ hybridum, 6 tum, gul — 15 — —

1644. Sedum kamschaticum, gul — 10 — —
1645. „ spurium, purpurröd. . . — 10 — —
Vackra till plantering på stenhögar o. s. v.

Silene; Silén, (Caryophyllae.)

1646. „ alpestris, låg, hvit . . . — 40 — —
1647. „ maritima, 1 fot hög, hvit — 10 — —
1648. „ Schafta, 4 à 6 t. h., hvit — 10 — —
1649. „ Zawadski, 4 à 6 t., hvit — 12 — —

Rabattv. De lägre arterna äfven användbara till infattningar och klippanläggningar.

Silphium, se bladväxter.

Sisyrinchium; Gråstilla, (Irideæ.)

1650. „ anceps, 6 à 8 t. h., blå — 12 — —
Infattningsväxt med gråslika blad och vackra blommor.

Solidago; Guldris, (Asteroideæ.)

1651. „ Riddeli, 2 à 4 fot, gul — 15 — —
Användbar till försköning af rabatter och buskpartier. Blommar i Juli och Augusti.

Spergula; Spergel, (Alsinaceæ.)

1652. „ pilifera, fin, hvita blmr — 30 — —
Denna mosslika växt är särdeles användbar till fina infattningar. I England nyttjas den stundom i stället för gräs till bildande af små, fina mattar.

Spirea; Brudspira, (Rosaceæ.)

1653. „ callosa, 3 à 4 f., rosenröd — 8 — 50
Ävndbar till garnering af buskpartier.

Statice; Ormrot, (Plumbagineæ.)

1654. „ echioides — 15 — —
1655. „ eximea — 8 — —
1656. „ incana hybrida nana . . . — 8 — —
1657. „ speciosa — 8 — —

Mycket vackra till plantering på stenhögar eller rabatter. Åfskurna hålla sig blmna, äro vackra till vinterbuketter och kransar.



Statice incana hybrida.

Stenactis, se Erigeron.

Stevia; (Eupatoriaceæ.)

1658. „ Eupatoria (hyosopifolia; Ageratum punctatum) — 10 — —
1659. „ Lindleyana — 10 — —
1660. „ purpurea — 10 — —

Vackra, med flockvis sittande purpurröda blmr. Öfverv. frostfritt och utplanteras om våren; äfven användbara som krukväxter.

Thalictrum; Angsruta, (Ranunculac.)

1661. „ appendiculatum, 2 à 3 f. — 8 — —

	å Port. Ort. Kr. ö. Kr. ö.
1662. <i>Thalictrum aquilegifolium</i> , 4 å 5 fot, hög, hvit . . .	— 15 — —
1663. „ <i>Kockii</i> , 2 å 4 fot hög	— 8 — —
1664. „ <i>laserpitifol.</i> , 2 å 3 f. hög	— 8 — —
1665. „ <i>lucidum</i> , 2 å 4 fot hög	— 8 — —
1666. „ <i>majus</i> , 3 å 4 fot hög . .	— 10 — —
1667. „ <i>rigidum</i> , 3 fot hög . . .	— 8 — —
1668. „ <i>trigynum</i> , 2 å 3 fot hög	— 8 — —

Alla 8 sorterna 1 kr.

Mycket prydl. till buketter och rabatter Både blad och blmr kunna dessutom användas i buketter. De blomma i Juni och Augusti.

Thermopsis; Råfböna, (Papilionaceæ)

1669. „ <i>fabacea</i> (<i>Sophora</i>).	— 15 — —
1670. „ <i>lanceolata</i> , (<i>Thermia lupinoides</i>) gul	— 15 — —

Vackra. i Ju i och Juli blom. rabattväxter.

Valeriana; Vendelrot ell. Baldrian (Valerianaceæ.)

1671. „ <i>alba</i> , hvit	— 5 — 30
1672. „ <i>coccinea</i> , röd.	— 5 — 30

I Juni och Juli blomade rabattväxter

Verbascum; Kungsljus, (Serophulariaceæ.)

1673. „ <i>phoeniceum</i> , 2å3f., fl.färg. —	8 — 50
---	--------

1674. <i>Verbasc. Thapsus</i> , 6 å 7 f., gul —	5 — 20
---	--------

Väkr. egentl. rabattväxter. Verb. phoen. kan äfven användas till grupper.

Veronica; Arenpris, (Scrophulariac.)

1675. „ <i>Bachofenii</i> , 1 f. h., hvit —	8 — 40
1676. „ <i>grandis</i> , 2 fot hög, blå —	8 — —

Under sommaren blommande rabattväxter.

Viola; Viol, (Violariaceæ.)

1677. „ <i>cornuta Mauve Queen</i>	— 15 2 —
1678. „ „ <i>purple Queen</i>	— 15 2 —
1679. „ „ <i>blandade</i>	— 15 2 —
1680. „ <i>odorata semperflorens (italica) Luktviol</i>	— 12 1 —
1681 „ „ <i>semperflorens fl. alba</i> —	12 — —
1682. „ „ <i>rossica</i>	— 15 2,50

V. *cornuta* äro utm. i under hela sommaren med tusentals violetta blmr prydda infattningsväxter. V od kunna implanteras i krukor och drivas om vårens blma äfven om hösten. V. od. *rossica* har sörre blommor.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

200 sorter två- och fleråriga växter (frö) kr. 20 —
100 " " " " " " " 10 —
50 " " " " " " " 5 —
25 " " " " " " " 3 —
12 " " " " " " " 1,50

VII. Frö till Krukväxter.

En stor del af fröet till de under denna rubrik anförde växter inskrifves direkt från växlernas hemländer, i synnerhet från Nya Holland, Ost- och Vestindien. Goda Hoppsudden, m. fl. Många sorter hafva redan vid hitkomsten förlorat en del af sin gröningskraft, så att de ligga länge i jorden innan de gro, och uppkomma ojemt. Derfor är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af deras gröningsförmåga. Sålunda bör fröet af de flesta exotiska Leguminosæ, såsom *Acacia*, *Cyananthus*, m. fl., innan det utsås antingen inläggas i linnelappar och hastigt neddoppas i 75 å 80° varmt vatten, eller ock bör det få ligga 1 å 2 dygn i ljumt, med en 100-del isaltsyra uppblandadt regn- eller ävatten. Emellertid hafva vi i år uteslutit en stor del af sådana frösor, som gro ojemt, emedan det visat sig vara ej allenast för dyrbart, utan äfven nästan omöjligt, att ständigt hafva nytt, grobart frö deraf på lager. På större frösor, såsom fröet till en del *Palmer*, *Canna* och dylikt, bortfilas det yttre skalet, dock så försigtigt att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör bortfilas, utan blott det ställe, der grodden skall framskjuta. Mycket finkorniga fröslag, såsom *Azalea*, *Begonia*, *Gesneria*, *Gloxinia* m. fl. bör vid seningen endast obetydligt eller ock alldeles intet betäckas med jord, utan bör man öfvertäcka de med dylikt frö besädda krukorna med glasskifvor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt, att man uti andra, vattenfyllda kärl nedsänker frökrukorna och låter dem genom bottenhålen uppsuga vatten. Alla krukväxter fördrå för att gro: jenn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsken.

å Port. Kr. ö.

Abutilon, (Malvaceæ.)

1683. „ <i>aurantiacum</i> , orangeröd	— 40
1684. „ <i>insigne</i> , rosenr., mörkstrimmig —	30
1685. „ <i>striatum</i> , gul med rött	— 10
1686. „ <i>venosum</i> , gul m. blodr. ådror —	20
1687. „ <i>hybridum</i> , Duc de Malakoff	— 15
1688. „ „ <i>Medicis Spada</i>	— 20
1689. „ „ <i>Montgolfier</i>	— 30
1690. „ „ <i>souvenir d'Aragon</i>	— 20
1691. „ „ <i>van Houtteii</i>	— 10

Alla 9 sorterna kr. 1,85.

å Port. Kr. ö.

Präktiga växter för boningsrum. Blommorna klocklika. utmärkt vackra; fördrå kraftig jord och + 5 å 15° C.

Acacia; Akasia, (Mimosæ.)

1692. „ <i>armata</i>	— 10
1693. „ <i>celastrifolia</i>	— 15
1694. „ <i>cultriformis</i>	— 10
1695. „ <i>cyanophylla</i>	— 10
1696. „ <i>dealbata</i>	— 10
1997. „ <i>decipiens</i>	— 15
1698. „ <i>decurrans</i>	— 15
1699. „ <i>dentifera</i>	— 10

à Port. Kr. ö.

1700.	<i>Acacia elata</i>	— 20
1701.	" <i>floribunda</i>	— 25
1702.	" <i>pendula</i>	— 10
1703.	" <i>glauca pendula</i>	— 5
1704.	" <i>glomerata</i>	— 10
1705.	" <i>grandis</i>	— 25
1706.	" <i>graveolens</i>	— 10
1707.	" <i>heterophylla</i>	— 20
1708.	" <i>longifolia</i>	— 10
1709.	" <i>magnifica</i>	— 20
1710.	" <i>pendula</i>	— 10
1711.	" <i>longissima elegans</i>	— 10
1712.	" <i>lophanta</i> , pr ort 15 öre	— 5
1713.	" <i>Neumannii</i> , pr ort 20 öre	— 5
1714.	" <i>speciosa</i> , pr ort 40 öre	— 8
1715.	" <i>Melanoxylon</i>	— 15
1716.	" <i>paradoxa</i>	— 15
1717.	" <i>retinoides</i>	— 20
1718.	" <i>Sophoræ</i> , pr ort 60 öre	— 10
1719.	" <i>verticillata</i>	— 15

20 sorter kr. 2,65.
12 I,25.

Acacierna höra till de kalla växthusens bästa pydnadsväxter. De bilda efter beskärning utm. vackra träd, hvilka kunna uppträgas till anseelig höjd. Blomma om våren, studdom äfven under hösten och vintern. Fordra ljungjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfvervintras vid + 5 à 8° C. och utflyttas under sommaren i det fria.

Adenocarpus, (*Papilionaceæ*.)

1720.	" <i>frankeoides</i>	— 40
-------	--------------------------------	------

Vacker riktblom. buske för tempererade växth.

Agapanthus; *Flocklilja*, (*Hamorcallidæ*.)

1721.	" <i>umbellatus</i> , blå	— 25
-------	-------------------------------------	------

Känd, omtyckt fönsterväxt; bör ej för ofta omplanteras. Fröet grölångsamt.

Agave; *Amerikansk Aloe*, (*Liliaceæ*.)

1722.	" <i>americana</i> , s. k. <i>hundraårs Aloe</i>	— 30
1723.	" <i>mexicana</i> , storväxt	— 35

Bekanta dekorationsväxter. Fordra kraftig jord, blandad med grofkornig sand, sparsam vattning om vintern och + 5 à 10° C.

Asclepias; *Svalrot*, (*Asclepiadæ*.)

1724.	" <i>curassavica</i> , pr ort 40 öre	— 8
-------	--	-----

3 à 5 fot hög med vackra, mörka orangefärgade blmr. Ödlas bäst i varm drifbänk och om vintern vid + 12 à 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.

Azalea; *Fjellros*, (*Rhodoraceæ*.)

1725.	" <i>indica</i> , i flera färger	— 50
1726.	" <i>pontica</i>	— 30

Fröet hemtadt af de nyaste praktsorter.

Begonia; (*Begoniaceæ*.)

1727.	" <i>boliviensis</i> , praktfull	— 50
1728.	" <i>Chelsoni</i> , utmärkt	— 1
1729.	" <i>cinnabarina</i> , utmärkt	— 1
1730.	" <i>diversifolia</i> , vacker	— 60
1731.	" <i>l'exposition de Londres</i>	— 1
1732.	" <i>Pearcei</i> , vackra blad & blmr	— 40
1733.	" <i>Princeps</i> , utmärkt	— 1
1734.	" <i>Rex hybrida</i> , praktfulla blad	— 60
1735.	" <i>Sedenii</i> , utmärkt	— 60
1736.	" <i>nyaste sorter</i>	— 75

Alla 10 sorterna kr. 7,15.

Portionerna äro större än vanligt.

à Port. Kr. ö.

Fröet bör ej betäckas med jord. Den förstn. är utmärkt för grupper, bör liksom *B. diversif.* hållas torr om vintern och omplanteras på våren. *B. Pearcei* & *Rex* äro präktiga fönsterväxter. *B. Sedenii* har utmärkt vackra, olika tecknade blad och de nyare sorterna utmärka sig för sköna i rött och gult varierande blmr.

Bocconia, se bladväxter.

Calceolaria; *Toffelblomster*, (*Scrophulariaceæ*.)

" *hybrida*, se modeblommor.

1737.	" <i>rugosa hybrida</i> , buskartade i många nyanser	— 40
-------	--	------

De buskartade toffelblommorna användas helst på grupper i det fria och förkas under vintern och våren genom sticklingar.

Calla; (*Aroideæ*.)

1738.	" <i>ætiopica</i> (<i>Richardia africana</i> .)	— 20
-------	--	------

Bekant och omtyckt kammarväxt.

Canna, se bladväxter.

Chrysanthemum; *Prestkrage*, (*Senecionidæ*.)

1739.	" <i>frutescens</i> (<i>Argyranthem. frut.</i>)	— 20
1740.	" <i>indicum grandifl.</i> , bland. dubb.	— 20
1741.	" <i>pomponicum</i> , småblommig, blandad, dubbel	— 20
1742.	" <i>japonicum</i> , storbl., egendomlig	— 25

C. frut. bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd vita blmr. De öfriga blma i Okt., Nov. och Dec. och äro tack-amma höstblommor.



Chrysanthemum frutescens.

Cineraria; *Askört*, (*Senecionidæ*.)

" *candidis* & *marit.*, se bladväxter.

" *hybrida*, se modeblommor.

1743.	" <i>Webbi</i> (<i>Pericallis</i>) blandade	— 30
-------	---	------

Stor och vacker, 2 à 4 fot hög.

Clerodendron; (*Verbenaceæ*.)

1744.	" <i>splendens</i> , lysande röd	— 15
-------	--	------

Praktväxt med sköna blommor. Fordrar god löfjord och + 15° C.

Clianthus; *Praktvicka*, (*Papilionaceæ*.)

" *Dampierii*, se ettåriga.

1745.	" <i>punicens</i> , mörkröd	— 30
-------	---------------------------------------	------

Omtyckt praktväxt. Fordrar under vintern en ljus plats, lagom vattning och + 15° C.

Coffea; *Kaffeträd*, (*Rubiaceæ*.)

1746.	" <i>arabica</i> , äkta, 5 frö	— 40
-------	--	------

Ödlas i varmt hus vid + 15 à 20° C. Fordrar

å Port. Kr. ö.

god, sandbl. löfjord, om vintern sparsam, men om sommaren ynnig vattning, skydd mot solen och besprutning 2 å 3 gånger dagligen.

Coleus; (Labiatae.)

1747.	"	Beauty of Villmore	— 25
1748.	"	Duc of Edinburg	— 35
1749.	"	Gibbsoni	— 25
1750.	"	Her Majesty	— 30
1751.	"	Lindeni	— 30
1752.	"	Mastersi	— 25
1753.	"	Queen Victoria	— 35
1754.	"	Saundersoni	— 30
1755.	"	Veitschii	— 20
1756.	"	Wilsonii	— 20

Alla 10 sorterna kr. 2,50.

Dessa praktf. växter utmärka sig för mångfärgade vackra blad, som variera i alla nyanser af gult, brunt, rött, grönt och violett. Mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas förträffl. i boningsrum. Om de på våren planteras i större krukor, i god, kraftig jord, uppnå de undersommaren betydlig storlek. Tycka mycket om ljus och solskin.

Convolvulus; (Vinda, (Convolvulaceae))

1757.	"	mauritanicus, blå blommor	— 20
-------	---	-------------------------------------	------

Vacker, krypande växt med talrika blommor. Passar till ampelr och plantering på fritt land. Öfvervintras vid + 50 C.

Cordylinae; (Asphodelae.)

1758.	"	australis, (Dracena)	— 50
1759.	"	indivisa aureo-lineata (Dracena)	— 50

Stålliga växter för temp. växthus och boningsrum. Öfvervintras vid + 8, 10 å 15° C.

Cuphea; (Lytharieae.)

1760.	"	eminens	— 20
1761.	"	platycentra (ignea)	— 30
1762.	"	strigulosa	— 25

Vackra, rödgula blmr. kunna om sommaren utpl. i det fria. Öfvervintras vid + 5 å 10° C.

Cyclamen; (Jordbröd, (Primulaceae.))

1763.	"	europeum	— 40
1764.	"	macrophyllum	— 40
1765.	"	persicum	— 50
1766.	"	" grandifl. atrorubrum	— 50
1767.	"	" rubrum	— 50

Små, låga, utm. prydliga, till en del om hösten framkommande röda eller hvita blommor.

Cytisus; (Ärtträd, (Papilionaceae.))

1768.	"	Attleyanus	— 25
1769.	"	glabratus	— 20
1770.	"	racemosus	— 10

Buskar eller småträd med hela året framkommande, gula vållukt. blmr. Planteras i löfjord och vattnas måttligt om vintern.

Datura; (Spikklobba, (Solanaceae.))

1771.	"	arborea (Brugmansia suaveol.)	— 20
-------	---	---	------

Bekant praktf. med stora, hvita, trumpetform. vållukt. blmr. Trifvas i boningsrum. Pl i god, kraftig löf- och drifånkjord. Behöfver ej ljus eller vatten om vintern.

Desmodium; (Leguminosae-Hedysareae)

1772.	"	gyrans, rörlig	— 60
-------	---	--------------------------	------

Småbladen på denna märkvärdiga, 3 å 4 fot höga växt äro så känsliga för ljuset, att, då de träffas deraf, de röra sig tackmässigt upp och ned, så att det nästan ser ut som hade växten animaliskt lif. Fordrar god ljung- & löfjord, väl dränerade krukor, om somm. riklig vattning och luft samt om vintern en ljusplats och + 15° C.

å Port. kr. ö.

Didymocarpus; (dubbelfrukt, (Gesneriaceae.))

1773.	"	Rexii (Streptocarpus)	— 10
1774.	"	polyanthos	— 10

Örtartade; blmra vackra, blå. Fordra löfjord och + 5 å 10° C.

Disemna; (Passifloreae.)

1775.	"	coccinea, (Passiflora coccinea)	— 20
1776.	"	Herbertii	— 40

Rankväxter med skarlakaröda blmr. Fordra löfjord och + 10 å 15° C.

Dracena; (Drakblodträd, (Asparagin.))

1777.	"	congesta	— 60
1778.	"	Draco, äkta	— 40

Utmärkte, stålliga, dekorationsväxter. Behöfva kraftig löfjord och + 15° C. Trifvas förtäffligt i boningsrum.

Erythrina; (Koralträd, (Papilionaceae))

1779.	"	caffra	— 30
1780.	"	coraliodendron, 3 frö	— 40
1781.	"	crista galli	— 15
1782.	"	Hendersonii, 2 frö	— 80
1783.	"	laurifolia	— 25
1784.	"	varium	— 25

Dessa utm. praktf. växter äro väl förtjänta af uppmärksamhet. En del sorter, som crista galli m. fl. fälla bladen om vintern, kunna då ställas afsides och ej vattnas. Om våren börja de åter visa tecken till lif, och böra då omplanteras i väl dränerade kärl, i god, kraftig, sandbl. löfjord. Efter pl. böra de ställas något varmare. Under sommaren kan man använda dem ute eller i växthus och boningar. De sorter, som jemt vegetera, fordra om vintern + 15° C. och fuktig luft

Fuchsia; (Bloddroppe, (Onagrariaceae.))

1785.	"	coccinea	— 25
1786.	"	corymbiflora	— 25
1787.	"	" alba	— 25
1788.	"	fulgens	— 35
1789.	"	hybrida, enkla & dubbla, bland.	— 50

Att uppdra fuchsior af frö är både tacksam och intressant, enär man derigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra sorter.

Genista; (Ginstbuske, (Papilionaceae.))

1790.	"	canariensis (Spartium albicans)	— 10
1791.	"	candicans, (Cytisus) pr ort 40 ö.	— 8

Busk- eller trädform. växter, ständigt prydda med gula, vålluktande blmr. Planteras i löfjord; öfvervintras vid + 5° C.

Gesneria; (Gesneriaceae.))

1792.	"	blandade sorter	— 20
-------	---	---------------------------	------

Praktf. varmlusväxter med sköna, skarlakaröda blmr och vackra, sammetslika blad. Fröet bör ej betäckas med jord. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. om våren i god ljung-, torf- och löfjord, hvarefter de hållas varmt och fuktigt.

Gloxinia; (Gesneriaceae.))

1793.	"	hybrida, erecta, bland. sorter	— 50
1794.	"	" pendula, blandade	— 50
1795.	"	" horizontalis grandiflora	— 50

Utm. praktväxter hvars blmr variera i alla nyanser af hvitt, blått, violett, rött, o. s. v. De fordra en jämn värme af + 15 å 20° C. fuktig luft, skugga, god löf- eller skogsjord och väl dränerade krukor. Fröet bör ej betäckas med jord. Se afbildningen å nästa sida

Grevillea; (Proteaaceae.))

1796.	"	robusta	— 25
-------	---	-------------------	------

å Port. kr. ö.

Vackert träd. Fordrar god löf- och ljugjord, mätligt vattning och + 6 å 10° C.

Heliotropium; Heliotrop. (Verben.)

1797. „ peruvianum, blandade — 20
 1798. „ Reine des violettes — 25
 1799. „ Roi des noirs — 25
 1800. „ Triomphe de Liège — 30

Bekanta och för sin vaniljlika välluktmyteta blmr kunna lätt odlas i boningsrum. Präktiga till utplantering på grupper.

Hibiscus; Ibisblomster. (Malvaceæ.)

1801. „ rosa sinensis rubrus — 50
 1802. „ „ sin. speciosus — 50
 Dessa utm. praktf. växter utmärka sig för vackra blad och sköna, liljeblå, röda blmr. De kunna odlas i boningsrum, öfvervintras vid + 5 å 15° C.

Humea; (Senecionideæ.)

1803. „ elegans (Calomeria amaranth.) — 20
 Tvåårig växt. Öfverv. vid + 5 å 6° C. Ompl. om våren i större kärl eller utpl. på solrika platser ute. Är i färing med andra växter vacker till grupper.



Gloxinia hybrida.

Inga; (Leguminosæ.)

1804. „ pulcherrima — 75
 Vackert, flubladigt träd med långa, sköna blomklasar, pl. i ljug- & löfjord. Fordrar + 15 å 18° C.

Jacaranda; (Leguminosæ.)

1805. „ mimosaefolia, 5 frö — 75
 Utm. vackert, finbl. träd, hvars ved lemnar det bekanta, vackra jaquarandavirket. Fordrar ljug- & löfjord och + 15 å 18° C.

Lantana; (Verbenaceæ.)

1806. „ hybrida, blandade i många sorter — 20
 Bland de bästa och praktf. växter för grupper. Öfvervintras vid + 8 å 10° C. Fortplan- tas höst och vår genom sticklingar.

Lobelia; (Lobeliaceæ.)

1807. „ fulgens — 40
 1808. „ Queen Victoria — 40
 2 å 3 fot höga med lysande röda blmr i långa ax. Praktf. till grupper på fritt land. Fortpl. genom delning. Öfvervintras vid + 3 å 5° C.

Malva; Kattost. (Malvaceæ)

1809. „ Californica — 25
 Blommor nästan hela året med vackra, rosenröda blmr. Pl. i drifbänkjord och öfvervintras vid + 4 å 5° C.

å Port. kr. ö.

Metrosideros; (Myrtaceæ.)

1810. „ coccinea — 30
 1811. „ rigida — 20
 1812. „ robusta — 30
 1813. „ semperflorens — 25
 1814. „ viridiflora — 25

Alla 5 sorterna kr. 1,20.

Praktträd för boningar och kalla växthus. Blmrna lysande, ljusröda, gul- eller grönaktiga. Planteras i löf- och ljugjord.

Musa; Pisang; Bananas (Musaceæ.)

1815. „ discolor, 5 frö — 60
 1816. „ rosacea, 5 frö — 60
 1817. „ speciosa, 2 frö I —
 Tropiska praktväxter med stora blad. Öfvervintras vid + 15° C. Pl. i löf- & drifbänkjord.

Nierembergia; (Solanaceæ.)

1818. „ frutescens, se afbildn. — 15
 1819. „ gracilis — 15
 Utm. prydl. småbuskar med vackra blåhvita blmr. Pl. i löfj. Öfverv. vid + 5 å 10° C.



Nierembergia frutescens.

Pandanus; Skrufpalm. (Pandaneæ.)

1820. „ utilis, 5 frukter — 50
 Utm vacker och ståt. dekorationsväxt; fordrar löf- & drifbänkjord och + 15° C.

Passiflora; Passionsblomster. (Passiflorææ.)

1821. „ alba (Granadilla), hvit — 30
 1822. „ coerulea, blå — 30
 1823. „ „ grandiflora, storblom., blå — 45
 1824. „ edulis (Granadilla), ätbar frukt — 35
 Slingerv. med utmärkt vackra, egendoml. blmr. Förväfl. till beklädn. af pelare, murar, o. s. v. i varma eller temp. växthus; kunna fördelaktigt odlas i boningsrum. Pl. i god löfjord och fortplanteras genom sticklingar.

Pelargonium; (Geraniaceæ.)

1825. „ hybridum, storblommiga, Engelska sorter, blandade I —
 1826. „ „ diadematum, vackra I —
 1827. „ „ Odier (Pel. à cinq. macules) I —
 1828. „ „ Fancy, Fantasi-pelargonien — 75
 1829. „ scarlet, blandade sorter. — 25
 Kända, omtyckta kammar- och gruppväxter. Efter försädd får man ofta nya sorter.
 Primula sinensis, se modeblommor.

å Port. Kr. ö.

Rhododendron; *Alpros*, (Ericaceae-Rhodoraceae.)

1830. „ arboreum hybr., bland; sorter — 30
 1831. „ Catawbiense hybr., många sort. — 30
 1832. „ hybridum, många sorter . . . — 30
 1833. „ ponticum, blandade sorter . . . — 10
 Fröet sås i ljungjord och betäckes mycket tunn,
 men hålles jemt fuktigt. De unga plantorna
 odlas de första åren under glas.

Salvia; *Salvia*, (Labiatae.)

1834. „ albo-coerulea — 40
 1835. „ candelabrum — 50
 1836. „ patens, 5 frö — 50

Dessa pröväxter plant. i löfjord. Omplanteras
 om våren. Öfverv. vid + 5 å 8° C. Fortplan-
 tas genom sticklingar.

Solanum; *Trollbär*, (Solanaceae.)

1837. „ capsicastrum — 10
 1838. „ Pseudocapsicum — 10

Öfriga arter, se bladväxter.

Utmärkt för sina vackra, orangefärg. frukter.

Planteras i löfjord; öfverv. vid + 5 å 6° C.

Trachelium; *Plymblomster*, (Campanulaceae.)

1839. „ coeruleum, blå, pr ort i kr. — 10
 1840. „ „ album, hvit — 10
 Tråårig; öfvervintnas vid + 4 å 6° C. och ut-
 planteras om våren på grupper, hvartill den
 är utmärkt vacker.

Verbena; *Jernört*, (Verbenaceae.)

1841. „ hybrida, praktfulla sorter . . . — 10
 pr ort kr. 1,35.
 1842. „ „ storbloom., bästa sorter . . . — 30
 pr ort kr. 2,25.
 1843. „ „ alba pura, rent hvit . . . — 50
 1844. „ „ coccinea, skarlakånrod . . . — 40

å Port. k. ö.

1845. *Verbena hybrida coerulea*, blå . . . — 30
 1846. „ hybr. *Defiance*, mörk skarlakån — 60
 1847. „ „ *striata*, utm. strimmiga . . . — 40
 1848. „ *teucroides*, hvit, väluktande — 10
 Alla 8 sorterna kr. 2,50.

Verkliga prakt. för grupper och krukor. Se
 afbildningen på omslagets sista insida.

Veronica; *Arenpris*, (Scrophulariaceae.)

1849. „ många sorter, blandade . . . — 15
 Träd- eller buskartade, utm. vackra och tacks-
 växter för temp. växthus och boningsrum.
 Om de i Juni utpl. i god jord, blifva de stora
 och lummiga samt utveckla under hösten, vin-
 tern och våren talrika blmr. Fortplantas lätt
 genom sticklingar, hvilka, tagna om våren,
 följande höst blomma

Vinea. (Apocynae.)

1850. „ *rosea* — 15
 1851. „ fl. *alba* — 15
 Dessa prydl. växter pl. i kraftig löfjord och
 öfverv. vid + 12 å 15° C. Odlas om sommaren
 bäst i lagom varm kast. Anv. under blom-
 ningen till dekorer. Blmna äro talrika, sto-
 ra, ljusröda eller rent hvita.

Yucca, *Palmilja*, (Liliaceae.)

1852. „ *aloeifolia* — 10
 1853. „ *fol. var.* — 15
 1854. „ „ *rosea* — 50
 1855. „ „ *rubra* — 30
 Ståtliga dekorationsväxter med praktfulla hvita
 eller hvitgula, väluktande blommor. Fordra
 kraftig jord och + 5 å 10° C.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

100 sorter krukväxter (frö) . . .	kr. 15 —
50 „ „ „ „ „ „ „ „ „	8 —
25 „ utmärkta krukväxter (frö) „	4,50
12 „ „ „ „ „ „ „ „ „	2,50

D. Frö till Ormbunkar.

(Felices.)

Groddkornen (sporer) af ormbunkarne motsvara fröet af de phanerogama växterna och kunna sås när som helst. De sås i flata fröfat eller, i brist på sådana, i vanliga krukor, på hvars bottnar man lägger ett lager af sönderstötta tegelbitar eller träkol, hvar på lägges god, halfrutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för en så stark hetta, att alla i densamma förut befintliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jennad på ytan, utsås groddkornen och nedtryckas lindrigt med en passande slätthylslad träbit, hvarefter krukorna öfvertäckas med glasskifvor, på det att inga främmande frö eller sporer må kunna blanda sig med det sådda. För att yttermera förhindra detta, äfvensom för att ej bortskölja de sådda sporerne, vattnas krukorna nedifrån genom att nedsänkas uti andra, vattenfyllda kärl. Hufvudvillkoren för ett godt resultat äro: jemn värme, fuktighet och skugga. När plantorna uppnått den storlek att de kunna fattas med fingrarne, ompl. de, först i små, sedan i större och större krukor. Första året är vanl. 2 å 3 ompl. nödvändiga, men sedan exempl. uppnått sin naturliga storlek behöfva en del sorter blott ompl. en gång årl., andra deremot en gång hvart annat, tredje, fjerde eller femte år, allt efter dess beskaffenhet. De med C. märkta sort. fordra om vintern + 10 å 15°, de med T + 5 å 8° C. De öfr. tåla vintern på kall jord.

1856. <i>Acrosticum lomarioides</i> , C.	— 35	1861. <i>Adiantum decorum</i> , T.	— 30
1857. <i>Adiantum concinnum</i> , T.	— 20	1862. „ <i>diaphanum</i> , C.	— 20
1858. „ <i>concinnum latum</i> , C.	— 25	1863. „ <i>fulvum</i> , T.	— 25
1859. „ <i>Chiloense</i> , T.	— 25	1864. „ <i>macrophyllum</i> , C.	— 25
1860. „ <i>Cunninghami</i> , C. T.	— 25	1865. „ <i>peruvianum</i> , C.	— 25

å Port. Kr. ö.

å Port. Kr. ö.

1866. <i>Adiantum pubescens</i> , T.	— 25	1923. <i>Lastrea dilatata</i>	— 15
1867. " sp. st. <i>Catharina</i> , C.	— 25	1924. " <i>dilatata angustispinula</i>	— 25
1868. " <i>Veitchi</i> , C.	— 25	1925. " <i>Filix mas.</i>	— 15
1869. <i>Alsophila australis</i> , T., trädart	— 20	1926. " " <i>mas. furcans</i>	— 25
1870. <i>Aspidium caripense</i> , T.	— 25	1927. " <i>mollis</i> , C.	— 10
1871. " <i>falcinellum</i>	— 25	1928. " <i>opaca</i>	— 15
1872. " <i>glabellum</i>	— 25	1929. " <i>Pindaro</i>	— 15
1873. " <i>serra</i> , C.	— 25	1930. <i>Lomaria ciliata</i> , C.	— 25
1874. " <i>trifoliatum</i> , C.	— 25	1931. " <i>gibba</i> , C., praktfull	— 25
1875. " <i>violascens</i> , C.	— 10	1932. " <i>Patersonii</i> , C.	— 25
1876. <i>Asplenium Belangeri</i> , C.	— 25	1933. <i>Meniscium giganteum</i>	— 15
1877. " <i>bulbiferum</i> , T.	— 10	1934. <i>Nephrolepis exaltata</i> , C.	— 25
1878. " <i>erectum</i> , C.	— 10	1935. " <i>tuberosa</i> , C.	— 25
1879. " <i>glaberrimum</i> , C. T.	— 25	1936. <i>Phegopteris spectab.</i> C., trädartad	— 25
1880. " <i>lucidum</i> , C. T.	— 25	1937. <i>Polybotrya quercifolia</i> , C.	— 30
1881. " <i>marinum</i> , T.	— 25	1938. <i>Polypodium aureum</i> , C.	— 25
1882. " <i>Nidus</i> , C.	— 50	1939. " <i>cæspitosum</i> , C.	— 25
1883. " <i>præmorsum</i> , C.	— 25	1940. " <i>glaucum</i> , C.	— 25
1884. " <i>pumilum</i> , C.	— 25	1941. " <i>leiorrhizon</i> , C.	— 25
1885. " <i>tovarense</i> , T.	— 15	1942. " <i>metamorphum</i> , C.	— 25
1886. <i>Athyrium</i> (<i>Aspidium</i>) <i>Filix fœm.</i>	— 20	1943. " <i>morbillosum</i> , C.	— 25
1887. " <i>Filix fœm. multiceps</i>	— 25	1944. " <i>nigricans</i> , C.	— 25
1888. " " <i>fœm. purpureum</i>	— 25	1945. " <i>paradisæ</i> , C.	— 15
1889. " " <i>laciniatum dissectum</i>	— 25	1946. " <i>reptans</i>	— 25
1890. " " <i>diffusum</i>	— 25	1947. " <i>tæniosum</i> , C.	— 25
1891. " " <i>diffuso-multifidum</i>	— 15	1948. " <i>vulgare auritum</i>	— 15
1892. " " <i>Frisællia</i>	— 25	1949. <i>Polystichum angulosum</i>	— 10
1893. <i>Balantium antarecticum</i> , C., utm.	— 40	1950. " <i>cristatum</i>	— 10
1894. <i>Blechnum brasiliense</i> , trädart., C.	— 15	1951. " <i>gracile</i>	— 10
1895. " <i>fraxineum</i> , C.,	— 15	1952. " <i>latipes</i>	— 10
1896. " <i>glandulosum</i> , C.	— 15	1953. " <i>lobatum</i> , C.	— 10
1897. " <i>occidentale</i> , C.	— 20	1954. " <i>proliferum</i>	— 20
1898. " <i>Patersonii</i> , C.	— 20	1955. <i>Pteris argyrea</i> , C.	— 25
1899. <i>Cænopteris japonicus</i> , C.	— 10	1956. " <i>cretica fol. var.</i> , C. T.	— 10
1900. <i>Cibotium Schidei</i> , C., utmärkt	— 25	1957. " <i>geranifolia</i> , C.	— 25
1901. <i>Cyrtomium atratum</i> , T.	— 20	1958. " <i>glaucovirens</i> , C.	— 25
1902. " <i>falcatum</i> , T.	— 20	1959. " <i>japonica</i> , T.	— 15
1903. " <i>Fortunei</i> , T.	— 20	1960. " <i>longifolia</i> , C.	— 10
1904. <i>Dicksonia cicutaria</i> , C.	— 40	1961. " <i>sempinata</i> , C.	— 25
1905. <i>Didymochlæna lunulata</i> , C., utm.	— 25	1962. " <i>serrulata</i> , C. T.	— 10
1906. <i>Diplazium minutiflorum</i> , C.	— 25	1963. " " <i>cristata</i> , C. T.	— 10
1907. " <i>Shefferdi</i> , C.	— 25	1964. " " <i>variegata</i> , C. T.	— 10
1908. <i>Doodia aspera</i> , C. T.	— 10	1965. <i>Scolopendrium crenatum</i>	— 20
1909. " <i>caudata</i> , T.	— 10	1966. " <i>digitatum</i>	— 20
1910. " <i>lunulata</i> , T.	— 10	1967. " <i>glomeratum</i>	— 20
1911. <i>Doryopteris palmata</i> , C.	— 25	1968. " <i>muricatum</i>	— 20
1912. <i>Drynaria coronans</i> , C.	— 25	1969. " <i>officinarum digitatum</i>	— 20
1913. <i>Gymnogramma davallioides</i> , C.	— 25	1970. " " <i>variabile</i>	— 20
1914. " <i>elegantissima</i> , C.	— 30	1971. " <i>ramo-marginatum</i>	— 20
1915. " <i>gracilis</i> , C.	— 25	1972. " <i>transervo-lobatum</i>	— 20
1916. " <i>hybrida</i> , C.	— 15	1973. " <i>variabile</i>	— 20
1917. " <i>Laucheana gigantea</i> , C.	— 30	1974. " <i>Struthiopteris germanica</i>	— 10
1918. " <i>l'Herminierii</i> , C.	— 25		
1919. " <i>Martensii</i>	— 15		
1920. " <i>tatarea</i>	— 10		
1921. " <i>Wettenhalliana</i> , C.	— 25		
1922. <i>Lastrea augescens</i> , C.	— 10		

Da urvalet oinskränkt anförros åt oss, lemnas:

50 sorter ormbunkar (frö) kr. 8 —

25 " " för växthus (frö) " 5 —

12 " " för fritt land " " 2 —



E, Frö till Barrväxter.

(Coniferæ.)

Fröet till många utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter t. ex. *Juniperus*, *Taxus m. fl.* ett år och deröfver — i jorden innan det gror. Det händer derför stundom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket tillstånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då upplockas och sås i ny, frisk jord. För att påskynda groningen plägar man låta fröet ligga någon tid i ljumt vatten, hvarigenom skalet uppmjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jordblandn. för dessa växter är: lika delar grästorf-, löf och ljungrjord, blandad med grof sand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamma från trakter, der medeltemperaturen är + 8 å 10° C., hvarför de ej här tåla vintern ute; men planterade i baljor eller krukor och öfver, vid + 1 å 5° C. utveckla sig de flesta till praktfulla träd. Många hålla om vintern tillgodo med anspråkslösa platser, bakom hyllorna i kalla växthus, i oeldade boningsrum eller torra och något ljusa källare. De äro särdeles användbara till decorationer, om sommaren ute, om vintern i växthus och boningsrum. De med T märkta sorterna öfver, så, som ofoan är nämndt; de med B planteras på kalljord och täckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute under bar himmel.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

å Port. Ort.
Kr. ö. Kr. ö.

- Abies; Gran, (Abietinæ.)**
 1975. „ alba (*A. glauca*, *Picea* alba, *Pinus alba*) . . . — 15 — 1 —
 1976. „ canadensis (*Picea*, *Tsuga canadensis*) . . . — 10 — 50
 1977. „ exelsa (*Pinus Abies*)
Vanl. gran, pr $\text{t}l.$ 1 kr. — 5 — 5
 pr 100 $\text{t}l.$ 95 kr.
 1978. „ orientalis, utm. vacker — 25 — —
 1979. „ rubra (*A. nigra rubra*, *A. arctica*, *Picea rubra*, *Pinus americana*) Amerikansk rödgran. . . — 10 — —
- Cedrus; Ceder, (Abietinæ.)**
 1980. „ atlantica, *Hvitceder*, T. — 10 — 40
 1981. „ Libani (*Pinus Cedrus*)
Libanonceder, T. . . — 20 — 60
- Cryptomeria; (Cupressinæ.)**
 1982. „ japonica, T. — 5 — 20
 1983. „ „ *Lobbi*, T. — 15 — —
- Cunninghamia; (Abietinæ.)**
 1984. „ sinensis, T. — 15 — —
- Cupressus; Cypress, (Cupressinæ.)**
 1985. „ funebris (*pendula*), T. — 10 — 50
 1986. „ Goveniana, T. — 20 — —
 1987. „ glauca *pendula vera*, T. — 20 — —
 1988. „ *Lawsoniana* — 10 — 80
 1989. „ majestica — 20 — —
 1990. „ *sempervirens* (*fastigiata*, *pyramidalis*, *stricta*)
Äkta Cypress, T. — 5 — 10
 1991. „ „ *horizontalis* (*expansa*;
fastigiata horiz.) T. — 8 — 30
 1992. „ „ *pendula*, T. — 10 — —
 1993. „ *Tournefortii*, T. — 10 — 50
- Ginkgo; (Taxinæ.)**
 1994. „ *biloba* (*Salisburya adianthifolia*) — 40 — —
- Juniperus; En, (Juniperinæ.)**
 1995. „ *Bermudiana* — 5 — 20
1996. *Juniperus communis*, *Vanlig En* pr $\text{t}l.$ 50 öre. — 5 — 5
 1997. „ *communis suesica* . . . — 5 — 10
 1998. „ *exelsa* (*foetida exelsa*) T — 5 — 15
 1999. „ *Lysia* (*davurica*, *phœn.*, *Pseudo-Sabina*) T . . . — 5 — 10
 2000. „ *prostrata* (*alpina*, *Hudsonica*, *Sabina humilis*) — 5 — 25
 2001. „ *Sabina*, *Vanl. Säfenbom* — 5 — 15
 2002. „ *virginiana*, *Blyertsceder* — 5 — 20
- Larix; Lärkträd, (Abietinæ.)**
 2003. „ *europæa* (*Pinus Larix*) . — 5 — 5
 pr $\text{t}l.$ 2 kr.
- Picea; Tall, (Abietinæ.)**
 2004. „ *balsamea* (*Abies*, *Pinus balsamea*) *Balsamtall* — 8 — 40
 2005. „ *Nordmanniana* (*Ab.*, *Pinus Nordmanniana*) . — 8 — 40
 2006. „ *pectinata* (*Pin. Pic.*; *pectinata*, *Abies pect.* alba, *taxifol.*; vulg.) *Silfvergr.* — 5 — 10
- Pinus; Fur, (Abietinæ.)**
 2007. „ *austriaca* (*nigra*; *nigrescens*)
Österrikisk, pr $\text{t}l.$ kr. 2,40 — 5 — 10
 2008. „ *Cembra*, *Cembrafur*, *Zerbelnötter*, ätbara nötter — 5 — 5
 pr $\text{t}l.$ 1 kr.
 2009. „ *inops* (*variabilis*, *virginiana*) *New-Jersyfur* . — 10 — 70
 2010. „ *Laricio* (*corsicana*, *altissima*, *marit.*) *Strandfur*, B — 8 — 35
 2011. „ *montana*, *Bergfur* . . — 5 — 20
 2012. „ *strobis*, *Weimuth-tall* — 10 — 50
 2013. „ *sylvestris*, *Nordisk fur*
 pr $\text{t}l.$ 5 kr. — 5 — 10
- Taxus; Idegran, (Taxinæ.)**
 2014. „ *baccata*, vanlig — 5 — 15
 2015. „ *canadensis* — 8 — 40
 2016. „ *fastigiata* (*hybernica*) . — 10 — 75
- Thuja; Lifsträd, (Cupressinæ.)**
 2017. „ *compacta*, T — 10 — 50

	à Port. Ort.
	Kr. ö. Kr. ö.
2018. Thuja gigantea, utmärkt, B	— 50 —
2019. „ occidentalis	— 5 — 25
2020. „ „ intermedia	— 15 —
2021. „ „ orientalis, B	— 5 — 20
2022. „ „ aurea, T. B.	— 30 —
2023. „ „ pyramidalis, T. B.	— 5 — 20

	à Port. Ort.
	Kr. ö. Kr. ö.
2024. Thuja plicata (robusta)	— 30 —
2025. „ tatarica (australis; orientalis tatarica) T. B.	— 10 —
Wellingtonia, (Cupressineae.)	
2026. „ gigantea, (Seq. gig.) B.	— 50 —

Prisförteckning
ÖFVER EN DEL VÄXTER.

Växtpriserna äro, med några undantag, desamma som finnas noterade i 1874 & 75 års katalog, hvilken kan erhållas på begäran. I år utgifves därför ingen ny prisförteckning öfver växter förr än på hösten.

Pr st. Kr. ö.

Frukträd och Bärbuskar:

(Stort förråd finnes.)

Äppleträd, halfstammiga med namn	1,25
Päronträd, halfstammiga med namn	1,50
Plommonträd, halfstamm. med namn	1,75
Körsbärträd, halfstamm. med namn	1,75
Större partier till billigare pris:	
Apricosträd, spalierformiga, unga ex.	5 —
„ utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Persicosträd, spalierformiga, unga ex.	5 —
„ utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Vindrufvor, erkändt goda sorter, i unga, starka och friska, ex.	2 —
„ 12 st. efter vårt val, 20 kr.	
Krusbär, engelska med namn	— 30
„ eng. m. n., pr 100 st. 25 kr.	
„ utan namn, „ 100 „ 16 „	— 20
Vinbär, röda, Holländska stora	— 20
„ pr 100 st. 16 kr. pr 12 st. 2 kr.	
„ hvita pr 12 st. 4 „	— 40
„ svarta pr 12 st. 2 „	— 20
„ flera andra utm. sort. m. n. — 30 à	— 40
Hallon, röda Antwerp., pr 100 st. kr. 10	— 12
„ gula, pr 100 st. kr. 16	— 20
„ flera andra utmärkta sorter — 25 à	— 50
Smultron, flera utm. sorter, pr 100 st. 3 kr.	
„ goda sorter blandade pr 100 st. 2 „	
Sparris, Jätte pr 100 st. 5 „	

Träd och Buskar till anläggningar.

Häraf finnes större förråder af utm. sorter till i det närmaste samma priser, som i 1874 & 75 års prisförteckning.

Efter vårt val lemnas:

100 st. i 50 olika sorter med namn	50 kr.
100 „ i 30 „ „ „ „ „ 40 „	
100 „ utan namn	30 „

Hagtorn, 2-årig, pr 1000 st. 18 kr.

pr 100 st. kr. 2,25.

„ 3-årig, pr 1000 st. 25.; pr 100 st. 3 kr.

Törnrosor för fritt land:

(Vår samling består af öfver 500 olika sorter.)

Rosa hybrida remontant, buskform., med namn, pr 100 st. 90 kr., pr st. 1 kr.
„ hybr. rem. stamformiga, med namn, pr st. kr. 2 à 2,50.

Då valet öfverlättes åt oss, lemnas;

100 st. buskf. frilandsrosor med namn	50 kr.
25 „ „ „ „ „ 13 „	
12 „ „ „ „ „ 7 „	
50 „ „ „ utan „ 8 „	
25 „ „ „ „ „ 5 „	
12 „ „ „ „ „ 3 „	

Fröplantor till ettåriga Blomsterväxter, såsom Aste, Löfkojor, Pensées m. m., expedieras i Maj & Juni till billiga priser.

Två- och Fleråriga Blomsterväxter; i stort urval, hvaribland nämnes:

Anemoner, enkla bland. pr 100 st. kr. 3 —	
„ „ „ „ „ pr 12 st. „ — 50	
„ dubbla i flera färger, pr 100 st. „ 4 —	
„ „ „ „ „ pr 12 st. „ — 60	
Ranunkler, dubbla bland, pr 100 st. „ 3 —	
„ „ „ „ „ pr 25 st. 1 kr., pr 12 st. „ — 50	
Gladiolus blandus . . . pr 12 st. „ 3 —	
„ Brenchleyensis . . . pr 12 st. „ 1,50	
„ floribundus pr 12 st. „ 2,50	
„ gandavensis dr 12 st. „ 2,50	
„ „ med namn . . . pr 12 st. „ 4 —	
„ psittacinus pr 12 st. „ 2,50	

I slutet af April inpl. de i krukor, och äro sedan dyrare, då krukorna och p'antering beräknas.

Stockrosor, i flera färger . pr 100 st. 18 kr.
„ „ „ „ „ pr 25 st. 5 kr., pr 12 st. kr. 2,75

Neglikor, utmärkta sorter pr 100 st. 10 kr.
„ pr 50 st. 5,50; 25 st. 2,75; 12 st. 1,50.

Georginer eller Dahlier,
200 vackra sorter med namn kr. 70 —

100 „ „ „ „ „ „ 36 —	
12 „ „ „ „ „ „ 5 —	
12 „ „ utan namn „ 2,50	
12 sorter sticklingsplantor m. n. „ 3 —	

Efter vårt eget val lemnas:

50 st. två- & fleråriga växter .	kr. 12 —
25 " " " " " " " "	6,50
12 " " " " " " " "	3,50

Krukväxter i mycket stora förråder till ungefär de gamla priserna, hvaribland särskildt nämnas följande *Gruppväxter*:

Calceolaria hybrida . . .	pr 12 st. 10 kr.
Canna till bladgrupper .	pr 100 st. 25 "
Fuchsia, . . .	pr 25 st. med namn 10 "
Pelargonium scarlet, pr 12 st. m. n.	7 "
" scarlet, pr 100 st. utan namn	kr. 35 —
" " " 50 " " " "	18,50
" " " 25 " " " "	9,50
" " " 12 " " " "	5 —

Efter vårt val lemnas af unga, men vackra ex.	
200 st. krukväxter för kallt hus	75 kr.
100 " " " " " "	40 "
50 " " " " " "	25 "
25 " " " " " "	15 "
12 " " " " " "	8 "
100 " " " " " " för varmt hus	75 kr.
50, 25 och 12 i förhållande dertill.	

Diverse:

Ympvax, kallt, flytande, pr burk 2 å 3 kr.
Bastmattor, goda, pr st. 75 öre å 1 kr.
Buketter erhållas på beställning, utm. fina och smakfulla, från 2 till 50 kr. pr st. då penningar insändas eller önskad pris m. m. meddelas.

Lefyande blommor, brudkronor af myrten, **kransar** etc. till billiga priser.
Bukettpapper och **bukettmanschetter** i många fina mönster till billiga priser.



Sanvitalia procumbens fl. pl.
Se pag. 39.



Portulaca grandiflora.
Se pag. 19.

Tidning för Trädgårdsodlare,

hvaraf femtonde årgången utkommer under 1876, anmäles härmed till prenumerat. Tidningen, som utom från flera erfarna trädgårdsodlare inom landet, erhåller bidrag från Finland, England, Frankrike och Tyskland, kommer under året att innehålla talrika för trädgårdsodlare och trädgårdsvänner afsedda upplysningar och råd. Särskildt kommer under rubriken "Husbehofs-trädgårdsskötsel" att meddelas en månadlig öfversigt öfver odling och skötsel af köksväxter, fruktträd, bärbuskar, blommor för kalljord och fönsterväxter, till tjänst för dem som med jemförelsevis små resurser vilja odla sådant.

Ett nummer om ett helark utkommer i början af hvarje månad. Priset är såväl å Postanstalterna som i Boklådorna två kronor 50 öre för hela årgången.

Stockholm i Januari 1876.

Erik Lindgren.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Prisuppgift för 1876

å diverse frösorter.



Primula chinensis filicifolia.



Scabiosa atropurpurea.



Mirabilis jalappa.

För de flesta växter gälla fjolårets priser fortfarande och därför utgifves ingen ny prisförteckning öfver växter på våren.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.



Verbena hybrida.



Calendula
offic. ranunculoides.



Adonis autumnalis.



Lavatera
trimestris.



Clarkia pulchella.



Helianthus
annuus fl. pl.

