

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



Prisuppgift
FRÖ och VÄXTER,



Arum corsicum.

Från Göteborgs Trädgårdsförening.

OBS! Af förekommen anledning fästa vi uppmärksamheten derpå, att vår firma *icke* har något gemensamt med "Göteborgs Trädgårdsbolag."

Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Obs! Då det både för köpare och säljare bör vara önskvärdt, att uti deras affärsförhållanden rubbning ej må uppstå genom den **förändring i handelsboks vitsord**, som, jemlikt Kongl. Förordn. den 12 September 1868, från och med 1870 inträdt, få vi, vid öfverlemnandet af vår prisuppgift för året, framställa den önskan, att våra kunder å **andra orter** behagade efter **emottagandet af räkningar, återsända de räkningarne åtföljande bevisen derom, försedde med vederbörlig underskrift.**

Ingående requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, och i **den ordning**, de komma oss tillhanda. Det händer ofta om våren att så många requisitioner nästan samtidigt anlända, att det åtgår flera veckors tid till dess expedition. Det är derföre angeläget att requisitionerna hitsändas en tid före det requirerade skall användas.

Requisitioner, hvars värde ej uppgår till **minst 10 Rdr Rmt**, böra, för att blifva expedierade, ovilkorligen **åtföljas af liqvid i förskott**. Öfverskott af insände penningar återsändes noggramt, då räkning å det expedierade aflåtes. **Innehållet å nästa sida torde benäget noga observeras.**

Göteborgs Trädgårdsförening.

Prisuppgift,

gällande för året

1873,

I TVENNE HUFVUDAFDELNINGAR,

innehållande förteckning å

FRÖ OCH VÄXTER,

som billigt försäljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Rekommenderande denna prisuppgift hos resp. blomstervänner och landtråkare, anhålla vi, att beställningar måtte så tidigt som möjligt oss tillsändas (senast 14 dagar å 3 veckor före det requirerade skall användas) och torde observeras, att bref, requisitioner och remisser **adresseras:**

"Till Göteborgs Trädgårdsförening."

1. Genom denna nya prisuppgift annulleras alla föregående. De i densamma förekommande kulturbeskrifningar och öfrige upplysningar göra den i någon mån äfven till en handbok i trädgårdsskötsel. Alla nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckte med fetare stil, för att lättare kunna observeras. Öfverst på hvarje sida finnes dess innehåll angifvet.
2. **Reqvirenter** anmodas att utskrifva requisitionen på **ett särskildt blad**, helst upptagande **frö** för sig, och **växter** för sig, **med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande**. Då det någon gång inträffar att en eller annan sort så starkt requireras, att förrådet deraf snart upprymmes, vore det önskligt, att å requisitionen antecknades om det tillåtes oss att i så fall fylla bristen med andra, motsvarande sorter. De reqvirenter, som vilja anförtro oss urvalet af sorterna, våga vi försäkra, att det skall ske med största omsorg.
3. Vid oförutsedda förändringar af värdet å de mest gängbara frösorterna, ihälda vi oss ingen annan förbindelse, än att notera det billigaste pris, som omständigheterna medgifva.
4. Requisitioner, som **icke** åtföljas af **penningar** eller **anvisning** på något känt handels-hus härstädes, **expedieras ej**, såvida reqvirenten ej förut stätt i affärsförbindelse med oss. **Öfverskott** af insände penningar återsändas noggrant då räkning å det requirerade aflätes.
5. **Reqvitioner**, hvars värde ej uppgår till **minst 10 rdr rmt**, torde **alltid åtföljas af liquid**.
6. Å **reqvitioner**, hvilka åtföljas af **liquid i förskott** och uppgå till belopp af **minst 50 rdr rmt**, godtgöres **6 % rabatt**; dock får **rabatt** ej beräknas för **gräs- och ekonomi-frö** eller för **emballage**.
7. Emballeringen verkställas sorgfälligt och debiteras så billigt som möjligt.
8. Afsändningen sker för köparens räkning och risk, sedan vi såsom afsändare uppfyllt våra förbindelser.

Våra **prisuppgifter** å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

genom **Georg Löwegren**.

Innehållsförteckning.

Prisuppgiftens innehåll, som finnes angifvet öfverst på hvarje sida, är uppställt i följande ordning:

FÖRSTA AFDELNINGEN,

Prisförteckning å frö:

A. Frö till Röksträdgårdsoväxter:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| I. <i>Kålväxter.</i> | VI. <i>Spinatväxter.</i> |
| II. <i>Rotväxter.</i> | VII. <i>Salladsväxter.</i> |
| III. <i>Knölväxter.</i> | VIII. <i>Kryddväxter.</i> |
| IV. <i>Skidfrukter.</i> | IX. <i>Gurkartade växter.</i> |
| V. <i>Sparrisväxter.</i> | X. <i>Lökväxter.</i> |
| | XI. <i>Ätliga Svampar.</i> |

B. Frö till Gräs-, Foder- och Ekonomiväxter:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| I. <i>Gräsväxter.</i> | III. <i>Diverse Foderväxter.</i> |
| II. <i>Klöfverväxter.</i> | IV. <i>Diverse Ekonomiväxter.</i> |

C. Frö till Blomster- och Bladväxter:

- | | |
|---|---|
| I. <i>Modeblommor eller Sortimentblommor.</i> | V. <i>Ettåriga (annuella) växter och sortimenter deraf.</i> |
| II. <i>Dekoratifva Bladväxter, jemte sortimenter deraf.</i> | VI. <i>Två- och fleråriga (bienna och perenna) växter, jemte sortimenter deraf.</i> |
| III. <i>Dekorationsgräs och sortimenter deraf.</i> | VII. <i>Krukväxter och sortimenter deraf.</i> |
| IV. <i>Slingerväxter och sortimenter deraf.</i> | |

D. Frö till Ormbunkar och sortimenter deraf.

E. Frö till Barrväxter.

ANDRA AFDELNINGEN.

Prisförteckning å växter:

- | | |
|---|--|
| I. <i>Frukträd och Bärbuskar, m. m.</i> | V. <i>Fröplantor till Ettåriga Blomsterväxter.</i> |
| II. <i>Träd och Buskar till Allé-, Park- och Trädgårds-anläggningar, jemte sortimenter deraf.</i> | VI. <i>Fleråriga Blomsterväxter och sortimenter deraf.</i> |
| III. <i>Buskar till häckar och bersäer.</i> | VII. <i>Krukväxter och sortimenter deraf.</i> |
| IV. <i>Törnrosor för fritt land och sortimenter deraf.</i> | VIII. <i>Praktexemplar af krukväxter.</i> |

I slutet af prisuppgiften finnes infördt ett:

Register,

upptagande alla i densamma förekommande svenska växtnamn, jemte anvisning hvar de i prisförteckningen återfinnas.

Första Afdelningen.

Prisförteckning å frö:

A. Frö till Röksträdgårdsväxter.

Efter vigt säljes ej mindre än 1 ort. Från och med 25 ort säljas efter *tt.*-priset.

Pr tt. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Pr tt. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

I. Kålväxter:

Bladkål. (<i>Brassica oleracea acephala.</i>)		
hög, blå, krusbladig	3	— 5
hög, grön, krusbladig	4,40	— 7
låg, blå, krusbladig	2,40	— 5
hög, grön, krusbladig	2,40	— 5
ljusgrön Edinburger-	4	— 6
plumage- eller fjäder-	—	— 10
palmtrod-, å port. 8 öre	—	— 20
jätte-,	5	— 7
träd- eller kokål:	4	— 6
snitt- eller värkål	1	— 3
brun	1	— 3
gul	3	— 5
grön	1,75	— 4

Till odling för köket är isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen att rekommendera. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina spräckliga, färgskiftande blad. Jätte- ko- och palmträdskålen användes till kreatursfoder; den sistnämnda äfven till prydnadsväxt på kalljord.

Brüssel eller Rosenkål. (*Brassica oleracea gemmifera.*)

hög	4	— 6
låg, förbättrad	2,40	— 5
roseberry	5	— 7

Dessa utmärkta kålsorter fordra god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen afknipes, längs utmed stammen en mängd små, törnroslika hufvuden, hvilka, om de väl tillagas, äro lika välsmakande som blomkål. Inplanteras på hösten i kallare, hvarst de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing. (*Brassica oleracea capitata bullata.*)

tidig, gul Blumenthaler	3	— 5
Drumhead	3	— 5
sen	3	— 5
tidig, grön	4	— 6
chou marcelin	4	— 6
Waterloo curled	3,50	— 6

Alla sorterna behandlas som vanlig hvitkål.

Hufvudkål. (*Brassica oleracea capitata.*)

hvit, Svensk från Kinnekulle, utm. stor och god sort	6	— 8
extra stor, platt Braunschweiger	5	— 7
platt Lübecker-	4,50	— 7
Yorker-, tidig	3	— 5
Drumhead-, stor Engelsk, sen	2	— 4
midssommarkål, låg, tidig, utmärkt	4	— 6

Hufvudkål, hvit majspets-, tidig, med spetsiga hufvuden	6	— 8
hvit sockertopp-, tidig med spetsiga hufvuden	5,50	— 8
Enfielids Markt-, tidig	3,50	— 6
Emperor-, tidig	3,50	— 6
Prince Albert	3,50	— 6
röd Cabus-, stor, platta hufvuden	—	— 8
Erfurter tidig	—	— 12

Blomkål. (*Brassica oleracea botrytis.*)

Erfurter dverg-, (Haages) l:ma å port. 20 öre	2,50	
Holländsk dverg-, å p. 10 öre	—	— 50
tidig engelsk	14	— 16
sen engelsk	14	— 16
Asiatisk, stor sen	14	— 16
Cyprisk, tidig	—	— 16
Siciliansk, svart	—	— 20
standholder-, utmärkt	16	— 18
Walchern-, utmärkt	16	— 18

Till drifning är Haages Erfurter dvergblomkål den bästa. Blifver ej gerna öfver 15 tum hög, har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufvuden.

Broccoli eller Sparriskål. (*Brassica oleracea botrytis cymosa.*)

Engelsk, violett	—	— 8
hvit	—	— 8

Denna, förstades i utlandet med förkärlek odlade kål, är nära beslägtad med blomkålen, hvaraf den endast är en förändring. Odlas icke så mycket för blomknopparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjelkarne, hvilka kunna nyttjas som sparris. Behandlas som blomkål, men behöfver större utrymme.

II. Rotväxter:

Kålrabbi. (*Brassica oleracea caulocarpa.*)

glas-, tidiga, hvita	5	— 7
tidig, blå	5	— 7
sen, hvita	—	— 5
blå	2	— 4

Trifvas bäst och blifva smakligast på svala platser. Pl. på 1 å 1½ fots afstånd från hvarandra.

Kålrötter. (*Brassica Napus rapifera.*)

gula, underjordiska	—	— 90
hvita, underjordiska	—	— 90
Schmalz-, gula	—	— 90
jätte-, rödgrättoppiga, släta	1	— 3
golden ball, guldgula	1,50	— 4
stora, hvita Pommerska	1,75	— 4

De gula sorterna, hvilka hos oss vanligen kallas "rotabagga" äro mest omtyckta. Planteras 1½ fot ifrån hvarandra, eller utsås mycket tunn 1 rader och gallras sedan.

	Pr <i>℔</i> .	Ort.
	Rmt Rd	ö. Rd ö.
Rofvor, (<i>Brassica Rapa rapifera</i>)		
" tidiga, hvita, runda maj.	— 80	— 3
" Amerikanska, runda, röda	2 —	— 4
" Maltheser, fina gula	2 —	— 4
" Wilhelmsburger-, runda, gula	1 —	— 3
" Wiburger, gula	2 —	— 4
" Teltower, små, äkta.	1 —	— 3
" Märkiska	1 —	— 3
" snow ball, hvita, Eng. runda	1 —	— 3
" Bottfelder-, långa, gula	— 80	— 3
" höst-, hvita, långa, gula	— 80	— 3
" Åker-, rödtoppiga, långa	— 80	— 3
" Med undantag af majfrovan, hvilken utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller straxt efter midsommar. Jorden bör ej till någon af rofsorterna vara nygödslad, utan heldre något mager. De små sorterna böra hafva 3 å 4 tumms afstånd från hvarandra; de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.		

Rättikor, (<i>Raphanus sativus esculentus</i>)		
" vinter-, långa, hvita	— 80	— 3
" runda, svarta	— 80	— 3
" sommar-, tidiga, svarta	1 —	— 3
" " tidiga, hvita	1 —	— 3
" " gula Wiener Maj.	1,20	— 3
" höst-, rosenröda	1,50	— 4
" Fordra en något fuktig, lös och lucker, förra året gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 å 5 tum från hvarandra.		

Rådiser, (<i>Raphanus sativus radícula</i>)		
" månads-, runda hvita	1,20	— 3
" runda röda	1,20	— 3
" " gula	1,40	— 3
" " violetta	1,20	— 3
" Wood's superb frame Radish	1,60	— 4
" Early scarlet	2 —	— 4
" långa, hvita	1,40	— 3
" långa, tidiga, rosenröda, Glas-	1,40	— 3
" ovala, högröda, utmärkta	2 —	— 4
" hvita, italienska	1,60	— 4
" högröda med hvita rotändar	2 —	— 4
" från Madras (<i>Raph. caudatus</i>)	— —	— 40
" alla sorter, blandade	1,75	— 4

å port 10 öre.

" Blifva bäst i en sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rådiser utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti. R. caud. har långa, ormlika skidor, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsmakande.

Haferötter, (<i>Tragopogon porrifolium</i>)		
" vanliga	3 —	— 5
" En tvåårig växt hvars frö utsås tidigt på våren, i lös och lucker, året fört gödslad jord. Om hösten upptagas rötterna och förvaras öfver vintern i kallare, uti sand.		

Scorzonera, (<i>Scorzonera hispanica</i>)		
" vanliga	3 —	— 5
" Vid upptagning af såväl scorzonera som hafre- rötter bör man noga akta sig att rötterna ej på något sätt säras, ty då utrinne den i dem befintliga, hvita mjölksaften, hvilket försäkras röta.		

Cichoria, (<i>Cichorium intybus</i>)		
" äkta Braunschweiger	1,60	— 4
" ny jätte-	2 —	— 4
" Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat. Bladen lemna ett godt foder till mjölkkor. Se vidare under rubr. "Salladsväxter."		

	Pr <i>℔</i> .	Ort.
	Rmt Rd	ö. Rd ö.
Morötter, (<i>Daucus Carota</i>)		
" tidiga karoter	1,80	— 4
" Douviker-, korta, tidiga	2 —	— 4
" Pariser-, (trés-courtes de Paris)	3 —	— 5
" Hornska, tidiga, långa, röda	1,20	— 3
" violetta, långa, fina	1,80	— 4
" Dippes tidiga, halflånga, röda; utmärkt och god sort	1,60	— 4
" rent hvita, fina	1,60	— 4
" Surrey-, långa, röda	2 —	— 4
" Altringhams-, stora, långa söta	1 —	— 3
" Braunschweiger-, långa, röda.	1 —	— 3
" Belgiska, hvita stora med gröna toppar, pr 100 <i>℔</i> . 75 rdr.	— 80	— 3
" orangegula, gröntoppiga jätte-	1,40	— 3

pr 100 *℔*. 95 rdr.

pr 100 *℔*. 95 rdr.

pr 100 *℔*. 135 rdr.

Till drifning äro de tre förstnämnda sorterna bäst passande. De hvita sorterna, med undantag af gröntoppiga belgiska, äro såsom stufvade utmärkt välsmakande. Altringhams-, de hvita Belgiska och orangegula morötterna användas hufvudsakligen till kreatursfoder. Morötterna fordra en fet, men ej nygödd, sandig, lätt och lös jord.

Palsternackor, (<i>Pastinaca sativa</i>)		
" vanliga	— 60	— 3
" stora runda	1 —	— 3
" från Jersey	1 —	— 3
" student-	1,50	— 4
" Fröet kan äfven med fördel utsås om hösten.		

Körvelrosvor, (<i>Scandiac Bulbosa</i>)		
" vanliga	2,40	— 5
" Sibiriska (<i>Cherophyllum Prescottii</i>)	— —	— 8
" Fröet bör helst säas om hösten, ty om det öfver vintern förvaras så groor det mycket ojemnt. Fordrar fet och lucker jord. De om hösten sådde äro i Juli färdiga att begagnas i hushållet. En fin och omtyckt köksväxt.		

Rotpersilja, (<i>Petroselinum sativum</i>)		
" stor Bardoviker	— 60	— 3
" socker	— 80	— 3
" Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan så, att hvarje planta får en quadratfots utrymme. Öfrige sorter, se kryddväxter.		

Rotselleri, (<i>Apium graveolens</i>)		
" stor, Berliner-	2,40	— 4
" mycket stor Erfurter-	2,80	— 5
" Fröet säas tunnt i en ljum drifbänk och plantorna utsätts, med 1½ fots afstånd mellan hvardera, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Utmärkt släta och vackra rötter erhålles, om man i Augusti borttager det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskir alla sidorötter. Uppagas om hösten och förvaras i kallare.		

Sockerrötter, (<i>Sium Sisarum</i>)		
" vanliga	5 —	— 7
" Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, hvilka om våren planteras på 1 fots afstånd från hvarandra. Bör ej förväxlas med scorzonera, som af många kallas sockerrötter.		

Rödbetor, (<i>Beta vulgaris</i>)		
" Holländska, mörkröda	— 80	— 3
" Nutting's selected dwarf red	1,60	— 4

Pr *℔*. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

- Rödbetor, Castle Nandry, utmärkta 1,60 — 4
 " White's new, karnosinröda . . . 1,60 — 4
 " Bassano-, runda, ljusröda, fina 1,60 — 4
 För hvarje planta lägges 3 à 4 frökorn så, att plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra. Sedan borttagas de svagaste så att endast den starkaste plantan får stå kvar på hvarje ställe. De utgallrade kunna, om man så vill, planteras på en annan plats.

- Rapunzel, (*Campanula Rapunculus*.)**
 " små, fina, äkta 1,60 — 4
 " Flerårig; utsås i rader i god jord. Bör ej förblandas med Valerianolla eller Fedia Olitoria, hvilka somliga äfven kalla rapunzel.

- Rapontica eller Rapunzelselleri, (*Oenothera biennis*.)**
 " stor gul 1,80 — 4
 " utsås i Maj på kalljord. (Vid tidigare sääd skjuta de redan första sommaren blomstjelkar, hvarefter roten är oduglig.) I Oktober upptagas rötterna och öfvervintras i källare eller skåtras de i skifvor och inläggas i ättika och olja.

III Knölväxter:

- Jordärtskockor, (*Helianthus tuberosus*.)**
 " vanliga 30 — —
 Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader, 6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om hösten upptages hvad man ännar använda under vintern; de öfriga kvariemnas på sängen. Växten blifver 6 à 8 fot hög; bör derföre sättas så, att den ej hindrar spätrade växter.

- Potates, (*Solanum tuberosum*.)**
 " blandade sorter 8 — — 10
 Utsås om våren i en ljun driftbänk. När nutfrosterna upphöra utplant. plantorna på sängar och behandlas som vanligt. Genom frösääd erhåller man ofta nya och för de lokala förhållandena passande sorter.

- Jordmandel, (*Cyperus esculentus*.)**
 " vanlig 5
 En gräslik växt, hvars rotknölar sedan nutfrosten upphört utplanteras i god, sandig jordmån, 6 à 8 tum från hvarandra. Jordmandeln användes dels som kaffesurrogat, dels stekes den och ätes som kastanjer.

- Härklöfver, (*Oxalis esculenta*.)**
 lökar, pr 100 st. 1 rdr — — — —
 Fortpl. genom smålökar, som af växten bildas i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tum mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lökarna förvaras frostfritt och de hvita, tjocka rötterna tillagas som blomkål.

IV. Skidfrukter; Ärtor, Bönor, etc.:

Pr *℔*.
Rmt Rd ö.

- Sockerärter, (*Pisum sativum*.)**
 " stora sabel-, pr 100 st. 45 rdr . . . — 50
 " " sabel-, med vaxgula skidor . . . — 65
 " " grå jätte-, 5 à 6 fot höga . . . — 80
 " " buxum-, låga 2 — —
 " krypp-, 1 à 1½ fot höga — 50
 " Willmorins skrynkliga mærg-, 2 fot — 60
 Af alla sorterna sockerärter användas hela skidan som mat. De fyra första behöfva 3 alnar långt ris; de två sistnämnda, som blifva blott omkring 1½ à 2 fot höga, behöfva ej risas.

Pr *℔*.
Rmt Rd ö.

- Spritärter, (*Pisum sativum hortense*.)**
 " maj-, 2 à 3 fot hög, tidigaste . . . — 35
 " Auyergne-, 4 fot, tidig, riktbarande . . — 35
 " Prince Albert-, 2½ fot, tidigaste . . — 35
 " biskops-, 1 fot hög, tidig — 40
 " " med långa skidor, 1 fot hög . . . — 40
 " Burbridges eclipse-, 2 fot, tidig . . . — 45
 " Capet-, grön, 2½ fot — 35
 " capuziner-, grå, 2 à 3 fot höga . . . — 50
 " " hvita, 3 à 4 fot höga — 60
 " Charlton-, 4 fot, tidig — 30
 " cymitar-, 4 fot, tidig — 40
 " Daniel O'Rourke-, 2 à 3 fot, tidigast — 40
 " Early wonder-, utmärkt sort — 50
 " Fairbaird's surprize, 5 fot hög . . . — 40
 " stora sabel-, 4 à 5 fot hög — 35
 " gula vax-, — 60
 " Laxton's prolific, medeltidig, mycket riktbarande, god sort — 45
 " Dickson's first and best, 2½ f., tidigaste — 45
 " " favorit-, tidigaste, låg — 40
 " Harrison's glory, 2½ fot, tidig . . . — 40

- Mærg-spritärter,**
 " paradis-, 4 fot, tidig — 50
 " Thurston's Reliance-, 8 fot, riktbar. — 50
 " Victoria-, 5 fot, riktbarande . . . — 40
 " Waterloo-, 6 fot, riktbarande . . . — 40

- Skrynkliga mærg-sprit-ärter,**
 " Brittitsh Queen-, 6 fot hög — 60
 " champion of England-, 4 fot — 45
 " Knight's dwarf green-, låg, utmärkt — 45
 " " dwarf white-, låg, utmärkt . . . — 45
 " " tall green-, hög, utmärkt . . . — 60
 " " white-, hög, utmärkt — 60
 " Lord Raglan's-, 2½ fot — 50
 " ne plus ultra, god sort — 50
 Till drifning användas endast de lägsta och tidigaste sorterna. De skrynkliga mærgärterna utmärka sig genom sin sötna.

- Stångbönor, (*Phaseolus vulgaris*.)**
 " stora svärd-, eller Turkiska 1,20
 pr 100 *℔*. 115 rdr.
 " jätte-socker-bryt-, grönskaliga, utm. . . 1,20
 " " socker-vax-, med gula skidor, extra 1,20
 " " " vax-bryt-, svart, mycket mör, utomordentligt gifvande sort 1,40
 " tidigaste socker-bryt-, ny sort, tidigast af alla hittills kända stångbönor och utmärkt i alla afseenden . . . 1,40
 " hvita, fina socker-perl-, 1,20
 " " Romerska vax-, med gula skidor, ny, utomordentligt gifvande 1,60
 " svarta, Romerska vax-perl-, 1,20
 " " Algier-, tidiga, riktbarande 1,20

- Kryppbönor, (*Phaseolus vulgaris nanus*.)**
 " perl-, hvita, tidiga — 80
 " svärd-, breda, tidiga, till drifning . . — 60
 " Holl. svärd-, allratidigaste, till drifn. — 60
 " adler-, rödfäackiga — 60
 " gula, tidiga — 60
 " socker- eller smör-, hvita, tidiga . . . — 60

	Pr <i>fl.</i>	Rmt Rd ö.
Krypbönor, Ilsenburger-, brokiga, tidiga	—	60
„ Kafferländer-, svartbrokiga	—	70
„ svarta	—	50
„ bruna, (Callevanser, Prinsessbönor)	—	35
	pr 100 <i>fl.</i>	30 rdr.
„ tusen för en, hvita	—	80
„ tusen för en, gula	—	80
„ flageolett-	—	60

Rosen-; Blomsterbönor, (*Phac. multifl.*)
 svärd-, rödblommande. 1 —
 Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordra någorlunda torr, ej nygödslad jord och varmt läge. Till drifning äro Holländska, Ilsenburger- och adlerbönor tjenligast. Blomsterbönorna användas och behandlas som vanliga Turkiska bönor, men dess vackra skraklakanröda blommor göra dem äfven användbara såsom prydnadsväxter.

Wälska eller Bondbönor. (*Vicia Faba* eller *Faba vulgaris.*)
 „ ordinära, pr 100 *fl.* 25 rdr. — 30
 „ Windsor-, Engelska, stora, hvita — 40
 „ „ Engelska, stora gröna — 50
 „ Mazagon-, tidiga — 60
 „ Johnston's wonderfull-, — 40
 „ Marshall's-, låga, riktbarande — 65
 „ cluster-, dverglika, riktbarande — 55
 „ red blossom, rödblom. Amerikanska — 60
 „ monark-, nya, med låga skidor — 50
 Trifvas öfverallt och planteras antingen i kanten af andra sängar eller på en särskild plats, 2 å 3 tum djupt och 1½ fot från hvarandra.

Linsor, (*Ervum* eller *Cicer Lens*)
 „ vanliga, hvita — 40
 Fröet säs i rader med 1½ å 2 tumns mellanrum.

Svenskt kaffe eller Astragal Kaffe. (*Astragalus boeticus*) pr ort 5 öre. 2,75
 Säs om våren på en varm plats i kraftig jordmån, men först bör fröet ligga i vatten ett par dagar, för att mjukna. Då fröet skall uttagas bör man uppmjuka skidorna i varmt vatten, hvarefter kärnorna torkas i ugn och användas som kaffe.

V. Sparrisväxter:

	Pr <i>fl.</i>	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Sparris. (<i>Asparagus officinalis.</i>)		
„ Darmstädter-,	2	— 4
„ Grayson's jätte-,	3	— 5

Fröet utsås höst eller vår, 1 tum djupt i rader med 1 fots mellanrum. Om hösten afskäres stänglarne, hvarefter sängarne betäckas med ett tunnt lager af brunnen gödsel. Då plantorna äro 2 år gamla utsätts de på för dem anordnade sängar. Man brukar äfven att utså fröet direkt på den plats der plantorna framdeles skola stå, hvarigenom omplanterings-arbetet inbesparas och ändamålet vinnes nästan lika snart, som då 2- å 3-åriga plantor utsätts. För sådant ändamål lägges fröet i en eller tvenne rader på sängar med 2 fots mellanrum. På hvarje ställe lägges 4 å 5 frö och sedan bortplockas de öfverflödiga plantorna. Om hösten betäckes man sängarne med brunnen gödsel, hvilken om våren försigtigt nedmyllas mellan plantorna och så fortfares tilldessa plantorna hafva ett 8 å 10 tumms jordlager öfver sig. På fjerdje (stundom på tredje) året efter sänningen, kan sparrisren skördas.

	Pr <i>fl.</i>	Ort.
	Rmt Rd öre.	Rd ö.
Sparrisarter. (<i>Lotus tetragonolobus</i>) 1 — — 3		
Ettårig växt; säs i rader; skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.		

Matrhäbarer, (*Rheum.*)
 „ Queen Victoria — 10
 „ Prince Albert — 6
 „ jätte-, — 6
 „ blandad, (*R. undulatum, Rha-*
ponticum & Emodi.) 3,60 — 8
 Fröet säs på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försiggomna, omplanteras de i fet och djup jord i tvenne rader på en 5 fot bred säng. Om hösten nedgräfvess brunnen gödsel mellan plantorna.

**Strand- eller Sjøkål, (*Crambe*
maritima)** — — — — —
 Fordrar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet lägges i tvenne rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 å 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afskäres bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga af sängen betäckes med brunnen gödsel, som om våren nedmyllas mellan plantorna. Under sommaren afbröytas alla blombarande skott. Tredje våren, innan plantorna börjat växa, stjelpes tomma krukor, trälador, gamla bikupor eller dylikt öfver stånden, hvarefter de i mörkert framskjutande, gulgröna skotten afskäras och användas till mat. Skörden fortfar till Juni, då betäckningen borttages.

Bladselleri. (*Apium graveolens variegatus.*)
 „ hvit och violett — 6
 „ Coles new crystal white — 6
 „ Seymour's white champion — 6
 „ Sheppard's red gigantic — 6
 „ Red solid, red gigantic — 6
 Varieteter af rotselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter.) Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras sedan i 1½ fot djupa fåror, hvilka, allt eftersom bladstjelnarne skjuta i höjden, fyllas med den ur fårona tagna jorden. När fårona äro fyllda börjar man kupa. I Sept. och Oktober kan man aftaga stjelnarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar mycket fet, nygödd jord.

Kronärtskockor, (*Synara Scolymus.*)
 „ Fransyska, stora gröna 10 — — 12
 „ Bretagner-, stora — 35
 „ violetta, stora — 20
 Fordrar varmt, torrt läge och starkt gödslad jordmån. Fröet utsås i 2-tums krukor, ett frö i hvarje och krukorna ställas sedan i ljum drifbänk. Sedan plantorna så småningom fått växas vid den yttre luften, utplanteras de på 2- å 3 fots afstånd från hvarandra. När blomknopparne framkomma bör man blott bibehålla 5 å 6 sådana på hvarje planta, de öfriga aflägsnas. Om vintern betäckas plantorna med näfverhattar, trälador eller dylikt, hvarpå lägges torrt lät eller myrstack.

Spansk Cardy eller Cardoner, (*Cynara Cardunculus.*) — — — — — 6
 Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans och planteras sedan med 3 å 4 fots mellanrum i en fåra, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklat sig sammanhängs de och omvändas med halm, hvarefter jorden nedföres i fåran och kypas kring plantorna, så att blott bladspetsarne synas. Två eller tre veckor därefter äro de färdiga för köket.

Sparrisallad, (*Lactuca angustana*) — — — — — 6
 För att få tidig skörd utsås fröet i ljum bänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraf-

Pr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

tig jord. Eljest utsås fröet hvar 14:de dag på kalljord. Blomstjekarne skördas innan blomman utvecklat sig och anrättas som sparris.

Angelika, *Angelica Archangelica* — — — 5

Denna växt, som förekommer vild i Lappland, är särdeles omtyckt af Lapparne. Man afdisar det yttre skalet jemte stamfibren; alla det öfriga ätes, antingen rått eller stufvadt tillsammans med Lappska syra. (*Oxyura digyna*.) De utvecklade blomknopparne läggas på köttsoffa, som derigenom får en egendomlig, behaglig smak. Växten är tvåårig och fordrar en fet, lös och fuktig jordmån.

VI. Spinatväxter:

Spinat, (*Spinacia glabra & spinosa*)

” bredbladig, stor med rundt frö — 40 — 3
pr 100 *tl.* 35 rdr.

” stor med spetsigt frö. — 40 — 3

” salladbladig (de Gaudry) — 40 — 3

” Savoy — 60 — 3
Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.

Winter- eller Romersk Spinat,

(*Rumex Patientia*) 1,60 — 4

Fröet säs i kall bänk eller på kalljord. Plantorna sättas i 4 rader på en 4 fot bred säng. Planterad i läder och ställd i växthus, kan den skördas hela vintern.

Spansk Syra, (*Rumex Acetosa*)

” vanlig 2 — — 4

” jette, från Belleville 2,40 — 5

Varieteter af den hos oss vildt växande arten; behandlas som *Patientia*.

Nyseeländsk Spinat, (*Tetragonia expansa*)

” vanlig 1,60 4

Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de så, att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.

Molla eller Mell, (*Atriplex hortensis*)

” gul och röd — 3

Behandlas som spinat. Man bör ej låta för många planter bära frö emedan växten lätt kan blifva ett ogräs och dessutom betydligt utsuger jorden.

Quinoa, (*Chenopodium Quinoa*) . 1,60 — 4

Odlas som spinat; fröet kan användas som gryn.

Portlak, (*Portulaca oleracea & sativa*)

” gul 3,60 — 6

” grön 2,80 — 5

Utsås i bänk, utplanteras sedan i fet, lös jord med 6 å 8 tums mellanrum.

Isplanta, (*Mesembryanthemum crystallinum*)

å port. 8 öre — — — 40

Bladen lemna en särdeles fin spinat. Fröet säs i bänk eller kruka och plantorna sättas på sängar i god, lös jord.

Mangold, (*Beta cicla*)

” vanlig — 60 — 3

” ny, särdeles fin, Schweizer 3 — — 5

” poirée å cardes blanches. — 5

” Brasiliansk, i flera färger 1,20 — 3

Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spinat eller sallad. För vinterbehovvet planteras rötterna i läder, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.

Phytolacca esculenta — 8

Bladen begagnas som spinat. Fröet säs i bänk och plantorna sättas i rader. Växten blifver 5

Pr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

å 6 fot hög. Rotknölarne kunna öfvervintras om de täckas med löf eller myrstack.

VII. Salladväxter:

Snittsallad, (*Lactuca sativa foliosa praeox*)

” tidig, gul 1,80 — 4

” gul, krusbladig 1,80 — 4

” ny, fin, mosslik — 4

Sätter inga hufvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifvit färdiga.

Bindsallad eller Sommar-Endivie, (*Lactuca sativa romana*)

” Victoria — 5

” Pariser- — 5

” Casseler-, krusbladig — 5

” Dunnett's brun jätte-, stor — 20

” ny jätte- — 12

” Carter's hvit jätte-, stor, god — — — 20

” imperial Bath, brun — 12

” chicon palatine, stor — 20

Dessa präktiga salladsorter bilda ej hufvuden, hvarför man brukar sammanbinda ytterbladen, hvarigenom de inre blifva bleka och mörre. Fordra starkt gödslad jord och böra säs flera gånger under sommaren till in i Augusti.

Hufvudsallad, (*Lactuca sativa capitata*)

” Asiatisk, stor, gul 3 — — 5

” Berliner-, stor, gul 3,60 — 6

” Steinkopf-, tidig gul 4 — — 6

” Schwedenkopf-, rödaktig, extra 4 — — 6

” Schweizer-, god sort 4 — — 6

” Haarlemer-, brun 4 — — 6

” Blodfelle 4 — — 6

” Mogul, stor, rödkantad 4 — — 6

” Jätte-Mogul, stor 4 — — 6

” Broy-Geel-, utmärkt 4 — — 6

” dubbelhufvad, (*Lact. discocephala*) — — — 6

” Whelers Thom-Thumb-, för- — — — 10

” träfflig — — — 10

” non plus ultra-, ny, fin, gul — — — 10

” Perpignerer, äkta, å p. 5 öre — — — 20

En af de aldra bästa sorter; har mycket fasta hufvuden, som hålla sig ovanligt länge.

” All the year round, god och — — — 30

” fin, å port. 10 öre — — — 6

” alla sorter blandade 4 — — 6

Alla salladsorter fordra fet jord och mycken fuktighet, hvarförutan hufvudena blifva små och osmakliga. Plant. sättas på 10 å 12 tums afstånd från hvarandra. Fröet utsås hvar 14:de dag till slutet af Juli. Till drifning passa Broy-Geel, Steinkopf, Mogul och Whelers Thom-Thumb.

Cichoria, (*Cichorium Intybus*)

” äkta Braunschweiger 1,60 — 4

” ny, föräträd, storbladig 2 — — 4

Rötterna intagas om hösten och insläs i sand uti källare eller planteras i trälåder, som ställas bakom hyllorna i ett växthus. Bladen begagnas till sallad. Se äfven under rubrik: Rotväxter.

Endivie, (*Cichorium Endivia*)

” grön, krusbladig, vinter-, — 5

” gul, krusbladig, vinter-, — 5

” Casseler-, bredbladig — 5

” Escariol-, stor, gul, bredbl. — — — 5

” fin, krusig, mosslik — 8

Pr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Utsås i Juni eller Juli. Då plantorna hafva 4 å 6 blad planteras de på en säng med 1 fots mellanrum. När bladen utbildat sig, sammanbindas de och blifva efter 14 dagar färdiga att begagnas. Upphängas under vintern på snören i en stor källare. Användes i utlandet mycket, såväl till soppor, som till sallad.

Maskros eller Lejontand, (*Leontodon Taraxacum* eller *Taraxacum officinalis.*)

„ odlad 3
 „ ny, mycket storbladig, extra 25
 å port. 5 öre.

Bladen af denna öfverallt förekommande växt, användes utrikes mycket till sallad. Utsås i rader på sängar. Om hösten påläggas ett så tjockt löflager, att frost utestänges. Om våren borttages denna betäckning och hela säden infattas med bräder, eller och påsätts vanliga drifbänklådor, hvaröfver man lägger gamla brädstumpar och derofvanpå löf eller strö. De under denna öfverbyggnad i mörkret talrikt framkommande bladen blifva möra och välsmakande samt kunna skördas upprepade gånger.

Krusig Krasse, (*Lepidium sativum.*)

„ ordinär 50 — 3
 „ dubbel eller krusig 75 — 3
 „ fin, krusig mosslik 1,50 — 4
 För tidig skörd säs fröet tjockt i lådor, som ställas i växthus, boningsrum eller stall. Till senare bruk säs fröet på kalljord. Trifves hvar som helst.

Skedört, (*Cochlearia officinalis*) — — — 8

Säs i rader och bör ej omplanteras. Bladen kunna skördas hela året om.

Kapuciner- eller Indiansk Krasse,

(*Tropaeolum majus*) 2 — — 4

Trifves i all slags god jord. Bör stödjäs med ris, eller planteras vid espalier. Se äfven under rubrik: Kryddväxter.

Åker- eller Vintersallad, (*Valerianella (Fedia) Oleria*)

„ storbladig 1 — — 3
 Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten, vintern och våren.

VIII. Kryddväxter:

Anis, (*Pimpinella Anisum*) 1 — — 3

Ettårig, säs tidigt om våren i mager jord.

Basilica, (*Ocimum Basilicum.*)

„ stor gröön 2,80 — 5

„ fin, violett — — 7

„ stor sked- eller skepps- — — 10

Ettåriga växter. Säs i bänkar och planteras i Maj på kalljord.

Boretsch eller Gurkört, (*Borago officinalis*) 4

Ettårig; säs på kalljord. Bladen användbara till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas till prydnad på stekfat, karotter, m. m.

Citronmeliss, (*Melissa officinalis*) — — — 8

Betäckes om vintern; fordrar skugga och god jord.

Coriander, (*Coriandrum sativum*) — 60 — 3

Säs på våren i sandig, ej fet jordmån.

Dill, (*Anethum graveolens*) 80 — 3

Ettårig; fortplantar sig ofta sjelf.

Dragon, (*Artemisia Dracunculus*) — — — —

å port. 20 öre.

Bladen användas vid inläggning af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Planteras i rader med 12 å 15 tum mellanrum; omplanteras och delas hvartannat år. Betäckes om hösten med gammal gödsel från bänkarne.

Pr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Fenkol, (*Foeniculum officinalis.*)

„ söt Bologneser 1,50 — 4

„ Fordrar fet jord och skyddadt läge. Fröet säs på kalljord och plantorna sätts sedan i rader, i 3 tum djupa fåror, 1 fot ifrån hvarandra. Täckas om hösten med granis och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt.

Isop, (*Hyssopus officinalis*) 2 — — 4

Egnar sig förträffligt till infattningar.

Indiansk- eller Kapuciner-Krasse, (*Tropaeolum majus*) 2 — — 4

Se salladväxter. Utrikes begagnas ej blott den s. k. Krasseknoppen, utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.

Kummin, (*Carum carvi*) 90 — 3

Utsås på fritt land; omplanteras ej.

Kyndel, (*Satureia hortensis*)

„ sommar- — — — 6

„ vinter- — — — 8

Behandlas som kummin.

Kärleksäpple eller Tomates, (*Lycopersicum esculentum* eller *Solanum Lycopersicum.*)

„ vanliga, å port. 5 öre — 6

„ extra tidiga, röda — 15

„ stora, gula — 15

„ nya, monströsa, rosenröda — 60

å port. 15 öre.

Den sistnämnda sorten, hvars frukter hafva en fin vinsmak och öppnå en ansehnlig storlek, bildar 12 å 20 fot långa ränkor, prydda af talrika frukter. Alla sorterna säs i drifbänk och utplanteras när frostn upphört på skyddade, varma platser t. ex. mot söder belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och nygödslad. Qvistarne uppbindas vid espalier och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig. Utmärkta Köksväxter.

Körffel, Svensk, (*Anthriscus Cerefolium*) 1 — — 3

Ettårig; trifves hvarsomhelst. Fröet utsås flera gånger under sommaren.

Körffel, Spansk, (*Scandix* eller

Myrrhis odorata) 10 — 12

Flerårig; säs i rader på skuggigt ställe.

Lavendel, (*Lavandula Spica*) 2,20 — 4

En i köksträdgårdar, synnerligen i Sverige, mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras hvart tredje år och sättes dervid så djupt, att endast 2 å 3 tum af grenarne synas ofvan jord.

Malört, (*Artemisia Absinthium*) — — — 6

Fordrar sandjord; kan äfven fortplantas genom delning.

Malva, Lrusbladig, (*Malva*

crispa) — — — 5

Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad på stekfat, m. m.

Mejram, (*Origanum vulgare*) 6 — — 8

Fortplantas äfven genom rotdelning.

Persilja, blad-, (*Petroselinum sativum.*)

„ vanlig, slätbladig — 60 — 3

„ krusbladig 1 — — 3

„ plumage-, extra fin 1,20 — 3

„ ny Italiensk jätte- 1,40 — 3

„ Myatt's new garnishing 1,40 — 3

Behandling och användande allmänt bekant.

Pimpinella, (*Poterium Sanguisorba*) 1,60 — 4

Planteras i rader och är ej kinkig med jordmån; de unga bladen begagnas bland sallad.

Fr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Rosmarin, (*Rosmarinus officinalis*) — — — 15
Odlas i krukor.

Salvia, (*Salvia officinalis*) 5
Bladen användas såväl till medicin som till matkryddning. Fröet säs på kalljord; fordrar på våra orter skydd mot sträng barfrost.

Spansk Peppar, (*Capsicum annum*)
" blandade sorter — 10
" Uppräges i krukor under glas. Om hösten mogna frukterna, hvars användande i hushållet är tillräckligt känt.

Senap, (*Sinapis*)
" gul Engelsk (*Sinapis alba*) 40 — 3
" brun Engelsk (*Sinapis nigra*) 80 — 3

Thimjan, (*Thymis vulgaris*)
" sommar- 6 — 8
" vinter- 3 — 5
" Passar förträffligt till garnering af köksväxt-
" kvarter.

Viuruta, (*Ruta graveolens*) 3
Fröet säs i bänk och sedan planteras plantorna i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses vara magstärkande och ätas sönderhackade på smörgås, eller läggas de som krydda på säser. De blifva mera aromatiska om de odlas på mager och torr jord.

IX. Lökväxter:

Rödlök, (*Allium Cepa*)
" Holländsk, stor, mörkröd 4,60 — 7
" " stor ljusröd 4 — 6
" " svafvelgul 4,40 — 7
" " fin, hvit, sylt- 8 — 10
" Braunschweiger, stor, mörkröd 5 — 7
" Madera- eller jätte-, stor 6,60 — 9
" lång, gul, päronformig, utmärkt 4 — 6
" Fordra god, fjolåret gödslad jord och öppet, varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och efter sådden tillklappas sängen väl. De sorter man önskar små, t. ex. den hvita syltlöken, säs tätt, hvaremot de storväxta sorterna säs gle-sare. Maderalöken säs helst i bänk och utplanteras sedan, hvarvid rötterna men ej bladen, något förkortas.

Vinterlök, (*Allium fistulosum*)
" vanlig, hög 7
" tidig, låg 10
" fin, hvit 10
Fröet utsås om våren på fritt land och de små lökorne quarstå ute öfver vintern. Våren derpå kunna de planteras i rader eller som infattningsväxter. Bladen nyttjas tidigt om våren som surrogat för annan lök. Borde användas mera än som sker.

Schallott- eller Eschallottlök, (*Allium Ascalonicum*)
" vanlig Svensk 1 — — —
" stor Dansk, pr 100 st. 1,75 — — —
" " Rysk, pr 100 st. 1,75 — — —
" Denna lökart, som för sin mildare smak af många föredrages framför alla andra löksorter, fortplanteras genom smålökar, hvilka om våren utplanteras i god, fet, men ej nygödd jord. Upp-tagas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.

Hvitlök, (*Allium sativum*) 1 — — —
" Trifves hvar som helst, men blifver bäst i en varm, sandblandad jordnån. Bildar sällan frö, men fortplanteras lätt genom smålökar. Omplanteras hvartannat år.

Fr *tl.* Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Rokamboll, (*Allium Scorodoprasum*) pr 100 st. 1 rdr — — — — —
Behandlas och användes som hvitlök.

Gräslök, (*Allium Schoenoprasum*) — — — — —
pr torfva 25 öre.

Potatislök, (*Allium Ascalonicum variegatum*) 1,25 — — —
Behandlas och användes som Schalottlök.

Purjolök, (*Allium porrum*)
" vanlig vinter- 4,80 — 7
" " sommar- 3 — 5
" Brabanter-, vinter- 5 — 7
" jätte- eller monströs vinter- 8 — 10
" gul sommar- från Poitou — 30
" Säs om våren i halfvarm bänk och utplanteras sedan, (något djupare än de uppkomna plantorna stått i bänken) i rader, 8 å 10 tum ifrån hvarandra, hvarvid både rötter och blad något förkortas. Fordrar nygödslad jord.

X. Gurkartade växter:

Gurkor, (*Cucumis sativus*)

A. För fritt land:
" Holländska, gröna druf- (s. k. Westerågurkor) 3 — 5
" allmänna, långa gröna 8 — 10
" långa, gröna slang-, å p. 10 ö. 8 — 10
" " hvita slang-, å p. 10 öre. 10 — 12
" Chin-, gröna slang-, å p. 10 ö. — 20
" " bleka slang-, å p. 10 öre. — 20
" Ryska, små gröna 4 — 6
" Grekiska-, Atheners-, utmärkta — 20

B. För drifning: Pr Ort. Port.
" non plus ultra, gröna 50 — 15
" " hvita 75 — 15
" Dessa gurkor blifva öfver i alm långa.
" snöhvita Jätte-, extra 1,75 — 15
" hvita, Alabaster, Egyptiska 1,50 — 15
" Rhum von Quedlinburg 2,50 — 25
" Snöhvita, 24 å 30 tum lång
" Rhum von Erfurt 2,50 — 25
" Frukterna 2 fot långa, snöhvita.
" Silley's, hvita 1,50 — 15
" Arnstädter, ljusgröna, jätte- 1,50 — 15
" " släta, gröna 1 — 15
" Brasilianska, hvitgröna långa, tidiga, utmärkta — 75 — 15
" aldra tidiga, rikt bärande 1 — 15
" Cuthill's blaespine 1 — 15
" Emper of Manchester 1 — 15
" Gladiator 75 — 15
" Glory of London, utmärkta 75 — 15
" Man of Kent 75 — 15
" Patrik 1 — 15
" Race Horce 75 — 15

En ständigt bärande sort; kan med fördel kultiveras i kraka.
" Snow's Horticultural 1 — 15
" Walker's Travello 75 — 15
" Victory of Bath 75 — 15
" semperfructifera, ständ. bärande 1 — 15
" Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraftig, men framför allt lucker jordmån. Obrunnen gödsel bör ej nyttjas emedan frukterna deraf få en bitter smak.

så sönderbrytas dessa i 2 å 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar thallus förgrena sig, då det hela täckes med 2 å 3 tum lös och lätt jord, som helt sakta nedplockas hvarefter locken ej mera påläggas. Efter 4 å 5 veckor fram-

komma champignonor fortfarande under omkring 3 månader. När de skördas, utstickas de tomligen djupt. Om jorden torkar så öfversprutas den något. Temperaturen hålles beständigt mellan + 15 å 18°. Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

B. Frö till Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter:

Till Hrr Landbrukares synnerliga uppmärksamhet!

Priserna å alla Ekonomi-frö äro ej fullt bestämda, men noteras efter dagens pris här på platsen. De säljas blott pr kontant, utan rabatt.

Från och med 25 *tl.* säljes efter 100 *tl.*-priset.

Pr 100 *tl.* Pr *tl.*
Rmt Rd ö. Rd ö.

Pr 100 *tl.* Pr *tl.*
Rmt Rd ö. Rd ö.

I. Gräsväxter:

Agrostis alba, (*Hvitlven*) . . . 50 — — 55
" *capillaris*, (*Hörhven*) . . . 60 — — 65
" *stolonifera*, (*Kryphven* eller *Fioringräs*) . . . 60 — — 65

Hvensorterna växa nästan hvar som helst, men blifva yfvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blifva de småväxta och tufviga. Särdeles omtyckta fodergräs och af erkändt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Aira canescens, (*Gråtåtel*) . . . 70 — — 75
" *caespitosa*, (*Tuftåtel*) . . . 30 — — 35
" *flexuosa*, (*Kruståtel*) . . . 30 — — 35

Tuftåteln är att rekommendera endast för fuktig mark, hvaremot krus- och gråtåteln passa för torra lägen, den sistnämnda till och med för torr sandjord, hvarest den lemnar ett godt färbete.

Alopecurus pratensis, (*Angkaffe*) . . . 90 — — 95
Värderas såsom fodergräs af många lika mycket, om ej mera, än thimothéj. Blifver kraftigast i god, multrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Anthoxanthum odoratum, (*Vårbrådd*) . . . 1 — — 1
Ett tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förenig med andra sorter. Ingår i blandningen för finare gräsplaner.

Arundo arenaria (*Sandrör*) . . . 1,20
Användes till att binda flygsand.

Avena elatior, (*Knölhafre*) . . . 60 — — 65
" *flavescens*, (*Gulhafre*) . . . 25 — — 30
" *pubescens*, (*Luddhafre*) . . . 1 — — 1
Knölhafren är ett af de bästa fodergräs, synnerligen på mergelhaltig, lerblandad, ej alltför fuktig sandjord. Gulhafren lämpar sig för hvarje jordmän, som ej är alltför torr; kan ingå i blandningar till större gräsplaner. Luddhafren trives i torr jordmän och är ett ganska godt fodergräs.

Briza media, (*Darrgräs*) . . . 6 — — 6
På torra ångar, är detta gräs ofta öfvervrigande, men trifes äfven på lagom fuktig mark.

Bromus mollis, (*Mjulkosta*) . . . 35 — — 40
" *pratensis*, (*Anglosta*) . . . 55 — — 60
Mjulkostan trives både i torr och fuktig jord och är ett mycket beaktansvärdt fodergräs. Anglosta växer helst på något fuktig lerbottnen.

Ceratochloa australis, (*Bromus Schraderii*) . . . 1 — — 1

På någorlunda god jord är denna utländska gräsart ett af de aibrästa till foder.

Cynosurus cristatus, (*Kamexing*) — — 1,25
Bildar om det ofta afmejas täta och vackra torfvor, hvarför det bör ingå i hvarje blandning till trädgårdplaner. Trifves äfven på torr mark.

Dactylis glomerata, (*Hundexing*) 75 — — 80
Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mera att rekommendera, som det trifves på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.

Elymus arenarius, (*Strandhafre*) — — 1,50
En af de bästa växter för bindande af flygsand. Ätes af kreaturen endast i ungt tillstånd.

Festuca arundinacea, (*F. elatior*) . . . 1,40

(*Säfsvingel*) . . . 30 — — 35
" *duriuscula*, (*Hårdsvingel*) . . . 30 — — 35
" *elatior*, (*pratensis*) (*Angsvingel*) 85 — — 90
" *fluitans*, (*Glyceria*;) (*Mannagräs*) 90 — — 95
" *ovina*, (*Flysvingel*) . . . 30 — — 35
" *rubra*, (*Rödsvingel*) . . . 40 — — 45

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård-, fär- och rödsvingel lemnar på torr och mager jord, der knappt något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Angsvingeln är ett af de bästa gräs för ångar och dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar. Sätsvingeln trives på steril och grusig mark, men lemnar på bättre jord ett godt foder. Mannagräsfröet begagnas som sagogrön och trives på våta, öfversvämmade ställen.

Holcus lanatus, (*Luddåtel*) . . . 30 — — 35
Trifves i mager sandjord, men lemnar rikare afkastning i någorlunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräsen.

Lolium perenne, (*Eng. Raygräs*) 35 — — 40

" *perenne tenue*, (*Pacey's Raygr.*) 50 — — 55

" *italicum*, (*Italienskt Raygr.*) 45 — — 50
I fröblandningen till gräsplaner i trädgårdar utgör som bekant raygräs oftast hufvudbeständsdelen. Ingen annan grässlott är så bladrik eller växer så hastigt som raygräset, hvarföre det i utlandet odlas i betydlig mängd och afmejas 3, 4, t. o. m. 5 gånger årligen. Är ej synnerligt noga på jordmän, blott den ej är för våt.

Melica (*Molinia*) *coerulea*, (*Perlgr.*) 30 — — 35
Fodergräs för mossbottnen och fuktig sand; blandas med andra grässlagen.

Pr 100 Hl. Pr Hl.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Milium effusum, (Anur-; Luktgr.) — 1,50
Ett 3 å 4 fot högt, bredbladt, vålluktande gräs, som kan odlas öfverallt, der tätta trädkronor beskygga marken o. hindra andra gräsarter att växa.

Phalaris (Baldingera) arundinacea
(Rörflen) 1,70

canariensis, (Kanariefrö) 35 — 40
Rörflen är ett flera fot högt, styft och bredbladt gräs, som trives på sumpig och kärraktigt mark; bör före blomningen afnjemas och uppfodras. Kanariefröet nyttjas till föda åt småfoglar.

Phleum pratense, (Thimothejgr.)
Thimothejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven, i förening med andra sorter, till gräsplaner i större trädgårdar, men bör då ej tillsättas blandningen utan sås särskildt.

Poa annua (Hvitgröe) 1,25

aquatica, (Glyceria spectabilis)
(Jättegröe eller Vattengröe) 1 —

nemoralis, (Lundgröe) 1 —

pratensis, (Slotte-; Ångsgröe) 1 —

serotina, (P. fertilis) (Höstgröe) 1,75

trivialis (Betesgröe) 1 —

Alla gräsarterna räknas till de bättre gräsena; ängs- eller slottergröe t. o. m. till de bästa. De äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och ingå i myckenhet uti blandningarne. Lundgröe är mycket användbar på trädbevuxna skuggiga platser. Jätte- eller vattengröe växer i sött vatten och måste afnjemas före blomningen. Hvitgröe lemnar ett utmärkt färbete.

Blandning af de nyttigaste och bästa fodergräs, för besäning af ångar, med såväl torr, som våt jordmån, 1ma kvalitét 45 — 50

äfven för ofvannämnde ändamål af 2:da kvalitét 40 — 45

af finare gräsarter, för besäning af gräsplaner i trädgårdar och parker, passande för hvarje ej alltför dålig jord 55 — 60

af finaste grässorter, för besäning af smärre planer, med fin, god jordmån. 80

II. Klöfverväxter:

Klöfver, Holl., röd, 1ma, (Trifolium pratensis)

Schlesisk, röd, 1ma

hvit, 1ma, (Trif. repens.)

Alsike; Svensk, (Tr. hybrid.)
Alsikeklöfvern fördrages mångenstädes i utlandet för dess högre fodervärde och dess förmåga att äfven på ganska dålig jord, der man af den vanliga klöfvern ej har mycket att vänta, gifva god skörd. Trives väl tillsammans med thimothej.

Inkarnatklöfver, (Tr. incarnata) 55 — 60
En ettårig art, hvaraf utsås ungefär 24 å 26 Hl. på tunnlandet. Utrikes begagnas den mycket tillsammans med Italiensk raygräs och lemnar då både tidiga och rika grässkördar. Den användes äfven till igensänning af under vintern uppkomna luckor å de andra klöfverfälten.

Skogsklöfver, (Tr. medium) — 1,75
Af synnerligt värde för skogstrakter; är ej noga med jordmån och lemnar rik afkastning.

Rätklor, (Anthyllis vulneraria) 1,80
Bland de växter som på senare tiden blifvit användta till foder, intager Anthyllis ett utmärkt

Pr 100 Hl. Pr Hl.
Rmt Rd ö. Rd ö.

rum. Den håller tillgodo med den magraste jord och motstår den starkaste torka. På torr och mager mark utsås den jemte färsvingel och gifver ett godt, rikligt arbete.

Blå-Luzern, (Medicago sativa) 1,50

Sand-Luzern, (Medicago media) 2 —

Humleklöfver, (Medic. lupulina) 30 — 35
Blåluzern har långa, starka, krypande rötter och anses för en god foderväxt. På sandjord gifver sandluzern årligen en, stundom två rätt goda skördar och på något bättre jord öfverträffar den blåluzern. Humleluzern emotstår torka, lemnar godt färbete och användes i trädgårdar att besä torra sluttningar o. s. v.

Bokharaklöfver, (Melilotus abus altissimus) 1,50

Honungsklöfver, (Melilotus officinalis eller Melilotus macrorhiza) 2,50

blå, (Melilotus coerulesus) 3,50

Bokharaklöfver kan på nägorunda god jord sköras gröna 3, 4 å 5 gånger under sommaren och hösten. Den bör ej få växa mera än 1 fot högt, emedan den eljest blifver grof och träaktig. Honungsklöfvern är något mindre, men väl förtjent att uppmärksammas; dess blommor äro mycket eftersökta af bien. Den blå användes vid beredningen af den s. k. aptitosten.

Esparsette, Onobrychis eller Hedy-sarum sativum) 30 — 35

Växer egentligen på kalkmark och är på sådan, af t. o. m. tarrigt beskaffenhet, en god foderväxt.

Gigelsårter eller Kåringtänder, (Lotus corniculatus) 1,50

I förening med andra klöfverväxter lemnar denna ett godt foder för mjölkkor.

Grekiskt Hå, (Trigonella foenum graecum) 40

Bör ej sås tjockt.

III. Diverse foderväxter:

Foderrofvor eller Turnips.

White globe (Hvita, runda) 60 — 65

Pomeranian white globe (Pomerska, hvita, runda) 55 — 60

White Norfolk, hvita 55 — 60

Autumn stubble (Höst-stubb.) 70 — 75

Red globe, (Röda; runda) 60 — 65

Wolton's hybrid, röda, runda. 60 — 65

Skirwing's förbättr., rödtoppiga 75 — 80

Purple top yellow Bullock. (Gula, rödtoppiga) 70 — 75

Border imperial, gula, rödtopp. 75 — 80

Tweddalle's förbättrade, rödtoppiga, gula 75 — 80

Green top yellow Bullock. (Gula, gröntoppiga) 60 — 65

Aberdeen green top yellow, gula, gröntoppiga 70 — 75

Hoods imperial, gula, gröntopp. — 95

Dales hybrid, grøngula 70 — 75

Red top white tankard. (Långa, hvita, rödtoppiga) 75 — 80

Green top yellow tankard. (Långa, gula, gröntoppiga) 85 — 90

Bottfelder, långa, gula 75 — 80

Höst-, långa, hvita 75 — 80

Aker-, långa, rödtoppiga 75 — 80

Pr 100 *fl.* Pr *fl.*
Rmt Rd ö. Rd ö.

Fröet till ofvannämnda rofsorter införskrives från Skottland, hvarst odlingen af foderrofvor bedrivnes i stor skala. Dess värde som foderväxter är så allmänt bekant, att det är onödigt att här yttra något vidare derom. Se även ann. under Rotväxter bland köksväxterna.

Kålrotter, Rotabagga eller Svensk Turnips.

- ” Purple top yellow swedish. (Gula, rödtoppiga) 70 — — 75
- ” Skirwing's förb., rödtoppiga 70 — — 75
- ” Laing's förb., röda, gröntoppiga 85 — — 90
- ” Green top yellow. (Gula, gröntoppiga) 80 — — 85
- ” Nya, rödgråtopp., släta, jätte- 95 — 1 —

Dessa sorter sås 3 å 4 veckor tidigare än rofvorna. Planter, uppdragna i kallbänk eller på passande ställe å kalljord, begagnas till efterplantering å de ställen i turnipsfälten, hvarst luckor uppstått genom loppmaskens härjningar eller af andra orsaker. Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita turnipsroterna, hvarst efter tages de röd- och gröntoppiga samt till sist rotabagga. Derföre är det angeläget att odla flera sorter, så att man ej nödgas att för hastigt uppodra förrådet.

Fodermorötter,

- ” Altringham, stora, Engelska . 95 — 1 —
- ” Belgiska, hvita, gröntopp., jätte- 75 — — 80
- ” orangegula, gröntoppiga, jätte- 135 — 1,40
- ” mörkröda, Braunschweiger . . 95 — 1 —

Dessa morötters värde såsom foderväxter är allmänt erkändt. Synnerligen äro de hvita jättemorötterna utmärkta för dess rika afkastning. Alla morotsorter fördrå en djupt arbetad jord och måste i motsats mot turnipsen, utsås så tidigt som möjligt.

Foderpalsternackor,

- ” långa, stora, tjocka 60
- ” runda, stora 1 —

Såväl rötternas som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt foder för mjölkkor. Utsås omkring 16 *fl.* på tunnlandet och behandlas för öfrigt som morötter.

Foderbeter eller Runkelrofvor,

- ” långa, röda 50 — — 55
- ” ” gula 50 — — 55
- ” runda, röda 50 — — 55
- ” ” gula 55 — — 60
- ” Dippe's, röda Reisen-Pfal- . 55 — — 60
- ” gula Reisen-Pfal- 55 — — 60

Begagnas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej deraf får den sträfva smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användes. De sistnämnda båda sorterna lemna den rikaste afkastningen.

Sockerbeter,

- ” äkta, hvita vanliga 45 — — 50
 - ” hvita, imperial- 55 — — 60
 - ” Villmorin's, nya förbättrade . 75 — — 80
- Böra ej sås för sent; ej heller i nygödslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lernylla. För närvarande anses Villmorins vara de bästa.

Foderkål,

- ” Jätte- 5 —
 - ” äkta träd- eller ko-, (*Jerseykale*) — 4 —
 - ” Tusenhöfdad, Grekisk centner- — 2,80
- Alla sorterna förträffliga till kreatursfoder.

Pr 100 *fl.* Pr *fl.*
Rmt Rd ö. Rd ö.

Seradella, (*Ornithopus sativus*) . 30 — — 35
Anses som foderväxt lika god som rödklöfver. Gifver stor afkastning, äfven på lätt jord. På mycket torr sandmark och tung lerjord trives den mindre väl. Utsås omkring 30 å 35 *fl.* på tunnlandet.

Spergel, (*Spergula*.)

- ” vanlig, (*Sperg. arvensis sativa*) 20 — — 25
 - ” stor, (*Sperg. arvensis maxima*) 30 — — 35
- Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sandmark till färbete. Den kan utsås, 10 å 12 *fl.* på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra gräsfoderväxter.

Majs, (*Zea*.)

- ” stor hästtand- 50
 - ” Amerikansk 50
 - ” gul 40
 - ” röd 60
- Alla sorterna till grönfoder.

Sockerhirs, (*Sorghum sacharatum*.)

- ” Italiensk 65 — — 70

Italiensk Kolfhirs, (*Panicum*

italicum) 45 — — 50

Sockerhirsens likasom majs, fördrå någorlunda fuktig jordmån och mot storm skyddade lägen. På torra och blåsigta platser misslyckas alltid dessa växter. Den italienska kolfhirsens är på varm jord en utmärkt foderväxt.

Groblad, (*Plantago lanceolata*) . — — — 50

Lemnar i hvilken jordmån som helst ett godt färbete.

IV. Diverse Ekonomiväxter:

Pr *fl.* Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Bohve, (*Polygonum Fagopyrum*.)

- ” vanlig 25 — —
- ” Skottisk silfvergrå 40 — —

Den skottiska, silfvergrå bohveten växer ytterst kraftigt och användes derföre mängstenades som foderväxt. Motstår sträng torka och bär rikligare frö, än den vanliga.

Canariefrö, se rubr. Gräsväxter — — —

Cichoria, se rubriken Sallad & Rotväxter — — —

Hampa, (*Cannabis sativa*.)

- ” vanlig 40 — — 3
- ” Chinesisk jätte-, (*Cannabis sativa var. gigantea*) 4
- ” Piemontesisk jätte-, (*C. sat. var.*) — — — 20

Kummin, se rubr. Kryddväxter — — —

Lin, (*Linum usitatissimum*.)

- ” vanligt Svenskt 50 — —
- ” Riga-, pr tunna — rdr — — —

Lupiner, (*Lupinus*.)

- ” hvita, (*Lupinus albus*) 40 — —
 - ” blå, (*Lupinus angustifolius*) 25 — 3
 - ” gula, (*Lupinus luteus*) 30 — 3
- Lupinernas värde i landtbruket har under de senaste åren blifvit allmänt erkändt.

Senap, (*Sinapis*.)

- ” Engelsk, gul (*Sinapis alba*) 40 — 3
- ” brun (*Sinapis nigra*) 80 — 3

Solros, (*Helianthus annuus*.)

- ” vanlig 5

	Pr H.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Solros, ny, ovanligt stort frö (H annuus macrospermus præcox) — — — 10		
Fröet af solrosen gifver en utmärkt god matolja.		
Tobak. (<i>Nicotiana Tabacum</i> .)		
” äkta Cuba-	6 —	8
” stor Havana	6 —	8
” ” Portorico	6 —	8
” ” Turkisk	6 —	8
” Amersforter	—	8
” storbladig, jätte-, (<i>Nicotiana macrophylla gigantea</i>) — — — 20		
Tobaken fordrar lätt, sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppriskas med gammal gödsel.		
Wallmo, (<i>Papaver somniferum</i> .)		

	Pr H.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Wallmo, hvitblommande med blätt frö och tillslutna fröhus	— 30	— 3
” rödblommande med hvitt frö och tillslutna fröhus	— 40	— 3
” Jätte-, med hvitt frö, (<i>Papaver sommiferum giganteum</i>)	1,50	— 4
” Opie-, (<i>Pap. somn. opiferum</i>)	3	— 6
Wallmo odlas på många ställen utrikes i stor skala för vinnande af olja, hvilken påstås vara fullt ut så god som den bästa italienska olivolja.		
Äpple, (<i>Pyrus Malus</i>)	4	— 6
Päron, (<i>Pyrus communis</i>)	10	— 12
Plommon, (<i>Prunus domestica</i>)	2	— 4
Körsbär, (<i>Prunus Cerasus</i>)	2	— 4

C. Frö till Blomster- och Bladoväxter.

För att lätta mödan för resp. requirenter, hafva vi anordnat blomsterfröförteckningen, med undantag af "Modeblommor" i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvars ordningsföljd finnes angifven i katalogens innehållsförteckning och öfverst på hvarje sida.

Vid requisitioner är det tillräckligt att angifva numren å de frösorter, som önskas. Om requisition uppgöres efter annan, än den för året gällande katalogen, så torde detta benäget omnämnas. Portionerna äro tillräckligt stora för vanligt behof; hafva sådana säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljes äfven efter vigt; dock ej mindre än helt ort.

I. Modeblommor eller Sortimentblommor:

Aster:

(*Callistephus chinensis*; *Callistemma hortensis*. Aster chinensis.)

(Asterioidea.)

Fröet utsås i April på en ljum (icke varm) drifbänk och betäckes föga hwarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tum afstånd ifrån hvarandra. I slutet af Maj utplanteras de på kall jord i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligen uppblandad jord. Alla Astersorterna bilda stora rotklimpar, hvarföre man lätt kan upptaga och flytta dem, äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttningen iakttaga att dertill välja en mulen dag, eller hålla plantorna besknigade tills några dagar efter omsättningen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar.

I följande färger:

å p. 5 öre, pr ort 40 öre.

1. hvit.
2. silfverhvit.
3. gulaktigt hvit.
4. hvit med rödt.
5. carmosinröd.
6. mörk carmosinröd.
7. mörk carmosinröd m. hvitt.
8. rosenfärgad.

9. lilafärgad.
10. violett.
11. violett med hvitt.
12. himmelsblå med hvitt.
13. mörkblå.
14. persikoblomfärgad.
- Alla 14 sorterna 60 öre.
- 6 sorter 25 öre.
15. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 30 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig från blomornas runda form.

I följande färger:

- å p. 8 öre, pr ort 50 öre.
16. hvit.
17. carmosin.
18. mörk carmosinröd.
19. ljus carmin.
20. carmosin med hvitt.
21. ljusröd.
22. rosa med hvitt.
23. mörkrosa med hvita strim.
24. köttfärgad.
25. mörkblå.
26. mörkblå med hvitt.
27. ljusviolett.
28. mörkviolett.
29. mörkviolett med hvitt.
30. mörklila.
31. äppleblomfärgad.

Alla 16 sorterna rdr 1,10

12 sorter — 85

6 — 45

32. blandade färger, å p. 5 öre, pr ort 40 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga blommor.

I följande färger:

- å p. 8 öre, pr ort 80 öre.
33. rent hvit.
34. blek svafvelgul.
35. carmosin.
36. mörk carmosin.
37. lysande carmosin med hvitt.
38. carmin.
39. mörkröd med hvitt.
40. mörk rosa med hvitt.
41. ljus azurblå.
42. svartblå.
43. mörk lila med hvitt.
44. violett.
45. persikoblomfärgad.
46. äppleblomfärgad.
- Alla 14 sorterna rdr 1 —
- 6 sorter — 45
47. blandade färger, å p. 8 öre, pr ort 70 öre.

Fransysk Pion-Aster.

Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora, väl fyllda blommor af oklanderlig form samt förmåga att

146. rosenröd.
147. ljusblå.
148. mörkblå.

Alla 4 sorterna 40 öre.

149. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Hög, storblommig

Chrysanthemum-Aster.

Har stora vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa aster-sorterna.

I följande färger:

- å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.

150. hvit.
151. hvit med rosa.
152. carmosin med hvitt.
153. rosa.
154. körsbärsröd.
155. hortensiaröd.
156. mörkröd.
157. lila rosa med hvitt.
158. lila med hvitt.
159. köttfärgad.
160. ljusblå.
161. indigoblå.

Alla 12 sorterna rdr 1,30

6 sorter " — 65

162. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Låg, storblommig

Chrysanthemum-Aster.

Blommor rikt; lika utmärkt som föregående, men ligre.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort 3 rdr.

163. rent hvit.
164. hvit med mörkblått.
165. carmin.
166. carmin med hvitt.
167. rosa.
168. rosa med hvitt.
169. mörkrosa med hvitt.
170. ljusblå.
171. ljusblå med hvitt.
172. mörkblå med hvitt.

Alla 10 sorterna rdr 1,85

173. blandade färger, å p. 20 ö.
pr ort rdr 2,75.

Truffaut's imbrikerade

Pompon-Aster.

En mycket prydlig, rikt blommande sort med klotformiga blmr.

I följande färger:

- å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.
174. rent hvit.
175. hvit med carmin.
176. hvit med mörkblått.
177. carmin.
178. carmin med hvitt.
179. rosa.
180. mörk rosenröd med hvitt.
181. ljusblå med hvitt.
182. violett med hvitt.
183. brunviolett med hvitt.

Alla 10 sorterna rdr 1,15.

184. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Vilmorins' Chinesiska

Original-Aster.

Intressant sort, hvars blommor, ehuru ej af särdeles vackert form, utmärka sig genom sin utomordentliga storlek.

185. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort rdr 1,25.

Då urvalet helt och hållet anförtros åt oss, lemnas:

150 sorter Aster, rdr 14 —

100 " " " 10 —

50 vackra sorter " 5,50

25 " " " 3 —

Löfkajor:

(*Cheiranthus annuus; Matthiola annua, Sommar-Löfkaja. — Cheir.; Math. annua var. autumnalis, Höst-Löfkaja. — Cheiranth.; Math. incana, Vinter-Löfkaja.*)

(Cruciferes.)

Löfkajorna tillhöra kålväxternas familj (crucifera) och den enkla formen växer allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oafbrutet kunna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utså fröet på olika tider eller ock, hvilket är beqvämare och säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. De engelska sommarlöfkajorna blomna tidigast; dernäst de tidiga höstlöfkajorna och sist kejsarlöfkajor, med hvars öfvervintrade exemplar man följande våren gör början. Fröet sås i ljum (ej varm) drifbänk och betäckes föga. Så snart hjertbladen äro utbildade böra plantorna omskolas, med 3 tumms mellanrum mellan hvarandra, uti väl sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft och vatten då det behöves. För att så mycket som möjligt hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tät, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmnen eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj utplanteras löfkajorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes vid nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfk. utplanteras på sängar, inslås om hösten i krukor, öfvervinttras i en sval och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöfk. kunna äfven användas som vinterlöfk. och äro ofast tacksammare, alltid vackrare än de sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkaja.

Bästa qualité frö, efter i krukor odlade exemplar.

I följande färger:

- å p. 15 ö., pr ort rdr 2,50.

186. hvit.
187. carmosin.
188. mörk carmosinröd.
189. carminröd.
190. mörk carminröd.
191. rosa med gult sken.
192. ljusröd.
193. blodröd, (victoriaröd.)
194. köttfärgad, storblommig.
195. ljusbrun.
196. mörkbrun.
197. chamois.
198. mörklila.
199. azurblå.
200. ljusblå med gult sken.
201. mörkblå.
202. ljusviolett.
203. mörkviolett.
204. ljus mordorée.
205. persikoblomfärgad

Alla 20 sorterna rdr 2,75

12 sorter " 1,70

206. blandade färger 1 ma.

å p. 15 ö., pr ort rdr 2,25.

207. blandade färger, 2 da.
å p. 8 ö., pr ort 85 öre.

Engelsk,

Bukett-Sommar-Löfkaja.

Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig bukett.

I följande färger:

- å p. 25 ö., pr ort rdr 3,75.
208. carmosinröd.
209. rosenröd.
210. ljusblå.
211. mörkviolett.
Alla 4 sorterna 85 öre.
212. blandade färger, å p. 20 ö.
pr ort 3 rdr.

Engelsk,

Lackbladig Sommar-Löfkaja.

Varietetera af denna afdelning hafva slåta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredrages af många blomsterodlare.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.
213. hvit.
214. mörk carmosin.
215. carmin.
216. köttfärgad.
217. svartbrun.
218. svafvelgul.
219. mörk lila.
220. ljusblå.
221. mörkblå.
222. violett.
223. mörkviolett.
224. persikoblomfärgad.
Alla 12 sorterna rdr 2,25
6 sorter " 1,15
225. blandade färger å p. 15 ö.
pr ort rdr 2,50.

Engelsk,**Storblommig Sommar-Löfkoja.**

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort 3 rdr.
 226. hvit.
 227. carmosin.
 228. mörk carmosin.
 229. carmin.
 230. carminrosa.
 231. högröd.
 232. mörk blod-, victoriaröd.
 233. aurorafärgad.
 234. rosa.
 235. köttfärgad.
 236. kanariegul.
 237. svafvelgul.
 238. chamois.
 239. ljusblå.
 240. mörkblå.

Alla 15 sorterna rdr 2,75

6 sorter " 1,10

241. blandade färger, å p. 20 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Engelsk, Pyramidformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Hälles af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor länge med stora blmr; växtsättet pyramidformigt.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort rdr 3,25.
 242. rent hvit.
 243. hvit med svag rosa.
 244. hvit med lackblad.
 245. carminröd.
 246. mörkrosa.
 247. rödbrun.
 248. chamois.
 249. canariegul med lackblad.
 250. ljusblå.
 251. mörkblå.
 252. brillant lila.

Alla 11 sorterna rdr 1,85

6 sorter " 1—

253. blandade färger, å p. 20 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Engelsk, Ständigt blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort hafva förmåga att, sedan de förvissnade blommorna blifvit afskumna ånyo frambringa blombarande skott.

I följande färger:

- å port. 20 ö., pr ort 3 rdr.
 254. hvit.
 255. carmosin.
 256. köttfärgad.
 257. rödbrun.
 258. rödgrå.
 259. mörkblå.
 260. mörkviolett.

Alla 7 sorterna rdr 1,20.

261. blandade färger, å p. 20 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Dverg-Pyramid-Sommar-Löfkoja.

En ungefär 6 å 8 tum hög, storblommig, mycket praktfull sort.

I följande färger:

- å p. 25 ö., pr ort rdr 4,25.
 262. carmosin.
 263. rosenröd, briljant.
 264. ljusblå.
 265. mörkblå.
 266. äppleblomfärgad.

Alla 5 sorterna rdr 1,10.

267. blandade färger, å p. 20 ö.
 pr ort rdr 3,50.

Bastard-Sommar-Löfkoja.

Denna sort bildar en öfvergång från de lackbladiga till de vanliga.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.
 268. hvit med rosa.
 269. hvit med azurblått.
 270. carminröd.
 271. rosa.
 272. lila.
 273. kanariegul.
 274. azurbåll med gult öga.

Alla 7 sorterna rdr 1,25.

275. blandade färger, å p. 15 ö.
 pr ort rdr 2,50.

Trädlik Jätte-Sommar-Löfkoja.

Växten trädlik, blommorna stora och praktfulla; en i alla hänsenden utmärkt sort.

I följande färger:

- å p. 25 ö., pr ort rdr 3,75.
 276. hvit.
 277. carmosin.
 278. rosa.
 279. citrongul.
 280. ljusblå.
 281. mörkblå.

Alla 6 sorterna rdr 1,35.

282. blandade färger, å p. 20 ö.
 pr ort rdr 3,25.

Engelsk, tidigt blommande Höst-Löfkoja.

Om fröet utsås i April, samtidigt med sommarlöfkojorna, och i öfrigt behandlas som dessa, så blomma de i Augusti, eller just lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis visnande sommarlöfkojorna.

I följande färger:

- å p. 30 ö., pr ort 5 rdr.
 283. hvit.
 284. carmosin.
 285. carmosin med lackblad.
 286. carminröd.
 287. mörkblå med lackblad.
 288. brunviolett med lackblad.
 Alla 6 sorterna rdr 1,60.
 289. blandade färger, å p. 25 ö.
 pr ort ror 4,25.

Engelsk Bastard-Höst-Löfkoja.

Något senare än föregående.

I följande färger:

- å p. 30 ö., pr ort 5 rdr.
 290. hvit med lackblad.
 291. carmosinröd.
 292. carminröd.
 293. rosenröd.
 294. kastanjbrun.
 295. ljusblå.
 296. mörkblå.

Alla 7 sorterna rdr 1,90.

297. blandade färger, å p. 25 ö.
 pr ort rdr 4,75.

Perpetuell eller Kejsar-Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommor något senare än de båda förutnämnda arterna, mot slutet af Augusti och i September. De kunna senare på hösten upptagas, inplanteras i krukor och öfvervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följande vår af dem erhåller en tidig, rik och vacker florerung.

I följande färger:

- å p. 25 ö., pr ort rdr 4,75.
 298. ljus carmosinröd.
 299. carminröd.
 300. ljus purpur.
 301. rosenröd.
 302. eldröd med lackblad.
 303. köttfärgad.
 304. kopparrosa, skön.
 305. svafvelgul med lackblad.
 306. blå.
 307. violett.

Alla 10 sorterna rdr 2,25.

308. blandade färger, å p. 25 ö.
 pr ort rdr 4,25.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt.

I följande färger:

- å p. 30 ö., pr ort 5 rdr.
 309. rent hvit.
 310. carmosinröd.
 311. carminrosa.
 312. rosa.
 313. ljusröd.
 314. köttfärgad.
 315. ljusblå.
 316. mörkviolett.
 317. persikoblomfärgad.
 Alla 9 sorterna rdr 2,50.
 318. blandade färger, å p. 25 ö.
 pr ort rdr 4,25.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sort frö, samladt af i krukorna odlade exemplar.

I följande färger:

- å p. 20 ö., pr ort rdr 3,25.
 319. hvit.
 320. mörk carmosinröd.

321. carminröd.
 322. carminröd, låg, trädartad.
 323. rosenröd.
 324. högröd.
 325. eldröd.
 326. svafvelgul.
 327. ljusblå.
 328. mörkblå.

Alla 10 sorterna rdr 1,75.

329. blandade färger, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja.

Trädartad med yfviga kronor och stora blomklasar.

I följande färger:

- à p. 25 ö., pr ort rdr 3,75.

331. hvit med lackblad.

332. carmosinröd.

333. carmin.

334. kungsblå.

Alla 5 sorterna rdr 1,10.

335. blandade färger, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 3,25.

Dverg-Vinter-Löfkoja.

Utmärkt för sin låga, men kraftiga, vackra växt.

I följande färger:

- à p. 25 ö., pr ort rdr 3,75.

336. högröd.

337. rosenröd.

338. mörkblå.

Alla 3 sorterna 70 öre.

339. blandade färger, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 3,25.

Lackbladig Vinter-Löfkoja.

Har stora blommor i rena, klara färger och vackert gröna, gyllenlacklika blad.

I följande färger:

- à p. 25 ö., pr ort rdr 3,75.

340. hvit.

341. carmosin.

342. rosa.

343. blekröd.

344. svafvelgul.

345. mörkblå.

346. violett.

Alla 7 sorterna rdr 1,50.

347. blandade färger, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 3,25.

Dverg-Bukett-Vinter-Löfkoja.

Lägväxt med stora klasar af väl fyllda blommor.

348. blandade färger, à p. 20 ö.

Om urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

125 sorter Löfkoja, rdr	22	—
100 " " "	19	—
50 " " "	9	50
25 vackra sorter	5	—

Gyllenlack; Lackvioler.

(*Cheiranthus Cheiri.*)

(Cruciferæ.)

Gyllenlacken tillhör samma familj som löfkojan och växer i södra Europa temmeligen allmänt vild på gamla murar o. dyl. Fröet säas i kall drifbänk, (ej djupt) och plantorna utsätts sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 1 à 1½ fots afstånd från hvarandra. Vid torr väderlek vattnas de tillräckligt. Mot hösten upptagas de starkaste plantorna och sätts i passande krukor uti god, kraftig drifbänkbjord, blandad med hornspån. Öfvervintras som vinterlöfkoja.

Stång-Gyllen-Lack,

i följande färger:

- à p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.

349. kanariegul, dubbel.

350. mörkbrun, dubbel.

351. blå, dubbel.

Alla 3 sorterna 60 öre.

352. blandade färger, à p. 15 ö.
 pr ort rdr 2,25.

Busk-Gyllenlack,

i följande färger:

- à p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.

353. gul, dubbel.

354. brun, dubbel.

355. brun, enkel.

Alla 3 sorterna 60 öre.

356. blandade färger, à p. 15 ö.
 pr ort rdr 2,25.

Dverg-Gyllenlack,

i följande färger:

- à p. 20 öre, pr ort 3 rdr.

357. brun, extra, dubbel.

358. mörkbrun, enkel, storbl.

359. bronsfärgad.

360. blå, extra.

Alla 4 sorterna 70 öre.

361. blandade färger, à p. 20 ö.
 pr ort rdr 2,75.

Balsaminer.

(*Ipateus Balsamina* eller *Balsamina hortensis.*)
 (Balsaminæ.)

Fröet utsås antingen i krukor eller och fritt i en varm drifbänk. När hjertbladen utbildat sig, omskolas plantorna i annat fönster på 5 à 6 tum afstånd från hvarandra och obetydligt djupare än de stått förnt. Der få de unga plantorna qvarstå så länge utrymmet tillåter, hvarest de upptagas med vidhängande rotklump och planteras i passande krukor i fet, half-mulnad gödseljord. Då planrötterna uppfylla krukorna gifves gödselvatten 2 à 3 gånger i veckan. Exemplaren bära ej utflyttas på fritt land förr än de börjat blomma.

Rosen-Balsamin.

Har hög, trädlik, men föga greniväxt samt stora, tätt sittande, starkt fyllda blommor.

I följande färger:

- à p. 12 ö., pr ort 2 rdr.

362. rent hvit.

363. hvit med rosa.

364. purpuröd.

365. granatröd.

366. rosenfärgad.

367. ljusgul.

368. chamois.

369. mörkblå.

370. lila.

371. äppleblomfärgad.

Alla 10 sorterna 1 rdr.

372. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,50.

Cameille-Balsamin.

(*Andrieux förbättrad.*)

Denna sort blifver ej så hög; har tätt sittande, starkt fyllda, merändels fläckiga blommor.

I följande färger:

- à p. 12 öre, pr ort 2 rdr.

373. carmin med hvitt.

374. carmosinrosa.

375. rosa med hvitt.

376. skarlakan.

377. lila med hvitt.

378. violett.

Alla 6 sorterna 65 öre.

379. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,50.

Dverg-Balsamin.

Betyddigt lägre än förestående sorter; men eljest lik dessa.

I följande färger:

- à p. 12 öre, pr ort 2 rdr.

380. hvit med skarlakan.

381. purpur.

382. granatröd.

383. tegelröd med hvitt.

384. köttfärgad med hvitt.

385. trefärgad.

Alla 6 sorterna 65 öre.

386. blandade färger, à p. 10 ö.
 pr ort rdr 1,50.

387. Solferino-Balsamin, med lila-, carmosin- och skarlakanröda strimmor: utmärkt nyhet, à port. 25 ö.

388. Atrosanguinea plenisima, blodröd, mycket storblommig, dubbel; praktfull nyhet, à port. 25 ö.

Flambloster.

(*Phlox Drummondii.*)

(Polemoniceæ.)

Är en af de vackraste sommarblommor för såväl fritt land, som för krukor. Fröet säas i drifbänk och hålles jemt fuktigt. Mot slutet af Maj planteras de i krukor eller på kall jord. Om man utsår frö i Juli och öfvervintrar plantorna vid

+ 4 à 6° Cels., så erhålles kraftiga exemplar, som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

- å p. 12 ö., pr ort rdr 1,75.
 389. hvit.
 390. purpuröd.
 391. rosenröd.
 392. eldröd.
 393. marmorata rosea.
 394. marmorata violacea.
 395. Prinz Leopold, högröd med vit stjerna.
 396. Prinz Royal, lila med hvita strimmor.
 397. Radowitzii, röd, strimmig.
 398. Wilhelm I, mörkröd.
 399. chamois rosa.
 400. rosea alba oculata.
 401. skifferblå varieteter.
 402. violetta varieteter, med vit stjerna i midten.
 403. Isabellina, gulaktig.
Alla 15 sorterna rdr 1,65
10 sorter " 1,10
 404. blandade färger, å p. 10 ö.
 pr ort 1 rdr.
 405. Phl. Dr. Heinrichii, ny praktfull varietet med intensivt skarlakaröda blommor; särdeles utmärkt till grupper, å port 35 öre.

St Jacobsblomster.*(Senecio elegans.)**(Senecionidæ.)*

Utsås och behandlas som flambloster; kan äfven förökas genom steklingar; utmärkt gruppväxt.

Hög St Jacobsblomster,*i följande färger och sorter:*

- å p. 8 ö., pr ort 80 öre.
 406. alba plena, hvit.
 407. atrocinereo pl., mörkbrun.
 408. atropurpurea plena, mörkpurpurfärgad.
 409. lilacina plena, lilafärgad.
 410. rosea plena, rosenröd.
 411. rubra plena, röd.
 412. purpurea pl., purp., extra.
Alla 7 sorterna 45 öre.
 413. blandade färger, å p. 6 ö.
 pr ort 70 öre.

Låg St Jacobsblomster.*(Senecio elegans nana.)**I följande färger och sorter:*

- å port. 10 öre, pr ort 1 rdr.
 414. alba plena, hvit.
 415. atrocinereo pl., mörkbrun.
 416. coerulea plena, blå.
 417. cupreata pl., kopparfärgad.
 418. rubra plena, röd.
 419. purpurea, purpuröd.
Alla 6 sorterna 50 öre.
 420. blandade färger, å p. 10 ö.
 pr ort 1 rdr.

Lejongap.*(Antirrhinum majus.)**(Personatæ.)*

Fröet utsås om våren och hålles jemt fuktigt. Så tidigt som möjligt upplanterar man plantorna på deras platser å kall jord. En del planterar man äfven i krukor och öfvervintrar dem på frosfritt ställe, då de följande vår blomma tidigt och vackert.

Höga Lejongap,*i följande färger och sorter:*

- å port. 5 ö., pr ort 40 ö.
 421. alba, hvit.
 422. Brillant, trefärgad.
 423. Crescia, mörk skarlak.
 424. Delila, carmin med gult.
 425. Firefly, skarlak med gult och hvitt.
 426. Galathée.
 427. Ghestia, blodröd.
 428. Henry IV, cinnoberröd.
 429. nigrescens, mörk purpur, utmärkt.
 430. Papilionaceum, purpur m. hvitt.
 431. striatum, strimmig.
Alla 11 sorterna 50 öre.
 432. blandade färger, å p. 5 ö.
 pr ort 25 öre.

Låga Lejongap.*(Antirrhinum majus nanum.)**I följande färger och sorter:*

- å port. 5 öre, pr ort 50 ö.
 433. alba, hvit.
 434. aureum striatum, gul med hvitt.
 435. Aurora, aurorafärgad.
 436. Brillant, trefärgad.
 437. Crescia, mörk skarlak.
 438. Delila, carmin med gult och hvitt.
 439. Firefly, orange-skarlak med gult och hvitt.
 440. Galathée, carmosin med hvitt.
 441. Henry IV, cinnob. m. gult.
 442. kermesina splendens carmosin.
 443. luteum, ljusgul, utmärkt.
 444. Papilionaceum, purpur m. hvitt.
Alla 12 sorterna 50 öre.
 445. blandade färger, å p. 5 ö.
 pr ort 40 öre.

Dvergartade Lejongap.*(Antirrh. majus nanissimum.)**I följande färger och sorter:*

- å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.
 446. album, hvit.
 447. album rubrum striatum, hvit med röda strimmor.
 448. Brillant, trefärgad.

449. Cinnabarium.
 450. Delila, carmin med gult.
 451. Firefly, orange-skarlak med gult och hvitt.
 452. Henry IV, cinnober med gult.
 453. luteum rubrum, striatum, gul med röda strimmor.
 454. sulphureum, lysande gul.
Alla 9 sorterna 80 öre.
 455. blandade färger, å p. 10 ö.
 pr ort 1 rdr.

Neglikor.*(Dianthus Caryophyllus.)**(Caryophyllæ.)*

Neglikorna äro bland våra äldsta och bäst omtyckta trädgårdsblommor. Fröet säas antingen fritt i en ljum driftbänk eller i flata s. k. fröfat. När plantorna blifvit ett par tom höga, planteras de på för dem iordninggjorda sängar i fet, men ej nygödslad jord. Om vintern är täckning endast nödvändig, när starkt eller ihållande barfrost är rådande. Under blomningstiden bör man skydda neglikorna mot starkt skyn och häftiga regnskurar. De vackraste sorterna odlar man gerna i kruka. De trifvas väl i god grästorfsjord, sådana som hemtats från någon äng, der talrika kreatur betat. Denna jord blandas med gammal kogödseljord och sand. Krukorna böra ej vara för stora, 5 å 6 tumms vidd anses tillräcklig, helst nya och väl dränerade. Öfvervintras i en frostfri lokal, så torrt, kallt och luftigt, som möjligt.

I följande sorter:

456. utmärkta sorter, 1 ma.
 å p. 12 ö., pr ort rdr 1,50.
 457. mångfärgade, dnubbl., 2:a.
 å p. 10 ö., pr ort 75 öre.
 458. enfärgade, dubbl. tid. blom.
 å p. 10 ö., pr ort 75 öre.
 459. remonterande, 30k., 50 ö.
 " 2:da, å port. 20 öre.
 461. Chor-Negl. Bizard i många färger, å p. 50 öre.
 462. " Picott, flammig, med hvit botten, å p. 30 ö.
 463. " Picott, flammig, med gul botten, å p. 30 ö.
 464. " 1 ma, å 12 korn 20 ö.
 465. " 2:da, å 10 korn 15 ö.
 466. Dverg-Negl., å port. 12 ö.
 pr ort rdr 1,75.
6 sköna sorter rdr 1,80.

Kinesiska Neglikor.*(Dianthus chinensis.)**(Caryophyllæ.)*

Fröet utsås i Mars och plantorna omskolas och vårdas under glas tills de i början af Juli kunna utflyttas på kall jord. Till de exemplar, som man ämnar öfvervintra säas fröet i Juli eller Aug. Plantorna ställas under vintern i ett kallt växthus, nära glaset och vatt-

ställen der växterna skola blomma, men man kan äfven göra sådden på våren. De förstnämnda sorterna blifva 2½ å 3 fot höga, de sistnämnda 1 å 1½ fot. Fordra god, väl arbetad jord.

Lökjolk Riddarsporre.*(Delphinium Consolida.)**I följande färger:*

å p. 5 öre, pr ort 40 öre.

534. snöhvít.

535. högrosa.

536. mörkrosa.

537. köttfärgad.

538. mörkblå.

539. ljusblå.

540. ljuslila.

541. brokig.

Alla 8 sorterna 35 öre.

542. blandade färger, å p. 5 ö.

pr ort 20 öre.

Ranunkellik Riddarsporre.*(Delph. Ajacis ranunculiflorus.)*

Vaekra och starkt fyllda, ranunkellik blommor.

543. blandade färger, å p. 5 ö.

pr ort 40 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre.*(D. Ajac. var. hyacinthiflorum.)**I följande färger:*

å p. 5 öre, pr ort 20 öre.

544. hvít.

545. tegelröd.

546. köttfärgad.

547. chamois.

548. ljusblå.

549. mörkblå.

550. ljusviolett.

551. vallmogrå.

552. rödaktig lila.

553. äppleblomfärgad.

Alla 10 sorterna 45 öre.

554. blandade färger, å p. 5 ö.

pr ort 15 öre.

Blomman för dagen.*(Ipomea purpurea eller Pharbitis**hispida.)***(Convolvulaceæ.)**

Slingväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kall jord. Utmärkt användbar till beklädnad af mindre éspalier, pelare, korgar, höga tårnrosor, o. s. v.

I följande färger:

å p. 5 öre, pr ort 20 öre.

555. hvít.

556. hvít, blårandig.

557. hvít, violettstrimmig.

558. ljust rosenröd.

559. ljust inknatröd.

560. praktfull, mörkröd.

561. mörkblå.

562. lilafärgad.

563. spec. fr. Indien.

Alla 9 sorterna 40 öre.

564. blandade färger, å p. 5 ö.

pr ort 15 öre.

De öfriga Ipomeasorterna ännas upptagne bland slingerväxter.

Sammetsblomster.*(Tagetes.)***(Senecionideæ.)**

Utsås och behandlas som aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infattningar.

I följande sorter:

å p. 5 öre, pr ort 20 öre.

565. erecta aurantiaca, orange.

566. „ sulphurea, svafvelgul.

567. „ plenissima, mycket

dubbel, blekgul.

568. „ nana, lågväxt.

569. lucida, glänsande (egentligen flerårig.)

570. patula, utbredd.

571. „ nana, låg.

572. „ pulchra, gul m. brunt.

573. „ pumila, lågväxt.

574. „ ranunculoides, ranunkellik, mycket dubbel.

575. signata, finbladig.

576. „ pumila, dvergartad.

å port. 10 öre.

Alla 12 sorterna 50 öre.

577. blandade, å port. 5 öre.

pr ort 20 öre.

Stockrosor.*(Altea rosea)***(Malvaceæ.)**

I sitt numera betydligt förbättrade tillstånd håra dessa stäfliga blommor till trädgårdens vackraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsås tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolas på en gång i god jord. Om hösten upptagas de och antingen insås i sand i en tom drifbänkklåda, eller planteras i små krukor och öfvervintras frostfritt. Följande vär utplanteras de på för dem bestämda, djupt grädda och gödslade ställen på fritt land, hvarst de blomma, till dess de förstöras af stark frost.

I följande färger:

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,25.

578. hvít med ceriseröd.

579. hvít med violett.

580. gulaktigt hvít.

581. hvít med lila.

582. purpur.

583. mörkpurpur.

584. skarlakan.

585. ljus carmin.

586. mörk carmin.

587. rosa.

588. mörk rosa.

589. ljusröd

590. violettröd.

591. köttfärgad.

592. äppleblomfärgad.

593. svafvelgul.

594. blek svafvelgul.

595. mörkgul.

596. guldmalva.

597. chamois.

598. mörk chamois.

599. chamoisrosa.

600. carmosinviolett.

601. persikoblomfärgad.

Alla 24 sorterna rdr 2,20**12 sorter 1,10**

602. blandade färger, 1 ma,

å p. 10 öre, pr ort 1 rdr.

603. blandade färger, 2 da,

å p. 5 öre, pr ort 50 öre.

Stjfmorsblomster.*(Viola tricolor.)***(Violaceæ.)**

De nu, under namn af Viola tricolor maxima eller V. tric. varietatis hortensis, så allmänt omtyckta, storbloomiga formerna af stjfmorsblomma eller pensén, hafva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjfmorsblomma (Viola tricolor) och altaviolett (Viola altaica). De utmärka sig genom sina stora, skönt formade och kolorerade blommor, men urarta lätt om exemplaren blifva gamla, eller få för länge kvarstå på samma ställe. Det är därför bäst att hvarje år utså frö till nya plantor, eller uppdraga sådana genom stiecklingar. Fröet säs helst 2 gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång på våren. De som blifvit sådda året förut blomma alltid tidigare och rikare än de man sätt på våren. De fordra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorter forplantas säkrast genom stiecklingar.

I följande färger och sorter:

å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.

604. hvít.

605. hvítkantad, fantasipensé,

blombladen omgifna af

hvita kanter.

606. carmosin- och purpur-

marmorerad.

607. brunröd, extra.

608. aurikelfärgad.

609. nigra, svart.

610. gul.

611. guldkantad.

612. ljusblå.

613. flammig.

å p. 20 ö., pr ort rdr 2,75.

614. Baron de Rothschild.

615. Odiars eller femfläckig,

utmärkt vacker.

616. pelargonieflorea.

617. *coronata*, utmärkt, har en mörk fläck på hvarje blomblad.
Alla 14 sorterna rdr 1,65.
618. blandade färger, 1ma, å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.
619. blandade färger, 2da, å p. 5 ö., pr ort 50 öre.

Ärtblomster.

(*Lathyrus odoratus.*)
(*Leguminosæ.*)

Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utmärkt vackra och vällyktande. Växten, som blifver 6 å 8 fot hög, kan begagnas till beklädnad af väggar, plank, éspalier, flätverk, o. s. v. Fröet utsås på kalljord.

I följande färger:

- å p. 5 öre, pr ort 10 öre.
620. hvit.
621. svart purpur.
622. svart purpur m. ljusblått.
623. mörkröd.
624. röd, hvitstrimmig.
625. rödspräcklig.
626. svartbrun, flammig.
627. Kapten Clarke, hvitstrim.
628. Kronprinsessa af Preussen, köttfärgad.
629. invicible searlet.
Alla 10 sorterna 40 öre.
630. blandade, å port. 5 öre.
pr ort 8 öre.

Öfriga sorter *Lathyrus* återfinnas bland slingerväxterna.

Trumpetblomster.

(*Salpiglossis variabilis*; *Salpigl. sinuata* eller *Salp. straminea.*)

(*Solanaceæ.*)

En med *petunia* nära befrydd, 2 å 4 fot hög växt. Fröet utsås tidigt om våren i krukor men får ej betäckas med jord, utan blott jemnt nedtryckas, hvarefter krukorna täckas med glasskifvor och ställas i bänk. När plantorna uppstått erfordrerlig utveckling, omskolas de och utplanteras i början af Juni på grupper.

I följande sorter:

- å p. 8 ö., pr ort 85 öre.
631. alba lutea, hvit med gult.
632. azurea grandiflora, blå.
633. coccinea, skarlakun.
634. sulphurea, svafvelgul.
635. nana, lågväxt.
636. „ atrovioleacea, mörkviol.
637. „ azurea aurea venosa.
638. „ coccinea, skarlakun.
639. „ sulphurea, svafvelgul.
Alla 9 sorterna 65 öre.
640. höga sorter, blandade, å p. 5 ö., pr ort 75 öre.
641. låga sorter, blandade, å p. 5 ö., pr ort 75 öre.

642. var. *grandiflora*.
å p. 10 ö., pr ort rdr 1,25.

Tuppkam.

(*Celosia cristata.*)
(*Amarantaceæ.*)

För att erhålla exemplar med stora och välbildade kammar, omskolas man plantorna, nyss efter det de uppkommit, i ett varmt drifbänknöster i kraftig dyngjord. Sedan kammarna börjat bildas sig upp tagas plantorna med klipp och inplanteras i passande krukor, ställas åter i varm drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med stark gödselvattnen.

I följande färger och sorter:

- å p. 10 ö., pr ort rdr 1,50.
643. hvit.
644. carmosin.
645. ljus carmin.
646. mörkpurpur.
647. mörkröd.
648. mörkrosa.
649. eldröd.
650. einnorröd.
651. amaranthröd.
652. röd med chamois.
653. blek svafvelgul.
654. chamois.
655. ljus orange.
656. guldfärgad.
657. macrocephala gigantea.
658. pyramidalis aurea.
659. „ coccinea.

Alla 17 sorterna rdr 1,60

12 sorter 1,10

660. blandade färger, å p. 10 ö.
pr ort 1 rdr.
661. låga, blandade, å p. 10 ö.
pr ort 1 rdr.

Underblomster.

(*Mirabilis jalappa.*)

(*Nyctagineæ.*)

Praktfull, 2 å 3 fot hög växt, som blommar till sent på hösten. Fröet säs om våren och plantorna sättas i 3 å 4 tums krukor, som ställas i ljum drifbänk samt vattnas och luftas ordentligt. Utplanteras i Juli på fritt land i god, lös och närande jordmån.

I följande färger:

- å p. 5 öre, pr ort 15 öre.
662. hvit.
663. hvit med gult.
664. carmosin med hvitt.
665. carminröd.
666. rosa.
667. rosa med gult.
668. högröd.
669. rent gul.
670. gul med rödt.
671. chamois.
672. lila.
Alla 11 sorterna 45 öre.
673. blandade färger, å p. 5 ö.
pr ort 12 öre.

Wallmo.

(*Papaver somniferum.*)
(*Papaveraceæ.*)

Alla de anförda vallmosorterna utm. sig för stora väl fyllda blommor i lysande färger. Fröet säs höst eller vår i fet, lös jord.

I följande färger:

- å port. 5 öre, pr ort 15 öre.
674. hvit.
675. hvit med purpur.
676. purpur på svart.
677. incarnatröd med violett.
678. askgrå.
679. askgrå med rödt.
680. vallmogrå.
681. svartbrun med einnober.
682. nästan svart.
683. ljusblå med einnober.
684. mörklila.
685. morderée på askgrått.
Alla 12 sorterna 50 öre.
686. blandade färger, å p. 5 ö.
pr ort 10 öre.

Pionlik Wallmo.

(*Pap. somnij. var. pæoniflorum.*)

I följande färger:

- å p. 5 öre, pr ort 15 öre.
687. hvit.
688. hvit med rosa sken.
689. purpur.
690. präktig skarlakun.
691. skarlakun med hvitt.
692. ljusrosa.
693. högrosa.
694. einnober på violett.
695. mörk morderée.
Alla 9 sorterna 35 öre.
696. blandade färger, å p. 5 ö.
pr ort 10 öre.
697. nanum, å port. 10 öre.

Fjäderlik Wallmo.

(*P. somn. laciniatum Murselli.*)

I följande sorter:

- å port. 5 öre, pr ort 15 öre.
698. fl. pl., dubbel, utmärkt.
699. lilacina, lila med rödt.
700. splendens, rosa m. hvitt.

Ranunkel-Wallmo.

(*Papaver Rhœas.*)
(*Papaveraceæ.*)

701. blandade färger, å p. 5 ö.
pr ort 15 öre.

Zinnia.

(*Zinnia elegans.*)
(*Senecionidæ.*)

Zinniaarterna hafva lysande blommor och äro särdeles användbara till grupper. Fröet utsås någorlunda tidigt i bänk och plantorna böra ej utplanteras förr än väderleken hunnit blifva någorlunda sommarlik. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.

I följande färger och sorter:

- å p. 5 ö., pr ort 40 öre.
 702. alba, hvit.
 703. atroviolacea, mörkviolett.
 704. aurea, guldfärgad.
 705. coccinea, skarlakan.
 706. purpurea, purpur.
 707. sulphurea, svafvelgul.
 Alla 6 sorterna 25 öre.
 708. blandade färger, å p. 5 ö.
 pr ort 25 öre.

Dubbel Zinnia.

(*Zinnia elegans fl. pleno.*)

I följande färger;

- å port. 10 öre, pr ort 1 rdr.
 709. alba, hvit.
 710. atrococcinea, mörk skarlakanröd.
 711. atropurpurea, mörk purp.
 712. aurantiaca, orangerröd.
 713. carnea, ljusröd.
 714. coccinea, skarlakan.
 715. kermesina, carmosin.
 716. lilacina, gredelin.
 717. lutea, gul.
 718. purpurea, purpurfärgad.
 719. violacea, violett.
 Alla 11 sorterna 1 rdr.
 720. blandade färger, å p. 8 ö.
 pr ort 80 öre.



Zinnia elegans flore pleno.

II. Frö till Dekorativa Bladväxter,

till större eller mindre grupper på fritt land:

- | | å Port. | Ort. | | å Port. | Ort. |
|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | Rmt Rd ö. | Rd ö. | | Rmt Rd ö. | Rd ö. |
| Acanthus; Björnklo, (Acanthaceæ.) | | | Arum, (Aroidæ.) | | |
| 721. „ latifolius, bredbladig | 8 | — 40 | 473. „ corsicum | 15 | 2 — |
| 722. „ longifolius, långbladig | 15 | — | Stättig växt med stora, callalika blad; se | | |
| 723. „ mollis, mjukbladig | 5 | — 30 | afbildningen på omslaget framsida. | | |
| Praktfulla, omkring 1 fot höga växter med | | | Atriplex; Mell eller Molla, (Atripliceæ.) | | |
| antika bladformer. Öfvervintas frostfritt. | | | 734. „ hortensis | 5 | — 5 |
| Amaranthus; Råfsvans, (Amarantaceæ.) | | | En 6 å 8 fot hög växt med mörkröda blad, | | |
| 724. „ bicolor fol. purpureis | 12 | — | som fortplantar sig genom sjelfsådd. | | |
| 725. „ melancholicus | 5 | — 30 | Balsamita; Irymynta, (Corymbifereæ.) | | |
| 726. „ tricolor | 8 | — 40 | 735. „ grandiflora, storblommig | 10 | — |
| De tvenne förstn. äro utmärkta för sina röda | | | Storbladig, 6 fot hög växt med gula, ko- | | |
| blad och särdeles användbara till bladväxt- | | | kardlika blommor; tål vintern ute. | | |
| och blomstergrupper. Den sista har trefä- | | | Bambusa; Bamburör. (Gramineæ.) | | |
| rgade blad. Alla äro ettåriga, omkring 1 å | | | 736. „ Metake | 30 | — |
| 1½ fot höga; fordra lös, närande jordmån | | | Vacker, 3 å 5 fot hög gräsväxt; öfvervintas | | |
| och varma ställen. Fröet utsås i driftbänk. | | | vid + 5° C. | | |
| Aralia; Aralia, (Araliaceæ.) | | | Barbarea, (Crucifereæ.) | | |
| 727. „ japonica | 50 | — | 737. „ vulgaris fol. var. | 5 | — 30 |
| 728. „ racemosa | 30 | — | En tvåårig växt, som första året den utsås | | |
| 729. „ spinosa | 40 | — | på kalljord är rätt vacker till infattningar. | | |
| Alla tre utmärkta bladväxter, som under | | | Blommor och sätter frö andra året, men blir | | |
| betäckning uthärda vintern på kalljord. | | | då oduglig som infattningsväxt, och bör | | |
| Artemisia; Gräbo; Malört, (Eupatorineæ.) | | | derför sås hvarje år. | | |
| 730. „ annua, ettårig | 8 | — 40 | | | |
| 731. „ argentea, silfverbladig | 35 | — | | | |
| 732. „ gracilis (sp. St. Petersburg) | | | | | |
| ettårig, vacker | 8 | — 60 | | | |

- å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
- Beta**; *Beta* eller *Mangold*, (*Atriplicææ*.)
738. " vulgaris var. brasiliensis. — 5 — 5
Behandlas som vanliga rödbeter. Bladstjekarne variera i flera färger. Kan om hösten inpl. i krukor och användas till dekorationer i boningsrum och kalla växthus.
- Bocconia**; *Bocconia*. (*Papaveraceæ*.)
739. " cordata — 15 — —
740. " frutescens — 15 — —
741. " japonica — 15 — —
Alla tre utmärkte växter med prydliga, ehuru små blommor; öfvervintras frostfritt.
- Boehmeria**; *Bömeria*, (*Urticaceæ*.)
742. " macrophylla — 12 — —
Vacker bladväxt, öfverv. vid + 12 à 15° C.
- Bonapartia**; *Bonapartia*, (*Asphodoleæ*.)
743. " juncea (Agave geminiflora) — 30 — —
Stätlig dekorationsväxt med långa, smala blad.
- Brassica**; *Kål*, (*Cruciferæ*.)
744. " oleracea variegata, bland — 8 — 25
Palmträd-, jätte- och fjäderkål, användas till prydnadsv. för sina vackra brokiga blad.
- Callisææ**, (*Umbelliferæ*.)
745. " dahurica — 20 — —
Flerårig frilandsväxt, som då den planteras i kraftig jord uppnår jättelika dimensioner. Användes som prydnad för gräsmattor.
- Canna**; *Blomsterrör*, (*Cannaceæ*.)
746. " Anneti, m. skinande blad — 10 — 40
747. " superba — 12 — 70
Bladen liffigt gröna; blommorna ljusst skarlakaröda, med gula punkter och streck.
748. " Bonetii major — 10 — 50
Mycket hög; bladen blågröna, med blåaktig metallglans.
749. " Bonetii semperflorens — 12 — 70
Bladen mörkgröna, med stark metallglans.
750. " coccinea vera — 10 — 40
751. " compacta elegantissima — 12 — 60
752. " discolor floribunda — 20 — 1 —
Bladen bruna; blmrna skarlakaröda, vackra.
753. " discolor violacea — 10 — 50
754. " elegantissima rustica — 10 — 50
Bladen gröna, med fina, mörkbruna kanter.
755. " floribunda — 8 — 30
756. " heliconiæfolia — 20 — —
757. " Hostei — 12 — 80
En af de vackraste arter af detta rika slägte.
758. " musæfolia hybrida — 10 — 40
759. " nepalense — 8 — 30
760. " " grandiflora — 12 — 70
761. " patens — 5 — 30
762. " purpurea hybrida — 10 — 50
763. " " spectabilis — 10 — 50
764. " Sellowii — 8 — 30
Mycket blomsterrik; blommorna skarlakaröda.
765. " speciosa — 8 — 30
766. " spectabilis — 5 — 20
767. " Warzewiczii — 8 — 30
768. " " rosea, vacker — 10 — 40

- å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
769. *Canna Warzewiczoides nobilis* — 20 — —
Breda, brunaktiga blad.
770. " *Warzewiczoides nova* — 20 — —
Bladen stora, vackra med bruna ådror.
771. " *Zebrina elegantissima* — 10 — 50
Ny, vacker, strimmig o. fläckig.
25 sorter rdr 2,60
12 vackra sorter " 1 —
772. " alla sorter blandade — 10 — 50
Cannaarterna höra till de vackraste och tack-sammaste bladväxter vi ega och utmärka sig dessutom äfven för rätt vackra blommor. De äro mycket lättsköta och kunna öfvervintras vid + 10 à 12° C.
- Cannabis**; *Hampa*, (*Urticaceæ*.)
773. " sativus var. gigantea — 5 — 8
Ettårig, 6 à 8 fot hög, vacker bladväxt.
- Centaurea**; *Klint*, (*Compositæ-Cynareæ*.)
774. " candidissima — 40 — —
775. " gymnocarpa — 25 — —
Båda arterna hafva rent silfverhvita, vackert formade blad. Att på en fin gräsmatta hafva små, runda sångar, planterade med endast dessa växter, är utmärkt vackert.
- Cerastium**; *Cerast*, (*Alsineæ*.)
776. " Biebersteinii — 20 — —
777. " tomentosum — 20 — 2,50
Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter, till bildande af girlanger, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute.



Eucalyptus globulus.

å Fort. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Chamaepse; (Cichoraceæ.)

778. „ *Cassebona* — 10 — 80
779. „ *diacantha* — 40 —

Tvenne tistelartade växter, hvars blad äro ställda rosettlit och prydda med systematiskt sittande, hvitaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och utpl. om våren i god jord.

Chenopodium; Gåsfot, (Atriplicæ.)

780. „ *atrilpilis* — 5 — 30
Ettårig, 1½ fot hög, rödbladig växt. Utsås i bänk och utplanteras sedan.

Cineraria; Askört. (Senecionideæ.)

781. „ *candidissima* — 25 — —
782. „ *maritima* (Senecio *Cineraria*) — 8 — 50
Båda utm. för vackert formade gråhvita blad; särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintars i temperer. hus.

Entelea; Entelea, (Tiliaceæ.)

783. „ *arborescens*, trädartad — 30 — —
Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfvervintars i temp. hus; fortpl. genom sticklingar.

Erianthus; Ullgräs, (Gramineæ.)

784. „ *Ravennæ* — 10 1 —
Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydl. blomvippor. Betäckt. und. sträng köld.

Eucalyptus; Praktmössa, (Myrtaceæ.)

785. „ *gigantea* — 20 — —
786. „ *globulus* — 20 — —
787. „ *robusta* — 20 — —

Eucalyptusarterna blifva i sitt hemland, Australien, ofta öfver 400 fot höga och räknas därför till verdens största träd. Öfvann. arter, synnerligen E. glob. kunna med fördel användas i stora bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bakgrunden eller midten, allteftersom gruppen är belägen. Öfvervintars i tempererad växthus. Tåla ej att beskåras. Se afbildningen.

Ferdinandia; (Senecionideæ.)

788. „ *eminens* (Cosmophyllum *caeliefolium*) — 30 — —
Uppnår betydlig höjd; bladen stora, ljusgröna, väluktande. Öfverv. i temp. växthus.

Foucroya; (Asphodelæ.)

789. „ *rigida* — 10 1 —
Präktig dekorationsväxt med långa, tjocka, agavelika blad. Öfverv. vid vanlig boningsv.

Gunnera, (Urticaceæ.)

790. „ *scabra* — 30 — —
Stätlig dekorationsväxt med stora, antikt formade blad. Planteras bäst i korgar hvilka om sommaren nedsänkas i lös, fet jord och om hösten åter utpattas för att frostfritt förvaras.

Gynneriam; Pampasgräs eller Prairiegräs, (Gramineæ.)

791. „ *argenteum* — 15 — —
792. „ „ *fol. var.* — 25 — —
793. „ „ *kermesinum* — 30 — —
794. „ „ *violaceum* — 15 — —

Obestridligt de stätligaste och vackraste af alla bekanta grässlager. De tre sistnämnda äro nya, ytterst praktfulla. Kunna behandlas som *Gunnera*.

Helianthus; Solros, (Senecionideæ.)

795. „ *argyrophyllus*, silfverbladig — 8 — 50
796. „ *macrophyllus* *gigant.*, stor — 8 — 50
Ettåriga växter. Den sistnämnda är 10 å 15 fot hög och har ofantligt stora blommor. Fröet sås direkte på fritt land.

å Fort. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Heracleum; Björnsfoka eller Heredesört, (Umbelliferæ.)

797. „ *eminens* — 5 — 30
798. „ *giganteum* — 5 — 20

Jättelika växter med ofantligt stora, antika blad och väldiga, hvita blomlockar. Blifva ofta 10 å 12 fot höga. Fröet ligger ofta ett år i jorden innan det groor.

Holcus; Hirs, (Gramineæ.)

799. „ *saccharatus; Sockerhirs* — 5 — —
5 å 6 fot hög. Vacker i bladgrupper. Behandlas som majs; se vidare ekonomiväxter.

Inula; Alandsrot, (Asteroideæ.)

800. „ *Helenum*, äkta — 10 — —
Flerårig, 6 å 8 fot hög växt med stora ljusgröna blad och gula blommor.

Knautia, (Dipsacæ.)

801. „ *montana* — 25 — —
Flerårig, 10 å 12 fot hög växt med gula skabiosalika blommor. Vacker såsom middelväxt i bladgrupper.

Lavatera; Poppelros, (Malvaceæ.)

802. „ *arboorea*, trädartad — 10 — —
6 å 12 fot hög växt med talrika röda blommor; öfvervintars frostfritt.

Melianthus; Honungsblomster, (Rutaceæ.)

803. „ *major*, stor — 30 — —
804. „ *minor*, mindre — 15 — —
Vackra bladväxter, som under sommaren kunna utpl. i det fria; öfverv. vid + 6 å 8° C. Fordra kraftig jord och riklig vattn.

Nicotiana; Tobak, (Solanaceæ.)

805. „ *glauca* — 8 — 50
806. „ *glautinosa* — 8 — 60
807. „ *macrophylla* *var. gigantea* — 5 — 20
808. „ *sanguinea* — 5 — 30
809. „ *Tabacum* *var. Salonichii* — 5 — 8
810. „ „ *purpurea grandiflora* — 5 — 30

Alla 6 sorterna 30 öre.

Alla sorterna äro ettåriga och taga sig väl ut bland bladgrupper; synnerligen utm. äro *macroph.* och *purp. grandifl.* Fröet utsås i bänk och plantorna utsätts sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmån. Se vidare ekonomiväxter.

Onopordon; Ulltistel, (Cynareæ.)

811. „ *aculea* — 15 — —
812. „ *arabicum* — 8 — 70
813. „ *virens* *var. tauricum* — 5 — 20
Höga, tistellika växter, som äro väl passande att planteras ensamt, eller några tillsammans, på fina gräsmattor. Alla äro 2-åriga och utthåda vintern.

Perilla; Perilla, (Labiatae.)

814. „ *arguta* (*nankinensis*) — 5 — 35
Ettårig, 1½ fot hög växt, med bruna, metallglänsande blad. Fröet sås i drifbänk.

Rheum; Rhabarber, (Polygoneæ.)

815. „ *Emodi* (*australe*) — 5 — 8
816. „ *crassinerivium* — 8 — 40
817. „ *hybridum* — 10 — —
818. „ *oleraceum* — 10 — —
819. „ *undulatum* — 5 — 8
820. „ „ *Queen Victoria* — 5 — 10

Alla 6 sorterna 40 öre.

Alla särdeles vackra, isynnerhet som fristående eller gruppvis förenade på vackra gräsmattor. Se sparrisväxter.

	<i>à Port.</i>	<i>Ort.</i>
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Ricinus; Underträd, (Euphorbiaceæ.)		
821.	" africanus	10 — 20
822.	" bourboniensis arboreus	15 — 40
823.	" communis	5 — 10
824.	" minor	5 — 10
825.	" purpureus, major	10 — 20
826.	" minor	10 — 20
827.	" roseus, rosenröd	20 — 50
828.	" sanguineus	10 — 20
829.	" minor	20 — 50
830.	" tricolor	10 — 20
831.	" sp. fr. Philippinerna	12 — 30
Alla 11 sorterna rdr 1,20.		
Alla arterna äro ettåriga och blifva 5 å 6 fot höga. Böra utsås i Mars eller början af April. Odlas i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de smäningsom vänjas vid den yttre luften. Utpl. i Juni på varma ställen i fet jord. Höra till de tacksammaste och ståtligaste bladväxterna för fritt land.		
Rumex; Syra, (Polygonææ.)		
832.	" vesicarius	8 — 70
Ettårig, vacker dekorationsväxt; fröet säs i bänk eller kruka.		
Salvia; Salvia, (Labiataeæ.)		
833.	" argentea (S. ætiopis atlantica; candidissima)	10 1 —
Vacker; har stora hvita blad; öfverv. frostrf.		
Selinum, (Umbelliferae.)		
834.	" decipiens (Melanoselinum) — 30 — —	
En präktig, palmlik växt. Öfvervintras vid + 5° C. Fröet grov stundom först ett år efter säningen.		
Silphium, (Senecionideæ.)		
835.	" perfoliatum	8 — 70
836.	" therebinthaceum	10 — —
Fleråriga, 8 å 10 fot höga växter med rikt löfverk och gula blommor. Passa förträffligt såväl i stora bladgrupper, som i kanten af buskpartier. Tåla vintern ute.		
Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)		
837.	" atropurpureum	8 — 60
838.	" Balbisii (S. viscosum; infiatum eller decurrens)	8 — 50
839.	" citrullifolium, (violaceum) — 8 — 50	
840.	" corniculatum	10 1 —
841.	" Fontanesianum	10 1 —
842.	" giganteum, (niveum)	15 — —
843.	" laciniatum, (pinnatifidum) — 8 — 50	
844.	" marginatum	15 — —
845.	" reclinatatum	12 1,50

	<i>à Port.</i>	<i>Ort.</i>
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
846.	Solanum robustum, praktfull — 20 — —	
Obestriddigt vackrast i slägtet.		
" sisymbriifolium (Balbisii)		
847.	" verbascifol. (bahamense)	30 — —
10 sorter rdr 1,10.		
De här anförda sorterna af detta intressanta och högst talrika slägte utmärka sig alla, såväl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt, som för sina prydliga blommor. I bladväxtsamlingar äro de af stor nytta. De flesta af dessa sorter kunna fortplantas genom sticklingar och öfvervintras vid vanlig kammarvärme. På fritt land fordra de varma, skyddade ställen och god jord.		
Sorghum, se Holcus.		
Stachys; Stinknässla, (Labiataeæ.)		
848.	" lanata	10 — —
Flerårig frilandsväxt med hvitaktiga blad; användbar till inbuktningar; blomstänglarna böra afskäras.		
Telekia eller Buphtalmum; Oxöga, (Corymbiferae.)		
849.	" coriifolia, hjertbladig	8 — —
850.	" speciosa, vacker	10 — —
Fleråriga, 6 å 8 fot höga med stora, ljusgröna blad och gula blommor.		
Tommasinia, (Umbelliferae.)		
851.	" verticillaris	8 — 50
6 å 8 fot hög; med vackra blad och stora gröngula blomflockar. Tål vintern ute.		
Wigandia; Wigandia, (Convolvulaceæ.)		
852.	" caracasana	35 — —
853.	" Vigierii	35 — —
Praktfulla bladväxter. Fröet säs i krukor och betäckes foga eller allsintet. Plantorna uppdragas i bänk; öfvervintras vid + 12 å 15° C. nära glaset.		
Zea; Turkiskt hvete eller Mays, (Gramineæ.)		
854.	" Mays var. caragua	8 — 10
855.	" fol. var. (Z. japonica) — 8 — 10	
856.	" gracilima, (Miniatyrmays, utmärkt vacker	30 1 —
Maysen användes allmänt såväl i större som mindre grupper. Den förstn. uppnår en höjd af 6 å 7 fot; Z. japonica deremot endast omkring 2 fot, men är utmärkt för sina vackra, hvitrandiga blad. Fröet utsås nägorunda tidigt i kruka, hvarest plantorna omskolas och vårdas under glas i en ljum bänk, till dess de skola plant. på fritt land.		
Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:		
50	sorter vackra bladväxter	5 —
25	" " "	2 —
12	" " "	1 —

III. Frö till Dekorationsgräs.

(Familj: Gramineæ.)

Nedannämnde gräsarter kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som fristående på gräsplaner, i buketter, o. s. v. De flesta fordra en något fuktig, god jordmän och mot den starkaste solhettan skyddade ställen.

A. Ettåriga gräsarter:

Agrostis; Hven,		
857.	" dulcis	8 — 40
858.	" nebulosa	12 — 90

859.	Agrostis pulchella	8 — 40
Till garnering, planter, i småkrukor o. s. v.		
Anthoxanthum; Vårbrodd,		
860.	" gracilis	5 — 30
Vackert garneringsgräs.		

à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

- Aristida; Hårgräs,**
861. „ cœrulescens — 25 — —
- Avena; Hafre,**
862. „ sterilis, intressant gräs — 8 — 40
- Brachypodium; Acsvingel,**
863. „ distachyum — 15 1 —
864. „ platystachyum — 10 — 70
- Briza; Darrgräs,**
865. „ geniculata — 8 — 40
866. „ maxima — 8 — 30
867. „ minima — 8 — 30
Alla sorterna vackra i buketter.
- Brizopyrum; Darras,**
868. „ siculum — 5 — 30
Vacker till infattningar.
- Bromus; Losta,**
869. „ briziformis — 5 — 10
870. „ lanuginosus — 10 — 70
871. „ patulus — 10 — 75
872. „ purpureus — 8 — 30
873. „ rubens — 10 — —
Allsamman utmärkt vackra i buketter.
- Chloris; Strålgäs,**
874. „ cucullata — 8 — 40
875. „ elegans — 8 — 40
876. „ gracilis — 8 — 50
877. „ polystachya — 20 — —
878. „ subnufica — 8 — 30
Vackra och egendomliga gräsarter; för fröets groning erfordras mycken värme och fuktighet.
- Chrysurus; Guldsvans,**
879. „ cynosuroides (Cynosurus aur.) — 8 — 50
- Coix; Tärgräs,**
880. „ chinensis — 8 — 40
881. „ exaltata — 8 — 30
882. „ Lacryma, Jobs tårar — 5 — 20
Vackra och intressanta; fröet liknar vattendroppar.
- Digitaria; Fingergäs,**
883. „ aegyptiaca — 20 — —
884. „ fimbriata — 8 — 40
- Eleusine; Eleusingräs,**
885. „ coracana (Cynosurus) — 8 — 40
886. „ indica (Chloris repens; Cynosurus pectinatus) — 8 — 50
887. „ oligostachya — 8 — 40
888. „ Toccusa — 8 — 40
- Eragrostis; Kärlgräs,**
889. „ amabilis — 15 — —
890. „ cylindrica (Poa cylindrica) — 10 — 70
891. „ elegans — 5 — 20
892. „ namaquensis — 10 — 60
893. „ nigricans — 20 — —
894. „ plumosa (Poa pl.; decipiens.) — 8 — 40
895. „ Purshii (Eragr. diandra.) — 10 — 70
896. „ thephrosanthes — 10 — 75
Utmärkt fina, vackra gräs, som äfven kunna odlas i krukor och användas till prydnad på blomsterbord, o. s. v.
- Hordeum; Korn,**
897. „ jubatum — 5 — 20

à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

- Lagurus; Harsvans,**
898. „ ovatus — 5 — 20
899. „ „ compactus — 10 — 70
- Panicum; Åkerhirs,**
900. „ altissimum — 8 — 40
901. „ asperrimum — 8 — 40
902. „ colonum — 8 — 40
903. „ erucarvi — 8 — 40
904. „ italicum — 8 — 40
905. „ oryzoides — 8 — —
De båda förstnämnda arterna äro högväxta och passa väl till grupper. Öfriga sorter, se blad & ekonomiväxter.
- Penisetum; Fjädergräs,**
906. „ longistylum — 8 — —
907. **Piptatherum** Thomasii — 8 — 40
- Poa; Gröe,**
908. „ pilosa — 15 — —
909. „ salina — 10 — 80
- Polypogon; Polypogongräs,**
910. „ interruptus — 10 — —
911. „ monspeliensis — 8 — 50
Båda sorterna särdeles vackra till infatt.
- Setaria; Setaria,**
912. „ macrochaeta — 8 — 30
913. „ persica — 10 — —
Vackra till större grupper.
- Sorghum saccharatum (Holeus saccharatus)**
se bladväxter & ekonomiväxter.
Zea, Mays, se blad- & ekonomiväxter.
- B. Fleråriga gräsarter:**
- Agrostis; Hven,**
914. „ argentea — 10 — 50
- Aira; Tätel,**
915. „ cœrulea fol. var; Blåtätel — 10 — —
- Andropogon; Skägggräs,**
916. „ giganteus — 12 — —
917. „ provincialis — 8 — 50
- Arundo; Rör,**
918. „ Donax; Jätterör — 20 — —
919. „ festucoides aurea var. — 15 — —
Den förstnämnda uppnår, om den planteras fritt i ett kallt växthus, 14 à 18 fots höjd.
- Bambusa Metake,** se bladväxter.
- Briza; Darrgräs,**
920. „ media, vacker i buketter — 8 — 40
- Bromus; Losta,**
921. „ Gussonii — 5 — 20
922. „ longiflorus, 4 fot hög — 8 — 35
923. „ maximus — 8 — 30
924. „ pendulinus — 10 — 80
925. „ secalinus giganteus — 5 — 20
Högväxta gräsarter, hvars blomvippor äro särdeles vackra i buketter.
- Ceratochloa pendula,** se Bromus pendulinus.
- Cyperus; Cypergräs,**
926. „ Paramatta — 15 — —
- Diplachne; Diplachne,**
927. „ fascicularis (Leptochloa polystachya) — 10 — 70
- Elymus; Elm,**
928. „ arenarius; Sandelm — 5 — 10

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

972. Clematis *Standishii*, stora mörkblå blommor 40 — —
 973. „ *virginiana*, talrika vita välluktande blommor 10 — 75
 974. „ *Vitalba*, bekant; har talrika vita blommor 15 — —
 975. „ *Viticella*, klockformiga, blå eller violetta blommor 15 — —

Alla 10 sorterna rdr 1,75.

Samtliga dessa växter äro verkligen praktfulla, passande till beklädnad af pelare, murar, plank, lusthus, o. s. v. De förstn. 4 sorterna och *Standishii* böra för säkerhets skull öfverv. frostfritt: de öfriga tåla vintern. Fröet ligger stundom öfver ett år i jorden innan det groer.

Cobæa, (Bignoniaceæ.)

976. „ *scandens* 20 3 —
 Hastigt växande, vacker med klockformiga stora, viol. blmr. Odlas i temp. växthus, men kan under sommaren utpl. i det fria.

Coccinia; *Rödrefva*, (Cucurbitaceæ.)

977. „ *indica* (*Bryonia grandis*) 30 — —
 978. „ *Mac Kennii* 35 — —
 Hastigt växande, till bekl. af murar och andra större föremål utm. väl passande växter med mörkgröna blad och vita blmr. Förökas lätt med stickel, hvilka öfverv. i växthus eller boningsrum. Den sistn. har röda hvitstrimmiga frukter.

Cucumis; *Gurka*, (Cucurbitaceæ.)

979. „ *grossularia* 15 — —
 980. „ *prophetarum*, *Prophetgurka* — 15 — —
 Ettåriga, gurkartade växter.

Cucurbita; *Pumpa*; *Gräskar* eller *Kurbits*, (Cucurbitaceæ.)

981. „ *Auguriepumpa* 10 — 40
 982. „ *Courge goufré* 10 — 60
 983. „ *gul jätte-melonpumpa* 10 — 40
 984. „ *Herkulesklubba* 10 — 30
 985. „ *Centnerpumpa* 10 — 30
 986. „ *Flaskpumpa* 10 — 30
 987. „ *Apelsinpumpa* 10 — 30
 988. „ *Citronpumpa* 10 — 30
 989. „ *Turbanpumpa* 10 — 30
 990. „ *Kejsarmössa*, flera sorter 10 — 30
 991. „ *Pilgrimsflaska* 10 — 30
 992. „ *Valparaisopumpa* 10 — 40
 993. „ *digitata* 15 — —
 994. „ *perennis* 20 — —
 995. „ *blandade sorter* 5 — 8
 20 olika sorter rdr 1,75.

12 „ „ 1 —

Den sistn. tål vintern ute endast under god betäckning; se vidare bland köksväxterna, under rubriken gurkartade växter.

Cyclanthera; *Flökrefva*, (Cucurbitaceæ.)

996. „ *explosdens* 10 1 —
 997. „ *pedata* 8 — 40

Ettåriga, mycket hastigt växande med vackert löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstn. vid lindrigaste beröring öppnar sig och våldsamt utkastar kärnorna. Säs på kall jord.

Echinocystis, (Cucurbitaceæ.)

998. „ *lobata* 20 — —
 Utm. slingerväxt, hvarmed man på kort

à Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

tid kan öfvertäcka lusthus, staket, murar o. s. v. Har femflikiga blad och talrika vita, välluktande blmr. Frukten är af ett dufäggs storlek. Fröet säas på kalljord.

Glycine, (Papilionaceæ.)

999. „ *chinensis*, 4 st. frö 55 — —
 Praktfull trädartad slingerväxt för kalljord. Har ljusblå, utmärkt vackra, i rika klasar hängande blmr. Fordrar ett varmt, skyddadt läge, god jord och betäckning under vintern.

Gronovia, (Cucurbitaceæ.)

1000. „ *Humboldtii* 40 — —
 Vacker, mycket snabbt växande; pryddigt löfverk och en mängd gula blommor.

Ipomea; *Blomman för dagen*, (Convolvulaceæ.)

- A. Ettåriga:
 1001. „ *bona nox* (*Calonyction speciosum*) 5 — 20
 1002. „ *coccinea* (*Quamoclit cocc.*) — 5 — 20
 1003. „ *hederacea* (*atrorivulacea*)
 (*Pharbitis*; *Ip. barbata*) — 8 — 40
 1004. „ „ *superba* 8 — 50
 1005. „ *limbata* (*Pharbitis limb.*) — 5 — 20
 1006. „ *mexicana* (*violacea vera*) — 10 — —
 1007. „ *Nil* (*Pharb.*; *Ip. cœrulea*; *Ip. triloba*; *Pharb. scabra* & *punctata*) 5 — 25
 „ *purpurea*, se modeblmr.

B. Fleråriga:

1008. „ *digitata* (*Convolvulus dig.*)
 purpurroda blommor 10 1 —
 1009. „ *fiefolia* (*Ip. bonariensis*; *Conv. Hookerianum* praktfulla, purpurroda blmr 15 — —
 1010. „ *Hardingii*, stora lilaf. blr — 25 — —
 1011. „ *Learii* (*Pharbitis*) purpurrod 25 — —
 1012. „ *tuberosa* (*Conv. Ratatas*) — 10 — 80
 Gula, klocklika blommor.

7 sorter ettåriga 35 öre.

5 „ fleråriga 80 „

Alla dessa arter hafva praktfulla blommor, hvilka merändels öppna sig om morgnarna och vara endast för en dag. *Ip. bona nox* gör dock härifrån ett undantag enär dess stora, praktfulla blommor öppna sig mot aftonen. Alla de ettåriga arterna odlas ute, hvaremot de fleråriga, som härstamma från tropiska trakter, böra öfvervinternas vid + 10 à 15° C. och höra till växthusens skönaste slingerväxter.

Lagenaria; *Flaskkurbits*, (Cucurbitaceæ.)

1013. „ *longissima* 10 — —
 Har flera fot långa, 1 fot tjocka frukter; fordrar fet jord och en varm plats.

Lapageria, (Philesiaceæ.)

1014. „ *rosea* 80 — —
 En af de vackraste rankväxter för växthus eller boningsrum; har sköna, rosen- eller carmosinröda, liljelika blommor.

Lathyrus; *Ärtblomster*, (Leguminosæ.)

- A. Ettåriga:
 1015. „ *azureus*, blå 5 — 10
 1016. „ *clymenum*, röd, hvit & blå — 5 — 10
 1017. „ *luteus*, gul 5 — 10

å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Lathyrus odoratus, se modeblmr.

1018. " speciosus, röd 5 — 10
1019. " tingitanus, mörkröd 5 — 20
1020. " blandade 5 — 10

B Fleråriga:

1021. " grandiflorus, röd, stor 20 — —
1022. " " splendens, lysande 15 — —
1023. " latifolius, röd 10 — 40
1024. " " albus, hvit 20 — —
1025. " " roseus, rosenröd 10 — 50
1026. " " splendens, lysande 15 — 90

5 sorter ettåriga 20 öre.

6 fleråriga 75 öre.

Såväl de ett- som fleråriga sorterna äro mycket vackra och tacksamma slingerv.

Lophospermum; Kamfrö, (Scrophulariaceæ.)

1027. " grandiflorum 10 1 —
1028. " Hendersonii 10 1 —
1029. " scandens 30 — —

Särdeles vackra blmr, som trifvas väl äfven i boningar. De köttiga rotknölarne böra ej vatnas under vintern. Om våren kunna de omplanteras i frisk jord och begagnas till att bekläda mindre föremål.

Maurandia, (Scrophulariaceæ.)

1030. " antirrhiniflora, blå m. hvitt — 15 — —
1031. " Barclayana, violett 20 — —
1032. " Laceyana, blåaktig, rosenröd 30 — —
1033. " purpurea grandifl., storblmig, purpurröd, utmärkt — 30 — —
1034. " semperflor., blåaktigt röd — 20 — —
1035. " " fl. alba hvit 35 — —

Alla 6 sorterna rdr 1,30.

1036. " blandade 20 — —
Dessa utmärkt nätta och prydliga växter egna sig förr. till amplar, infattningsflätverk, blomsterkorgar och dylikt. De äro lätta att odla och blomma mycket tacksamt. Öfverv. i boningsrum eller temp. växthus.

Melothria, (Cucurbitaceæ.)

1037. " cucumerina 15 — —
1038. " pendula 20 — —

Slingerv. med små, prydliga svartgröna frukter och vackra blad. Passa väl till bekl. af höga törrosstammar, hängande guirlander o. s. v.

Menispermum; Månfrö, (Menispermæ)

1039. " canadense 25 — —
Vacker till bildande af löfsalar, bekl. af väggar, plank o. s. v. Tål vintern ute. Om man utspänner stark messingstråd i form af ett tält och låter den hastigt växande rankan löpa uppåt trädarne, så bildas ett utmärkt vackert, grönskande tält.

Momordica; Balsamgurka, (Cucurbitaceæ.)

1040. " Balsamina 5 — 40
1041. " Charantia 5 — 40
Vackra, intressanta slingerväxter för varma växthus och boningsrum; ha vackra skarlakanröda frukter.

Mukia, (Cucurbitaceæ.)

1042. " scabrella 10 — —
Präktig med hjertformiga flåkiga blad och röda frukter.

å Port Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Periploca, (Asclepiadææ.)

1043. " græca 15 — —
Trädartad slingerväxt för fritt land.

Phacelolus; Böna, (Leguminosæ.)

1044. " multiflorus, rödblommig. — 5 — 5
1045. " " bicolor, röd med hvitt — 5 — 5
Fröet sås på kalljord.

Pilogyne; Hårgriffel, (Cucurbitaceæ.)

1046. " lucida, pr 2 st. frö 50 — —
Utmärkt nätt till beklädnad af små éspallier etc. Bladen mörka, glänsande; frukterna små, röda.

Rhynocarpa, (Cucurbitaceæ.)

1047. " dissecta 25 — —
1048. " foetida 25 — —
1049. " Gerardii 25 — —

Småre slingerväxter med inskruna, nätta blad och skarlakanröda frukter. Passa till små flätverk, korgar, o. s. v.

Scotanthus; Tubrefva, (Cucurbitaceæ.)

1050. " tubiflorus 35 — —
Praktfull; rikt löfverk, vackra, hvita blommor och små skarlakanröda frukter.

Scyphanthus; Skåblomster, (Loacææ.)

1051. " elegans (Grammatocarpus volubilis) 40 — —
Vacker ettårig växt med sköna, underbart formade blommor. Fordrar varma och lugna ställen på kalljord.

Sicyos, (Hårgurka, (Cucurbitaceæ.)

1052. " angulata 5 — 20
Ettårig; användes att bekl. större föremål.

Sicyosperma; Skärmrefva, (Cucurbitaceæ.)

1053. " gracile 20 — —
Som föregående; bladen 3—5 flåkiga; hvitaktiga blommor och svarta frukter; förökar sig ofta genom själfsådd.

Thladiantha; Gulrefva, (Cucurbitaceæ.)

1054. " dubia 50 — —
Mycket praktf. slingerväxt för kalljord; har talrika gula något kloeklika blommor. Fordrar god jord, varmt läge och löfbeckning under barfrost.

Thunbergia, (Acanthaceæ.)

1055. " alata, blekgul med svart — 15 — —
1056. " " alba, hvit med svart — 15 — —
1057. " " aurantiaca, guldgul med svart svalg 15 — —
1058. " " Barkerii, rent hvit 15 — —
1059. " " coccinea, skarlakanr. — 50 — —

Praktf. för mindre éspallier, amplar och blomsterkorgar; böra ej utplanteras i det fria förr än sommarvärmen är pålitlig på lugna, skuggiga platser. Den sistn. sorten är flerårig och öfverv. vid $\pm 15^{\circ}$ C.

Trichosanthes; Ormgurka, (Cucurbitaceæ.)

1060. " anguinæa 10 — 50
1061. " colubrina 10 — —
Odlas som drifgurkor; de smala, ormlika frukterna blifva ofta $1\frac{1}{2}$ à 2 fot långa, se köksväxter.

Tropæolum; Krusse, (Tropæoleæ.)

1062. " canariense 20 — —
1063. " Lobbianum Brillant 10 — 50
1064. " " Duc de Vivence 10 — 50

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.		Rmt Rd ö.	Rd ö.
1065.	Tropæolum	Lobbianum	Caroline Schmidt	—	15 — 75
1066.	„	Lobbianum	coccineum multiflorum	—	12 — 60
1067.	„	„	flammula grandiflora	—	12 — —
1068.	„	„	geant des batailles	—	25 — —
1069.	„	„	glabrum variegatum	—	25 — —
1070.	„	„	glory, skarlakan	—	12 — 60
1071.	„	„	Hokerii	—	30 — —
1072.	„	„	Kotchianum multiflor.	—	15 — 75
1073.	„	„	Lili Schmidt	—	15 — 70
1074.	„	„	Mr Colmet	—	12 — —
1075.	„	„	Napoleon III	—	20 — —
1076.	„	„	Queen Victoria	—	15 — —
1077.	„	„	Triomphe de Hyeres	—	25 — —
1078.	„	„	de Gand	—	25 — —
1079.	„	„	du Prado	—	30 — —
1080.	„	„	blandade	—	15 — 70
1081.	„	majus, Spansk	Krasse	—	5 — 4
			Pr 4. 2 rdr.		
1082.	„	„	atropurpureum	—	5 — 10
1083.	„	„	coccineum	—	5 — 15
1084.	„	„	Eduard Otto	—	8 — 40
1085.	„	„	luteum, gul	—	5 — 20
1086.	„	„	nanum atrococeinum	—	5 — 30
1087.	„	„	Beauty	—	5 — 30
1088.	„	„	Crystal Palace Gem	—	5 — 25
1089.	„	„	King of the Tom Thumb	—	15 — 80
1090.	Tropæolum	majus nanum	King Theodore	—	8 — 40
1091.	„	majus nanum	purpureum Cattles	—	15 — 75
1092.	„	„	nanum spotted	—	5 — 20
1093.	„	„	minus	—	5 — 30
1094.	„	„	coccineus	—	15 — 80
			25 sorter Tropæolum rdr	2,40	— —
			17 „ T. lobbianum	2,75	— —
			10 „ T. majus	—	70 — —
			5 „ T. „ nanum	—	40 — —
1095.	„	läga, blandade	sorter	—	10 — 75
			Alla krassarerna frambringa under sommaren och hösten en otalig mängd lysande blmr, växa fort och äro ej ömtåliga för väderlekstörhållandena. Om man odlar T. Lobb. i krukor och inställer dem i temp. hus, nära glaset, så blomma de flesta sorterna nästan hela vintern.		
			Vitis; Vindruvva, (Viniferæ.)		
1096.	„	Amerikanska, blandade		—	20 1 —
1097.	„	Labrusca		—	10 — 15
1098.	„	vinifera, af bästa odlade sorter, blandade		—	5 — 8
			Då urvalet oinskränkt anförts oss, lemnas:		
			50 sorter vackra slingerväxter . . . rdr 5,50		
			25 „ „ „ „ „ „ 3 —		
			12 „ „ „ „ „ „ 1,50		
			12 „ höga slingerväxter . . . „ 1 —		
			12 „ medelhöga „ . . . „ 1,25		
			12 „ läga „ „ „ „ 1,50		

V. Frö till ettåriga (Annuella) Blomsterväxter:

Fröet till de med * betecknade sorterna böra utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför sligtannet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras sedan i slutet af Maj eller början af Juni på frukt land. Alla de öfriga, obetecknade sorterna säs på kalfjord så tidigt som möjligt och på de platser, hvarest de framdeles skola blomma.

* Abronia, (Nyctagineæ.)	Vackra för krukor och i grupper; fordra kraftig jord och mycket sol.
1099. „ umbellata, med gult svalg — 8 — —	Agrostemma; Klätt eller Åkerkrans, (Caryophylleæ.)
Välluktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar, m. m. Är ömtålig för rätt och fuktigt väder.	1108. „ cœli rosa, Himmelsrosen — 5 — 20
* Aeroclinium, (Senecionideæ.)	1109. „ „ rosa fimbriata nana, låg, vacker . . . — 10 1 —
1100. „ roseum, rosenröd . . . — 5 — 15	1110. „ „ fl. pl., dubbel, utm. — 15 — —
1101. „ fl. alba, hvit . . . — 5 — 20	Små nätta växter med vackra, röda och hvita blmr. Fröet af den sistn. lemnar omkring 6 å 10 % väl fyllda, sköna blmr.
Vackra immorteller; fordra sol och en varm, sandblandad jordmån.	* Alonsoa, (Scrophulariaceæ.)
Adonis; Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ.)	1111. „ incisefolia var. grandif. (Hemimeris). — 8 — 50
1102. „ æstivalis, tidig — 5 — 8	1112. „ Warszewiczii — 8 — 60
1103. „ autumnalis, sen, pr 4. 4 rdr — 5 — 8	Vackra skarlakanröda blmr. Kunna äfven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 å 8° C. Utplanterade i det fria, lemna de hela sommaren en mängd blmr och få moget frö.
Vackert, fint löfverk och skarlakanröda blommor.	Althea; Stockros, (Malvaceæ.)
Aethionema, (Crucifereæ.)	1113. „ chinensis, kinesisk, blandade färger — 12 1,50
1104. „ Buxbaumii, lågv.; infattn. — 8 — 50	Är egentligen flerårig; men blommar redan första året om den säs någorlunda tidigt.
* Ageratum; Lefvebalsam, (Eupatorineæ)	
1105. „ mexicanum, blå — 5 — 20	
1106. „ albif. nanum, hvit, låg — 8 — 60	
1107. „ „ nanum, lågväxt — 8 — 50	

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Amaranthus; Räfsvans, (Amarantaceæ.)

- * " bicolor fol. atropurpureis,
se bladväxter.
1114. " caudatus 5 — 10
1115. " " viridis, grön 5 — 10
1116. " cruentus, mörk 5 — 20
* " melanchol., se bladväxter.
1117. " monstrosus 5 — 10
1118. " sanguineus, blodröd 5 — 10
* " tricolor, se bladväxter.

Alla 5 sorterna 20 öre.

Dessa egendomliga växter kunna alla användas till buketter, kransar o. s. v. Blommorna böra aftagas medan de ännu äro halfutspruckna.

Annobium; (Senecionideæ.)

1119. " alatum 5 — 20
Ettennell med hvita blommor, som användes till buketter, kransar o. s. v. Blommorna böra aftagas medan de ännu äro halfutspruckna.

Ampherephis, (Eupatoriaceæ.)

1120. " intermedia, gula blommor — 8 — 70

* **Anagallis; Arfve, (Primulaceæ.)**

1121. " coerulea, blå 10 — —
1122. " latifolia, blå 5 — 30
1123. " grandiflora carnea, köttf. — 12 — —
1124. " " coccinea, skarlakanröd — 12 — —
1125. " " coerulea, blå 12 — —
1126. " " cupreata sanguinea,
kopparfärgad, vacker — 12 — —
1127. " " Eugenie, blå 12 — —
1128. " " lilacina, gredelin 12 — —
1129. " " Napoleon III, brunröd — 12 — —

Alla 9 sorterna 90 öre.

Allesamman, med undantag af de båda förstn., äro hybrider af *A. collina* & *Monelli*. De utmärka sig för talrika, vackra blmr och äro särdeles passande för rumsodling. Omplant. om våren i god lätt jord.

* **Anthemis; Åkerkulla, (Senecionideæ.)**

1130. " arabica (Cladanthus pro-
lifera 5 — 30
2 à 3 fot hög grupp- eller rabattväxt med gula, vackra blommor.

Antirrhinum majus, se modeblommor.

* **Aretotis; Björnöra, (Cynareæ.)**

1131. " breviscapa 10 — —
Något trädartad med vackra, gula blmr. Kan öfverv. inomhus och fortplantas med sticklingar. Utplanteras om våren på soliga rabatter, i mager jord.

Argemone; Taggvallmo, (Papaveraceæ.)

1132. " ochroleuca, gul 8 — 60
1133. " platyceros grandifl., hvit — 8 — 50
Omkring 1 fot höga för rabatter användbara växter.

Artemisia, se bladväxter.

* **Asperula; Madra, (Rubiaceæ.)**

1134. " setosa 5 — 20
Präktig, länge blommande, väluktande gruppväxt med blå blommor.

* **Aster; Aster eller Stjernblomster, (Asteroideæ.)**

1135. " tanacetifolius (chrysanthemoides eller Macheranthera tanacetifolia) 10 — 80

å Port. Ort.

Rmt Rd öre. Rd ö.

1136. Aster tenellus (Felicia; Kaul-
fussia ciliata) 8 — 40
Båda skilja sig betydligt från de vanliga, bland modeblommorna anförda asterformerna; blmarna äro violetta med gul disk; passa till små grupper och infattningar.

Athanasia, (Senecionideæ.)

1137. " annua (Lonas inodora) — 8 — 45
Blommorna guldgula; odlas jemte andra sommarblommor på grupper och rabatter.
Atriplex, se bladväxter.

* **Bartonia, (Loaseæ.)**

1138. " aurea 5 — 15
Vacker, 1 à 2 fot hög dekorationsväxt med guldgula, af 5 orangefärgade fläckar prydda blmr. Ömtålig för starka regnskurar, hvarföre några exempl. böra odlas i krukor.
Beta, se bladväxter.

* **Bidens; Brunskärva, (Senecionideæ.)**

1139. " atrosanguinea (Dahlia Zimapanii) 25 — —
1 à 1½ fot hög med vackra svartröda blommor; användbar för rabatter. Växten bildar rotkölar, som kunna öfverv. i sand, torr och frostfritt samt om våren utplant.

Blitum; Smultronspenat, (Chenopodiaceæ.)

1140. " capitatum 5 — 35
Denna växt är af värde endast för sina, i bladvinklarna sittande, smultron. frukter.

* **Brachycome, (Asteroideæ.)**

1141. " iberidifolia, blå 8 — 70
1142. " " alba grandifl., hvit 10 — 1
1 à 1½ fot höga, till infattningar passande växter med cinerarielika blommor.

* **Brevallia, (Scrophulariaceæ.)**

1143. " Czerviakovskij 10 — —
1144. " demissa 10 — —
1145. " elata 10 — —
Omkring 1 à 1½ fot höga, isynnerhet för krukodling passande växter med blå, inuti stundom gulaktiga blommor.

* **Calacia, (Senecionideæ.)**

1146. " sonchifolia (Emilia sonchifolia) 8 — 40
1147. " " lutea, orangefärgad 8 — 50
1½ à 2 fot höga, till grupper och rabatter passande växter, som äfven äro vackra i buketter.

Cajophora (Loasa), se slingerväxter.

* **Calandrinia, (Portulacææ.)**

1148. " Buridgei 5 — 20
1149. " grandiflora 8 — 60
1150. " speciosa 5 — 25
1151. " umbellata (Talinum; Portulaca prostrata) 8 — 60

Ha fina, prydliga, rosenröda blmr. Den förstn. är synnerligen användbar på mycket soliga blomstergrupper. *C. grandiflora* & *umbellata* kunna med fördel odlas i böningsrum och öfvervintras frostfritt.

* **Calceolaria; Toffelblomster, (Scrophulariaceæ.)**

- " hybrida, se krukväxter.
1152. " pinnata 20 — —
1153. " scabiosifolia 10 — —
1154. " californica 8 — 60

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Variera mellan 1½, å 2½ fots höjd. Blommorna gula, talrika; vackra till grupper och infattningar.

Calendula; Ringblomster eller Solsicka, (Cynareæ.)

1155. " hybrida — 5 — 15
1156. " officinalis ranunculoides. — 5 — 10
1157. " " superba — 5 — 15
1158. " " pluvialis, *Regnvisaren* — 5 — 15
1159. " " Pongei fl. pl. dubbel — 8 — 50

C. hybr. & pluvialis ha hvita blmr. De nyare formerna af C. off. utmärka sig för vacker byggnad och lifliga, i gult och orange varierande färger. Förtjenta af uppmärksamhet.

Calliopsis eller Coreopsis; Skönhetsöga, (Senecionideæ.)

1160. " bicolor (Coreops. tinctoria) — 5 — 20
1161. " " fistulosa — 5 — 35
1162. " " maculata — 5 — 25
1163. " " nana, låg — 8 — 40
1164. " " " marmorata — 8 — 40
1165. " " " purpurea — 8 — 40
1166. " " nigra speciosa — 5 — 30
1167. " " splendens — 5 — 20
1168.* " cardaminifolia — 5 — 30
1169.* " coronata — 8 — 40
1170.* " Drummondii — 5 — 30

Alla 11 sorterna 60 öre.

Alla sorterna äro utmärkta praktblommor. Vål förtjenta af att odlas på grupper, rabatter och i krukor. De talrika, på långt afstånd lysande blommorna variara i gult och brunt. De låga sorterna blifva 2 å 3, de högväxta 3 å 4 fot höga.

*** Callirhoe eller Nuttalia, (Malvaceæ.)**

1171. " pedata — 10 — 75
1172. " " nana — 10 — 1
1173. " " verticillata — 10 — 1
Vackra gruppväxter; med talrika, lifliga, rosenröda blommor.

Campanula; Kloekblomster eller Blåklocka, (Campanulaceæ.)

- 1174.* " attica, låg, blå, rikblommig — 10 — —
1175. " " celtidifolia, låg, blå, storblommig — 35 — —
1176.* " Loreyii, blå och hvit. — 10 — 75
1177. " speculum, *Venuspegel*. — 5 — 20
1178. " " fl. albo, hvit — 5 — 30
1179. " " fl. lilacino, gredelin — 5 — 30
1180. " " grandiflora, blå — 5 — 30
1181. " " alba, hvit — 5 — 30
1182.* " stricta, ljusblå — 10 — 1,25

Alla 9 sorterna 75 öre.

Ettåriga; mycket vackra till kantblommor till större och mindre grupper. Fröet till en del sorter är mycket fint, hvarföre man vid sätningen bör vara försigtig, att det ej kommer djupt.

Cannabis, se bladväxter.

*** Capsicum; Spansk peppar, (Solanaeæ.)**

1183. " annum med mörkröd, påsförmig frukt. — 5 — 20
1184. " " gul, påsförmig frukt. — 5 — 20
1185. " " röd, lieförmig frukt — 5 — 20
1186. " " gul, lieförmig frukt — 5 — 20

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

1187. Capsicum annum, röd, bärformig frukt — 5 — 20

1188. " annum, gul, bärf. frukt — 5 — 20

1189. " " svart frukt. — 5 — 20

Alla 7 sorterna 30 öre.

1190. " blandade — 5 — 10

Odlas för dess vackra och i hushållet användbara frukter.

Celosia, se modeblommor.

Cenia, (Senecionideæ.)

1191. " turbinata — 8 — —

Hög infattningsväxt med gula blommor.

Centaurea; Klint, (Cynareæ.)

- 1192.* " americana — 10 — 30

1193. " cyanua, *Blåklint* eller *Kornblomster*, blandade — 5 — 15

- 1194.* " depressa, vacker, blå — 5 — 15

- 1195.* " involucrata, gul — 5 — 15

- 1196.* " moschata; *Bisambloomster*. — 5 — 20

- 1197.* " " alba, *Bisamb.*, hvit — 5 — 20

- 1198.* " suaveolens, gul, välukt. — 5 — 30

Alla 7 sorterna 30 öre.

Prydliga, för rabatter passande blommor.

Centaureidium, (Cynareæ.)

1199. " Drummondii — 8 — 70

2 å 3 fot hög rabattväxt med gula blomhufvuden.

*** Centranthus; Baldrian, (Valerianææ.)**

1200. " macroziphon, röd — 5 — 20

1201. " " fl. albo, hvit. — 5 — 25

1202. " " fl. carneo, köttfärgad — 5 — 20

1203. " " nanum, lågväxt. — 5 — 25

Vackra, 1½ fot höga prydnadsväxter.

Cerithe; Vaxblomster, (Boraginææ.)

1204. " aspera, utmärkt vacker — 8 — 50

1205. " auriculata — 8 — 50

1206. " gymnantra — 5 — 25

1207. " major — 5 — 25

1208. " retortum, brokiga blad — 8 — 60

Alla 5 sorterna 30 öre.

Santliga sorterna 1 å 2 fot höga, passande till rabatter.

*** Chenostoma, (Scrophulariaceæ.)**

1209. " fastigiata, gredelin — 8 — 70

1210. " polyantha, hvit eller röd — 8 — 70

Rätt vackra, synnerligen till odling i krukor. På fritt land fordra de ett varmt, skyddadt ställe.

Cheiranthus; Löfskåja, (Crucifereæ.)

1211. " maritimus, *Strandlöfskåja*. — 5 — 10

1212. " " fl. alba, hvit — 5 — 20

Omkring 1 fot hög, grenig växt, som trives i mager, sandblandad jord och är en omycket kantblomma. Öfriga sorter, se modeblommor.

Chenopodium, se bladväxter.

*** Chlora, (Gentianeæ.)**

1213. " grandiflora, (C. perfoliata grandiflora) — 35 — —

Har utmärkt vackra, gula blommor, odlas bäst i krukor, emär den är ömtålig för dålig väderlek. Bildar små nätt buskar och är förtäfflig till dekorationer på blomsterbord, o. s. v.

Chrysanthemum; Prestkrage eller Guldblomster, (Senecionideæ.)

	à Port.	Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
1214. <i>Chrysanthemum acule</i> , låg- växt, guldgul	8	—	60
1215. " <i>carinatum</i> , hvit	5	—	30
1216. " " <i>annulatum</i> , flerfärgad	8	—	40
1217. " " <i>atrococcineum</i> , mörkr.	8	—	40
1218. " " <i>Buridgeanum</i>	5	—	25
1219. " " <i>Dunettii</i> fl. pl., hvit, dubbel	10	—	80
1220. " " <i>luteum</i> , gul	5	—	30
1221. " " <i>purpureum</i> , purpurf.	8	—	40
1222. " " <i>venustum</i>	5	—	20
1223. " <i>coronarum</i> , hvit.	5	—	20
1224. " " <i>luteum</i> , gul	5	—	20
1225. " " <i>pomponicum album</i> plenum, hvit	10	—	75
1226. " " " <i>luteum</i> pl., gul	10	—	75
1227. " <i>rigidum</i> , gul, rikblommig	5	—	20
Alla 14 sorterna, 85 öre. 6 vackra sorter, 40 öre.			
Allesamman utmärkta grupp- och rabatt- växter. Varieteterna af <i>C. carinatum</i> blifva omkring 1½ fot höga med blmr i lysan- de färger. <i>C. coronatum</i> blifva 3 à 4 fot höga. <i>C. pomponicum</i> betydligt lägre.			
* Chrysocephalum; Guldhufvud, (Helichryseæ.)			
1228. " <i>strictum</i> , gula blommor	10	—	75
Vackert evighetsblomster; fordrar solrika platser.			
Clarkia, Klarkia, (Onagrariææ.)			
1229. " <i>elegans</i> , violetterd	5	—	20
1230. " " <i>alba</i> pura, hvit dubb.	8	—	40
1231. " " <i>carnea</i> pl., köttfärgad	5	—	20
1232. " " <i>rosea</i> , röd	5	—	30
1233. " " <i>violacea</i> , violett, dubb.	5	—	30
1234. " <i>pulchella</i> , röd	5	—	20
1235. " " <i>grandifl.</i> , storbl., röd	5	—	25
1236. " " fl. albo, hvit	5	—	15
1237. " " fl. pl., dubbel	8	—	50
1238. " " <i>integripetala</i> , röd	5	—	25
1239. " " fl. pl., röd, dubbel	10	—	80
1240. " " fl. albo pl., hvit.	10	—	75
1241. " " <i>marginata</i> , röd, hvit- kantad	5	—	25
1242. " " fl. pl., dubbel	15	—	—
1243. " " <i>nana</i> , (Tom Thumb) låg	5	—	30
1244. " " <i>pulcherrima</i> , carmin	5	—	30
Alla 16 sorterna, 95 öre. 10 vackra sorter, 65 "			
1245. " <i>blandade</i> sorter	5	—	20
Alla <i>Clarkia</i> , och isynnerhet varieteterna af <i>C. pulchella</i> , äro verkliga prydnads- växter, förtjenta af att allmänt omhuldas. De fiesta blifva 1½ à 2 fot höga, mycket rikblommiga och förträffliga att plantera på grupper. De dubbla sorterna äro äf- venledes mycket vackra.			
* Cleome, (Capparidææ.)			
1246. <i>speciosissima</i>	10	—	—
3 à 4 fot hög, till blomsterbord bäst pas- sande växt med egendomliga, rätt vackra blmr. Odlas helst i krukor.			
* Clanthus; Praktvioka, (Papilionææ.)			
1247. " <i>Dampierii</i> , (<i>Donia formosa</i>)	40	—	—
Är egentligen flerårig, men emedan den			

	à Port.	Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
är kinkig att öfvervintra och desutom blommar lättast och rikast om den be- handlas såsom ettårig, hafva vi upptagit den här. Fordrar god, kraftig, sandblan- dad löf- och Jungjord samt en sval, luftig plats i kast eller drifbänk. Vid vattnin- gen bör nöga tillses att strålen ej kom- mer för nära stammen, emedan växten deraf vantrifves. De i rika klasar hän- gande blommorna äro stora, präktigt skar- lakanröda.			
* Clintonia, (Lobeliææ.)			
1248. " <i>elegans</i> , blå	12	—	1,50
1249. " <i>pulchella</i> , blå	30	—	—
1250. " " <i>alba</i> , hvit	30	—	—
1251. " " <i>atrocinerea</i>	30	—	—
Smånätta växter med vackra blmr; odlas och användas som den allmänt kända blå lobelian, men äro ömtåligare än den, för otjenlig väderlek.			
<i>Coccinea</i> , se slingerväxter.			
<i>Coix</i> , se dekorationsgräs.			
Collinsia, (Scrophulariææ.)			
1252. " <i>bartiaefolia</i> , rosenröd	5	—	15
1253. " " fl. <i>alba</i> , hvit.	5	—	25
1254. " <i>bicolor</i> , violett och hvit.	5	—	10
Pr <i>fl.</i> 5 rdr.			
1255. " " <i>candidissima</i> , hvit.	5	—	10
1256. " " fl. <i>alba</i> , hvit.	5	—	15
1257. " " fl. <i>carnea</i> , köttfärgad.	5	—	15
1258. " " <i>major</i> , stor	5	—	10
1259. " <i>grandiflora</i> , blå, stor	5	—	15
Pr <i>fl.</i> 10 rdr.			
1260. " <i>multicolor</i> , mångfärgad	5	—	20
1261. " " <i>marmorata</i>	5	—	20
1262. " <i>verna</i>	15	—	—
Alla 11 sorterna 60 öre. 6 vackra sorter 25 "			
Alla dessa, utn. vackra blmr kunna an- vändas till infattningar. Om de odlas i krukor och nått uppbindas, äro de mycket prydliga på blomsterbord och dylikt. Alle- samman kunna äfven säas om hösten och blomma då betydligt rikare och tidigare.			
* Commelina, (Commelinææ.)			
1263. " <i>coelestis</i>	10	—	80
1264. " " <i>alba</i>	10	—	80
1265. " " <i>variegata</i>	10	—	80
2 à 3 fot höga med blå eller blåhvita blmr. De knörliga rötterna kunna om hösten upptagas, öfverv. i torr sand och nästa vår utpl. på grupper då de blomma tacksamt.			
Convolvulus; Vinda eller Jungfruskört, (Convolvulææ.)			
1266. " <i>tricolor</i> , trefärgad	5	—	10
1267. " " <i>azureus</i> , himmelsblå	5	—	10
1268. " " fl. <i>alba</i> , hvit	5	—	10
1269. " " fl. <i>alba plena</i> , dubb.	10	—	—
1270. " " fl. <i>coerulea plena</i> , dubbel, blå	5	—	30
1271. " " <i>monstrosus</i> , mörkblå	5	—	10
1272. " " <i>speciosus</i> , atropurp.	5	—	25
1273. " " <i>splendens</i> , mörkblå	5	—	10
1274. " " fl. pl., dubbel	20	—	—
1275. " " <i>variegatus</i> , strimmig	5	—	10
Alla 10 sorterna, 60 öre.			
1276. " " <i>blandade</i>	5	—	10

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Kända, allm. omtyckta prydnadsblm som kunna användas till bredare infattningar.

Cosmanthus, (Polemoniaceæ.)

1277. „ fimbriatus — 8 — 60
1 à 1½ fot hög med prydliga, hvita, blåaktiga, fransade blommor.

Cosmidium, (Senecionideæ.)

1278. „ Buridgeanum, svarttröd — 5 — 20
1279. „ atropurp., mycket mörk — 8 — 40
1280. „ filiforme, guldgul — 8 — 50

Eneidan dessa vackra gruppväxter fordra en längre sommar än som råder hos oss, bör man utså fröet i Juli eller Aug., öfvervintra pl. nära glaslet i ett temp. växthus och följande vår utpl. dem på varma platser i det fria, hvarst de rikligt blomma.

Crepis; *Krepe*, (Cicoraceæ.)

1281. „ barbata (Tolpis barb.) gul — 5 — 20
1282. „ rubra (Backhausia r.) röd — 5 — 20
1283. „ fl. alba, hvit — 5 — 20

Användbara på rabatter.
Cucurbita & Cucumis, se köksträdgårds- & slingerväxter.

Cuphea, (Lythriaceæ.)

1284. „ miniata, högröd — 15 — —
1285. „ purpurea, i flera färger — 8 — 60
1286. „ silenoides, purpurrod — 8 — 60

Fordra god jord och solrika platser, kunna användas till grupper och infattningar.
Cyclanthera, se köksträdgårds-, gurkartade & slingerväxter.

Cynoglossum; *Hundtunga*, (Boraginæ.)

1287. „ linifolium, *Hvit förgätmig-øj* . . . pr *tl.* 5 rdr — 5 — 10
Känd, omtyckt, 1 à 1½ fot hög kantblma.

Datura; *Spikkubba*, (Solanaceæ.)

1288. „ ceratocaula, 3 à 4 fot hög — 8 — 50
1289. „ fastuosa, 2 à 3 fot hög — 5 — 20
1290. „ Huberiana, dubbel — 15 — —
1291. „ „ alba, hvit, dubbel — 15 — —
1292. „ guajaquilensis, hvit — 15 — —
1293. „ Metel, hvit — 5 — 30
1294. „ meteloides, hvit m. violett — 5 — 20
1295. „ Stramonium, *Vanlig Spikkubba* — 5 — 25

Alla 8 sorterna, 65 öre.

Dat. Stramon. är starkt giftig; blommorna hvita, riitt vackra. Alla dessa utm. prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter, som i blomster- och bladgrupper. Om man i Juni sår fröet och öfverv. plantorna vid + 12 à 15° C., så erhålles sköna, blomsterrika exempl. som följande vår kunna utplanteras på fritt land i fet jord, på varma, lugna ställen, der de fullkomligt utvecklas och ofta gifva moget frö.

Delphinium; *Riddarsporre*, (Ranunculaceæ.)

1296. „ cardiopetalum, (peregrinum) — 5 — 20
Låg garneringsväxt med vackra, blå blm. Öfriga Delphinium-arter, se modeblommor och fleråriga växter.

Dianthus; *Neghka*, (Caryophyllæ.)

1297. „ Gardnerianus — 8 — 50

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

En bekant och omtyckt prydnadsväxt. Öfriga sorter, se modeblm & fleråriga växter.

Dolichos, (Papilionaceæ.)

1298. „ atrosanguineus — 10 — 80
1299. „ giganteus (D. altissimus) — 10 — 80
1300. „ Lablab (Lablab vulgaris) — 5 — 30

Dracocephalum; *Draklufvud*, (Labiatae.)

1301. „ mexicanum, röd — 15 — —
1302. „ moldavicum album — 5 — 10
1303. „ „ coeruleum — 5 — 10

Småntäta växter med kransformigt sittande röda, hvita eller blå blommor.

Echinocystis, se slingerväxter.

Eleusine, se dekorationsgräs.

Echium; *Blåkunt* eller *Ornhufvud*, (Borraginæ.)

1304. „ creticum — 10 — —
Rätt vacker gruppväxt med rödvioletta blommor.

Erodium; *Kannäfva*, (Geraniaceæ.)

1305. „ gruinum — 8 — 35
Har intet värde som blomsterväxt, men är egendomlig derföre att fröhusens spröt vid fuktig väderlek böja sig ifrån hvarandra och då luften är torr åter sluta sig samman. Användas derföre till hygrometrar.

Erysimum, (Cruciferae.)

1306. „ arkansanum, ljusgul — 8 — 60
1307. „ Perowskianum mörkgul — 5 — 20
Omkring 1 fot hög, till kantblommor på grupper väl passande växter.

Eschscholzia, (Papaveraceæ.)

1308. „ californica, gul — 5 — 20
1309. „ „ fl. alba, hvitaktig — 5 — 20
1310. „ „ fl. rosea, rödaktig — 5 — 20
1311. „ crocea, mörk saffransgul — 5 — 20
1312. „ „ striata, strimmig — 5 — 20
1313. „ „ dentata sulphurea, gul — 5 — 20
1314. „ „ tenuifolia — 8 — 40

Alla 7 sorterna 35 öre.

Kända, vackra växter till grupper, rabatter och bredare infattningar. Föröka sig sjelfva genom utfallande frö.

Ethulia, (Vernoniaceæ.)

1315. „ corymbosa — 15 — —
2 à 3 fot hög med rosenfärgade blomhufvuden. Sås i Maj eller Juni; öfvervintras i temp. hus och utpl. om våren på kalljord.

Eucharidium, (Onagraceæ.)

1316. „ concinnum — 8 — 40
1317. „ „ grandiflorum — 8 — 40
1318. „ „ flora alba — 8 — 60

Vackra, med Clarkia nära beslägtade, 1 à 1½ fot hög grupp. beh. som Clarkia.

Eucnide, (Loasææ.)

1319. „ bartonioides — 20 — —
Utm. vacker med invändigt mörk- och utvändigt ljusgula blommor. Odlas helst i krukor under glas och begagnas till dekorationer.

Euphorbia; *Räfnjolk* eller *Vargmjolk*, (Euphorbiaceæ.)

1320. „ variegata (marginata) — 10 — 75
Utmäckt för sina rent hvita blomskärmar.

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Eutoca. (Hydrophylleæ.)		
1321. " multiflora, mångblommig	— 8	— 40
1322. " viscida, blå	— 5	— 20
1323. " " flora alba	— 5	— 30
1324. " Wrangeliana	— 5	— 20

Låga, med Nemophilan nära beslägtade, till infattningar tjenliga växter.

* Fenzlia. (Polemoniæ.)		
1325. " dianthoides (Gilia dianthiflora)	— 10	— —

2 å 2½ tum hög med rödaktiga, i svalget gula blmr; lämpar sig bäst för odling i kruka i kall dritbänk.

* Gaillardia. (Senecionideæ.)		
1326. " Drummondii (G. bicolor. var. Drummondii; G. picta) =	8	— 40
1327. " Drummondii coccinea	— 8	— 40
1328. " " Josephus	— 8	— 40
1329. " " marginata	— 8	— 40
1330. " " nana sulphurea	— 10	— —
1331. " " semiplena	— 20	— —

Alla 6 sorterna, 55 öre.

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter med sköna, i gult, rött och vitt varierande blommor.

* Gamolepis. (Senecionideæ.)		
1332. " Tagetes (G. annua)	— 8	— 60

6 å 8 tum hög infattningsväxt med gula blommor.

* Gaura. (Onagrarieæ.)		
1333. " Lindeheimerii	— 5	— 30

Prydlig, 3 å 4 fot hög grupp- och rabattv. med talrika, vita eller rödsvita blommor. Blommor första året, men kan öfvervintras under torr betäckning.

Gilia. (Polemoniææ.)		
1334. " achillaeifolia, blå	— 5	— 10
1335. " " fl. alba, hvit	— 5	— 10
1336. " " capitata, blå	— 5	— 10
1337. " " nivalis, hvit	— 5	— 10
1338. " " tricolor, trefärgad	— 5	— 10
1339. " " alba, hvit	— 5	— 10
1340. " " rubra, rödaktig	— 5	— 10

Alla 7 sorterna, 30 öre.

Smånätta, till garneringar tjenliga växter med talrika, små blommor. Fortplantas genom utfallande frö.

* Godetia. (Onagrarieæ.)		
1341. " Lindleyana, (Oenothera)	— 5	— 20
1342. " " fl. pl., dubbel	— 5	— 30
1343. " " purpurea (Oenoth. humilis)	— 5	— 30
1344. " " rosea alba (O. amoena)	— 5	— 20
1345. " " alba Tom Thumb	— 5	— 15
1346. " " rubicunda (Oenothera)	— 5	— 20
1347. " " The Bride	— 5	— 30

Alla 7 sorterna, 30 öre.

Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blmnä varieta i rosenrött och hvitt med mörkare fläckar. De flesta arterna fortplantas genom utfallande frö.

* Gomphrena; Klotamarant. (Amarantaceæ.)		
1348. " globosa, purpuröd	— 5	— 25
1349. " " carnea, köttfärgad	— 5	— 25
1350. " " alba, hvit	— 5	— 25

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1351. Gomphrena globosa varie-		
gata, brokig	— 5	— 25
1352. " Haagena (aurantiaca)	— 8	— 50

Kända och omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter på kall jord äro de äfven vackra, men böra ej utplnt. för än de blomma.

* Gramantes; Skriftblomster, (Crassulaceæ.)		
1353. " gentianoides (Crassula)	— 30	— —

1 å 2 tum hög, till infattning af mindre, starkt solbelysta grupper, passande växt med talrika, lysande röda blommor. Fordrar mager jord.

Gronovia, se slingerväxter.

Gypsophila; Gipsblomster, (Caryophylleæ.)		
--	--	--

1354. " elegans	— 5	— 10
1355. " " flore roseo	— 5	— 10
1356. " " muralis	— 5	— 30
1357. " " Saxifraga (Tunica; Dianthus)	— 5	— 30

Små, men mycket prydl. växter; lämpl. till kantbl. och särdeles vackra i buketter.

Helianthus; Solros eller Solrindare, (Senecionideæ.)		
---	--	--

1358. " annuus fl. pl., dubbel	— 5	— 20
1359. " " grandifl. plenissimus	— 8	— 60
1360. " " nanus, låg	— 8	— 50
1361. " " californicus fl. pl.	— 5	— 30

Förda mycken näring och böra ej planteras tillsammans med mindre växter, som deraf skulle kunna skadas.

* Helichrysum; Stråtblomster eller Evighetsblomster, (Senecionideæ.)		
---	--	--

1362. " brachyrhynchum	— 8	— 40
1363. " bracteatum (H. lucidum; Helichrysum) gul	— 5	— 25
1364. " " album, hvit	— 5	— 25
1365. " " nanum album, låg	— 10	— 80
1366. " " " luteum, låg, gul	— 10	— 80
1367. " " compositum (monstr.) album	— 10	— 80
1368. " " atroroseum, mörkröd	— 10	— 80
1369. " " atrosanguineum, mörk	— 30	— —
1370. " " Borussorum Rex, hvit	— 10	— 80
1371. " " brunneus, brun	— 10	— 80
1372. " " nanum atrococcineum	— 10	— 1
1373. " " minimum album	— 25	— —
1374. " " " aureum	— 25	— —
1375. " " " roseum	— 25	— —
1376. " " " rubrum	— 25	— —
1377. " " capitatum	— 8	— 40
1378. " " elegans (Morna elegans)	— 8	— 40

strictum, se Chrysocephalum.

Alla 15 sorterna rdr 2 —

10 vackra sorter " 1,30.

1379. " höga sorter, blandade	— 8	— 60
1380. " låga sorter, blandade	— 10	— 90

Förda soliga platser och en god lucker jord. Allesamman böra till de vackraste eternelle och böra odlas i hvarje trädgård. Isynnerhet äro varieteterna af H. comp. utmärkta. H. comp. minimum äro omkring 2 fot höga med talrika, små, klotförmiga, mycket dubbla blommor, som synnerligen egna sig till vinterbuketter.

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

* **Heliophila; Solvæn, (Cruciferae.)**

1381. " araboides — 10 1 —
 1382. " dissecta — 10 1 —
 Dessa växter öppna sina prydliga, blå blommor endast då de belysas af solen, hvarföre de böra planteras på soliga ställen. Odlas säkrast under glas i en kall driftbänk och utplamt. då de börja blomma.

Hibiscus; Ibisblomster, (Malvaceae.)

1383. " calisurus — 5 — 20
 Tacksamt blommande, 1½ fot hög rabattv.

* **Hummamania, (Papaveraceae.)**

1384. " fumarifolia — 12 1,50
 Egentl. tvåårig, men blommor första året, om fröet utsås t. ex. i Mars. Man kan äfven så senare, öfverv. pl. frostfritt och om våren utsätta dem på kalljord. Växten är 2 à 3 fot hög och har vackra, gula, tulpanlika blommor.

Iberis; Klippkrage, (Cruciferae)

1385. " amara, hvit, pr *fl.* 4 rdr — 5 — 8
 1386. " " grandiflora, storbl. — 5 — 10
 1387. " hesperidifolia, rent hvit. — 8 — 40
 1388. " odorata, hvit vålluktande. — 5 — 8
 pr *fl.* 4 rdr.
 1389. " pectinata nana alba, låg — 12 1,25
 1390. " umbellata, violett — 5 — 15
 pr *fl.* 7 rdr.
 1391. " " alba, hvit, pr *fl.* 5 rdr — 5 — 10
 1392. " " carnea, köttfärgad — 5 — 20
 1393. " " purpurea, purpurrod. — 5 — 15
 pr *fl.* 7 rdr.
 1394. " " Dunettii, mörk purp. — 5 — 15
 pr *fl.* 7 rdr.

Alla 10 sorterna 50 öre.

1395. " blandade, pr *fl.* 7 rdr — 5 — 15
 De här anförda Iberis är alla mycket vackra och tacksamma grupp- och infattningsväxter. Den 2 à 3 tum höga *I. pectinata* är i synnerhet lämplig till infattn. De röda, vita och violetta sorterna, blandade om hvarandra, bilda mycket vackra grupper. Föröka sig genom utfallande frö.

Impatiens; Balsamin, (Balsamineae.)

1396. " glanduligera; Fjättebalsamin — 10 1 —
 5 à 6 fot hög, mycket grenig rabattväxt. Ipomea, se modeblommor & slingeväxter.

* **Ipomopsis, (Polemoniaceae.)**

1397. " Beyrichiana. (Gilia B.) — 8 — 60
 1398. " coronopifolia. Gilia eller Ipom. picta; Cantua pin-natif; Polem. rubrum. — 8 — 60
 1399. " elegans (Gilia elegans) — 8 — 60
 1400. " " aurantiaca, gulogul. — 8 — 60
 1401. " " cupreata, kopparröd. — 8 — 60
 1402. " " lutea, gul — 8 — 45

Alla 6 sorterna 40 öre.

1403. " blandade sorter — 5 — 35
 Dessa utm. pryd. växter lyckas bäst, om de behandlas såsom tvååriga. Plantorna sättas i så fall i kruka och öfverv. i temp. växthus helt nära glasat. Vintertiden äro de mycket känsliga för fuktighet, isynnerhet, om sådan samlar sig på bladen, hvarför man vid vattning måste använda all möjlig försigtighet. Om våren utplanteras de på fritt land, men måste äfven der skyddas mot rå och fuktig väderlek.

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

* **Isotoma, (Lobeliaceae.)**

1404. " axillaris, (Lobelia senecioides). — 12 1,50
 Uppdrages i kruka i kall bänk. Blommor första året sparsamt, men andra året rikare; vackra hvita blommor.

Jonopsidium, (Crusiferae.)

1405. " acuale, (Cochlearia acuale) — 10 — 80
 1 à 2 tum hög, till infattning af mindre grupper mycket fördelaktig växt med talrika små, porslinshvita blommor.

* **Kaulfussia, (Asteroideae.)**

1406. " amelloides, blå — 8 — 40
 1407. " " rosea, violett — 8 — 40
 Infattningsväxter; 1 à 1½ fot höga.

Lagenaria, se slingerväxter.

Lasthenia, (Senecionideae.)

1408. " californica (glaberrima) — 5 — 30
 1 fot hög infattningsväxt m. gula blommor.

Lathyrus, se modeblommor & slingerv.

Lavatera; Poppelros, (Malvaceae.)

1409. " trimestris, röd — 5 — 10
 1410. " " fl. alba, hvit — 5 — 10
 1411. " " blandade — 5 — 10
 Allmänt kända, omtyckta, omkr. 3 fot höga växter m. stora ljusröda och hvita blmr.

* **Leptosiphon, (Polemoniaceae.)**

1412. " androsaceus, rödaktig — 5 — 25
 1413. " densiflorus, rosenröd — 5 — 20
 1414. " hybridus, fl. vackra färger — 8 — 60
 1415. " luteus, gul — 8 — 40
 1416. " " aureus, mörkgul — 8 — 40
 Nätta, tacksamt och länge blommande växter; användbara på rabatter och mindre grupper med god, men ej fet jord. *L. andros.* blifver 6 à 8, *luteus* 8 à 10 och *densiflorus* 10 à 12 tum hög.

Limnanthus; Sumpblomster, (Limnathaceae.)

1417. " Douglasii — 8 — 40
 Infattningsv. m. gula, rätt vackra blommor.

Linaria; Flugblomster, (Scrophularineae.)

1418. " bipartita (elegans; speciosa)
 blå-violett — 5 — 20
 1419. " " alba, hvit — 5 — 20
 1420. " " splendens, violett — 5 — 20
 1421. " Cymbalaria, Aarons skägg — 10 — —
 1422. " macroua (Antirrh. limif) — 5 — 25
 1423. " Perezii, gul. — 5 — 25
 1424. " triornithophora (lusitana) violett. — 8 — 70

Alla 7 sorterna 35 öre.

Med undantag af *L. Cymb.*, som är omtyckt till amplar och klippanlägg. samt *L. triornithoph.*, som är en 3 à 6 fot hög, förträffl. rabattväxt, äro dessa växter blott 8 à 12 tum höga och dessa ypperligt till gameringsblommor. De flesta förplanta sig genom utfallande frö.

Linum; Lin eller Hvir, (Lineae.)

1425. " grandiflorum, mörkröd — 8 — 40
 1426. " " roseum, rosenröd — 8 — 60
 1427. " luteum, gul — 8 — 60
 1428. " usitatissimum grandifl. blå — 5 — 20
 1429. " " album, hvit — 5 — 25
 Allesamma, men isynnerhet *L. grandifl.*, som är en af de aldrabästa sommarblmr, äro utmärkta prydnadsväxter för grupper.

	à Port. Ort.		
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	
Brokiga, vackra grupper erhållas om alla sorterna sammanblandas.			
Loasa (Cajophora) se slingerväxter.			
* Lobelia, (Lobeliaceæ.)			
1430.	"	Erinus , blå	5 — 50
1431.	"	" coelestina , blå m. hvitt	5 — 50
1432.	"	" compacta alba, hvit, låg	10 — 80
1433.	"	" erecta , blå med hvitt	12 1,20
1434.	"	" bicolor , blå med hvitt, låg	15 — —
1435.	"	" kermesina , röd, låg	15 — —
1436.	"	" grandifl. superba , blå	8 — 60
1437.	"	" hybrida , marg., blåhv.	10 — —
1438.	"	" Imperialis , mörkblå	10 — —
1439.	"	" Lindleyana , violett	8 — 50
1440.	"	" Paxtoniana , blå med hvitt, låg	8 — 60
1441.	"	" speciosa (Crystall-Palace), mörkblå	15 — —
1442.	"	" blandade	10 — 75
1443.	"	" heterophylla major	10 1 —
1444.	"	" ramosa	10 1 —
1445.	"	" fl. alba	10 — —
1446.	"	" fl. rosea	10 — —
1447.	"	" triquetra	10 — 80
17 sorter Lobelia rdr 1,50.			
12 " L. Erinus " 1,10.			
6 " vackra do " — 55.			
Varieteterna af <i>L. Erinus</i> äro utm. nätta, allm. omt. växter, som lämpa sig såväl till odl. i krukor och amplar, som till grupper, infattn. o. s. v. Om de öfverv. i temp. växthus eller boningsrum och följ. vår utplanteras, så blomma de betydligt tidigare än då de säas om våren. De 5 sistn. arterna odlas bäst i kruka; hafva stora blå eller hvita blommor. Kunnas äfven öfverv.			
Lotus Jacobæus, se krukväxter.			
" tetragonolobus , se Köksträdgårdsväxter; skidfrukter.			
* Lupinus; Vargböna eller Lupin; (Papilionaceæ.)			
1448.	"	" affinis , 1 fot hög, blå	5 — 15
1449.	"	" californicus , 1½ à 2 f., blå	5 — 15
1450.	"	" guatemalensis , 2 à 3 f., blå	5 — 10
1451.	"	" Hartwegii , 1½ à 2 fot, blåhvitt	5 — 1b
1452.	"	" fl. albo , 1½ à 2 f., hvit	5 — 15
1453.	"	" coelestino , 1½ à 2 fot, hög, blå	5 — 15
1454.	"	" roseo , 1½ à 2 f., röd	5 — 15
1455.	"	" hirsutissimus , 1 fot, blå	5 — 15
1456.	"	" hybridus albus coccineus , hvit och röd	5 — 15
1457.	"	" Dunnettii atroviolaceus , mörkviolett	5 — 10
1458.	"	" coccineus , rödaktig	5 — 20
1459.	"	" insignis , ljusröd	5 — 10
1460.	"	" nigrescens , mörk	5 — 10
1461.	"	" superbus , violett	5 — 10
1462.	"	" luteus , 2 à 3 fot, gul	5 — 8
1463.	"	" Menziesii , 2 fot, gul	5 — 30
1464.	"	" Moritzianus , 2 à 3 f., blå med hvitt och gult	5 — 15

	à Port. Ort.		
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	
1465.	"	Lupinus mutabilis , 4 à 6 f., hvit m. gult, väluktande	5 — 10
1466.	"	" mutabilis roseus splendens , lysande rosearöd	5 — 10
1467.	"	" Cruikshanskii , varierar i blått, viol o. purpur	5 — 10
1468.	"	" varicolor , mångfärgad	5 — 10
1469.	"	" nanus , 1 à 1½ fot, blå	5 — 20
1470.	"	" fl. albo , 1 à 1½ f., hvit	5 — 20
1471.	"	" pilosus , 2 à 3 fot, röd	5 — 10
1472.	"	" coeruleus , 2 à 3 f., blå	5 — 10
1473.	"	" albus , 2 à 8 fot, hvit	5 — 10
1474.	"	" pubescens , 1½ à 2 fot, violett med hvitt	5 — 10
1475.	"	" elegans	5 — 10
1476.	"	" subcarnosus (texensis) blå med hvitt	8 — 30
1477.	"	" venustus , violettblå	5 — 10
1478.	"	" tricolor , trefärgad	5 — 10
30 sorter rdr 1,40.			
12 " " — 55.			
1479.	"	" höga sorter , blandade	5 — 10
1480.	"	" medelhöga , blandade	5 — 20
1481.	"	" låga , blandade	5 — 15
Allesamman föräffliga grupp- och rabattväxter. <i>L. affinis</i> , <i>Menziesii</i> och <i>nanus</i> kunna användas som infattningar kring de högre sorterna, se äfven Ekonomiväxter.			
Lycopersium; <i>Kärleksäpple</i> , se kryddv.			
* Malcolmia, (Cruciferæ.)			
1482.	"	" bicolor	8 — 60
1483.	"	" incrassata	8 — 60
Dessa med Strandöfkojan (<i>Cheiranthus maritimus</i>) nära beslägtade växter blifva omkring 6 à 8 tum h. m. röda blmr. Trifves bäst i sandblandad något mager jord och passa till garneringar.			
* Malope; Praktmalva, (Malvaceæ.)			
1484.	"	" trifida grandiflora	5 — 10
1485.	"	" grandiflora fl. alba	5 — 10
1486.	"	" blandade	5 — 10
Vackra gruppväxter med stora, lysande, röda och hvita blommor.			
* Malva; Kattost, (Malvaceæ.)			
1487.	"	" erispa , 6 à 8 fot, krusbl.	5 — 10
1488.	"	" mauritanica , 6 à 8 f., röd	5 — 15
1489.	"	" miniata , 2 à 3 fot, röd.	8 — 40
1490.	"	" zebrina , (maur. zebrina) 4 à 5 fot, strimmig	5 — 20
Vackra rabattväxter.			
* Manulea; Handblomster, (Scrophulariaceæ.)			
1491.	"	" violacea	12 1,50
Plantorna öfvervintnas i tempererad växthus och utplant. om våren i god löfjord.			
* Martynia; Elefantnabel, (Personateæ.)			
1492.	"	" Craniolaria (Cr. annua)	15 — 50
1493.	"	" formosa (fragrans)	15 — 40
1494.	"	" lutea	15 — 40
1495.	"	" Proboscidea	15 — 40
Från 1½ till 3 à 4 fot höga, vackert blommande växter, som passa till dekorationer på blomsterbord etc. Fröet bör, innan det säas, uppjukas i varmt vatten eller försigtigt afflas, eljest gror det långt			

å Port. Ort.

Rmt Rd öre. Rd ö.

samt och osäkert. Plantorna vårdas i varm drifbänk tills de blomma.

Mathiola; Löfskja, (Cruciferæ.)1496. " *bicornis* 8 — 601497. " *tricuspidata* 30 — —

Hafva ytterst talrika, välluktande, men till utseendet obetydliga blmr, som framkomma till sent på hösten. Tjenliga till infattningar. Öfriga sorter, se Modeblommor.

Matricaria; Sättblomster, (Senecionideæ.)1498. " *capensis* 8 — 501499. " *alba plenissima* 25 — —1500. " *eximæa* 8 — 60

Omkring 1½ fot höga växter med en mängd hvita dubbla blommor. Mycket passande till grupper. Fortplanta sig ofta genom utfallande frö.

Maurandia, se slingerväxter.

Melothria, se slingerväxter.

*** Musembryanthemum; Isplanta, (Ficoideæ.)**1501. " *crystallinum*, vanlig 8 — 401502. " *pommeridianum*, gul 8 — 701503. " *tricolor*, trefärgad 8 — 701504. " *fl. alba*, hvit 8 — 70

Den förstn. användes äfven till spenat. M. tricol. är utmärkt vacker till infattningar och grupper. Blmarna äro stora, röda eller hvita och lysa på långt afstånd, men öppna sig blott då solen skiner, hvarföre de böra planteras på solrika platser.

*** Mimosa; Sensitiva, (Mimosææ.)**1505. " *putida* 10 — 80

En allmänt känd växt, hvars blad äro så känsliga att de vid ringaste beröring sluta sig tillsammans. Odla bäst i en halvvarm kast- eller drifbänk. Kan öfverlev. i böningsrum, men fordrar mycket ljus och bör vattnas försigtigt.

*** Mimulus; Muskusblomster eller Gychelblomster, (Scrophulariaceæ.)**1506. " *cardinalis* 10 1,251507. " *Fortunatus* 20 — —1508. " *grandiflorus*, storbl. 20 — —1509. " *cupreatus*, låg 30 — —1510. " *fl. pl.*, dubbelblommig 35 — —1511. " *tigrioides*, praktfull 40 — —1512. " *tigrinus* (pardinus) 35 — —1513. " *fl. pl.* 35 — —1514. " *luteus*, gul 15 — —1515. " *quinque vulneris maximus* 15 — —1516. " *rivularis* 15 — —1517. " *robustus punctatus* 20 — —1518. " *moschatus*, gul 20 — —

Alla 13 sorterna rdr 2,80.

10 vackra sorter 2 —

Varieteterna af M. cardin. blifva 2 å 3 fot höga med skarlakaröda blmr och äro förträffliga rabattv. M. cupreatus med dess variet. (och isynnerhet M. cupr. tigrioides) hafva utmärkta blmr och äro vackra grupp- eller infattningsväxter; likaså alla M. luteus. De bästa och vackraste variet. fortpl. bäst genom stickl. eller delning; de planteras i kruka och öfverv. frostrfritt. Om man tidigt på våren ompl. dem och ställer dem nära glaslet i ett temp. växthus, så

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

kan man redan i April hafva rika, vackert blommande exempl. af dessa raktväxter.

*** Mirabilis; Underblomster, (Nyctagineæ.)**" *jalappa*, se modeblommor.1519. " *longiflora* 8 — 401520. " *violacea* 8 — 40

2 å 4 fot höga rabattväxter med hvita och violetta blmr. Rötterna kunna om hösten upptagas och förvaras som dahlierötter.

Momordica, Springgurka, (Cucurbitaceæ.)1521. " *elaterium* (Ecbalium off.) — 8 — 40

Är ej vacker, men intressant därför att dess mogna frukter vid beröring öppna sig och våldsamt utkasta frö och saft. De öfriga sorterna finnas upptagna bland slingerväxter.

Nemesia, (Scrophulariaceæ.)1522. " *floribunda* 10 — 801523. " *versicolor* 10 — 801524. " *compacta alba* 10 — 801525. " *coerulea* 10 — 80

Dessa smånätta växter blifva 1 å 1½ fot höga. De fyra sistn. äro hybrider. Blmarna äro talrika och vackra, blå, hvita och violetta; användbara till grupper och som kantblmr. Kunna äfven odlas i kruka.

Nemophila; Kärleksblomster, (Hydrophyllææ.)1526. " *atomaria*, hvit med svarta punkter 5 — 101527. " *cramboides*, himmelsblå, med svarta punkter 5 — 101528. " *oculata*, himmelsblå med hvitt 5 — 101529. " *discoidalis*, nästan svart. — 5 — 101530. " *elegans*, brun m. hvitt — 5 — 201531. " *marmorata*, marmorf. — 5 — 101532. " *vittata*, svart m. hvitt — 5 — 201533. " *insignis*, blå, pr *fl.* 4 rdr — 5 — 81534. " *alba*, hvit, pr *fl.* 6 rdr — 5 — 101535. " *marginata*, blå med hvit rand 5 — 101536. " *maculata*, hvit med violett — 5 — 101537. " *grandiflora*, storbl. — 5 — 301538. " *purpurea*, mörkviolett — 5 — 10

Alla 13 sorterna 55 öre.

1539. " blandade, pr *fl.* 4 rdr — 5 — 8

Allmänt omtyckta till grupper och infattn. För att ständigt hafva blommande exempl. bör man så om hösten, i April och i slutet af Maj. Fortpl. sig ofta genom sjelfsäd. Öfverv. Pl. blomma, om de tidigt på våren omplanteras och ställas nära glaslet i temp. växthus redan i April och Maj.

Nicotiana, se bladväxter.

Nigella; Jungfrun i det gröna, (Ranunculaceæ.)1540. " *damascena* 5 — 101541. " *nana fl. pl.*, låg 5 — 101542. " *Fontanesiana* 5 — 201543. " *hispanica* 5 — 201544. " *alba* 5 — 301545. " *atropurpurea* 5 — 30

Alla 6 sorterna 25 öre.

å Port. Ort.

Rmf Rd ö. Rd ö.

Utmärkt vackra. N. dam. är omkr. 1 $\frac{1}{2}$ fot hög, de öfriga arterna lägre, passande till kantblommor. Allesamman vackra i buketter.

Nolana; Cymbalblomster, (Solanaceæ.)

1546. " atriplicifolia (grandiflora) — 5 — 30
1547. " paradoxa — 5 — 30
1548. " prostrata — 5 — 30
Låga, krypande, till kantblommor eller till bildande af grupper användbara växter, med någorlunda stora, rätt vackra blå blommor.

Nuttallia, se Callirhoë.

* **Nyctarine; Honungsblomster, (Scrophulariaceæ.)**

1549. " capensis — 20 — —
1550. " selaginoides — 8 — 70
Smånätta med vackra fint doftande blmr. Fordra varma, skyddade ställen på kalljord; odlas äfven i kruka.

* **Obeliscaria; Obeliskblomster, (Senecionideæ.)**

1551. " (Monodonta) pulcherrima — 5 — 30
Vacker med lysande gula och bruna blmr. Planteras i krukor, öfverv. i temp. växthus och utpl. följande vår på kalljord.

* **Ocymum; Basilika, (Labiatae.)**

1552. " Basilicum var. crispum — 8 — 70
1553. " melissodorum — 10 — 90
1554. " mexicanum — 15 — —
Odlas såväl i krukor som på fritt land, luftvudsakligen för deras utmärkta välukt.

Oenothera; Natljus, (Onagrarieæ.)

1555. * acaulis, hvit och purpur. — 10 1 —
1556. " bistorta Veitchiana, gul, lågväxt. — 8 — 50
1557. " Drummondii, 2 å 3 f., gul — 8 — 50
1558. " Lamarkiana, 4 å 5 f., gul — 5 — 30
1559. " longiflora, 2 å 3 fot, gul — 5 — 30
1560. " macrantha, storblommig. — 8 — 70
1561. " mollissima, 2 å 3 fot, gul — 10 — —
1562. " odorata, 2 å 3 fot, gul. — 5 — 25
1563. " Sellovii, 4 å 5 fot, gul. — 5 — 25
1564. " taraxacifolia, låg, storal., hvit med rosa — 10 1 —
1565. " tetraptera, krypande, hvit och purpurrd. — 8 — 40
" öfriga sorter, se Godetia.

Alla 11 sorterna 75 öre.

Dessa vackra växter förtjena mera uppmärksamhet än som vanligen skänkes dem. Lämpa sig förtr. till plantering på rabatter. O. acaulis, Drummondii, Lamarkiana, odorata, Sellovii & taraxacifol. äro två- och fleråriga, men blomma redan första året. De blifva störst och vackrast om de säas och behandlas som två-åriga. O. longifl., moll., odorata och Sellovii äro välluktande. Några sorter fortplanta sig genom själfsädd.

Onopordon, se bladväxter.

Orobis; Skogsärtu, (Papilionaceæ.)

1566. " atropurpureus, mörkröd — 8 — 40
1567. " Fischerii, mörkröd — 8 — 50
1 $\frac{1}{2}$ å 2 fot höga, prydliga växter.

* **Oxalis; Harklöfveer; Gökmat, (Oxalideæ.)**

å Port. Ort.

Rmf Rd ö. Rd ö.

1568. *Oxalis corniculatus* fol. purpureis, brunbladig — 12 1,20

1569. " rosea, rosenröd — 15 — —

1570. " *Valdiviana*, gul — 15 — —
Den förstn. är en af de bästa ettåriga infattningar., som genom sina mörka blad gör ett vackert afbrott mot den omg. gräs-mattan. O. rosea & Valdiv. ha utmärkt vackra blommor och kunna planteras i krukor för att användas till dekorationer i växthus och boningar.

Oxyura; Spetssvans, (Senecionideæ.)

1571. " chrysanthemoides — 8 — 50
1 fot hög med vackra, gulvita blmr; användbar till grupper, rabatter och bredare infattningar.

* **Palava, (Malvaceæ.)**

1572. " flexuosa — 10 — —
1 å 1 $\frac{1}{2}$ fot hög gruppväxt med talrika vackra, lilafärgade blommor.

Papaver; Vallmo, (Papaveraceæ.)

1573. " giganteum — 5 — 15
1574. " monstrosum — 5 — 20
" öfriga sorter, se modeblommor och fleråriga blomsterväxter.

Perilla, se bladväxter.

Petunia, se modeblommor.

* **Pentapetes; Skarlakamalva, (Byttneriaceæ.)**

1575. " phoenicea — 10 1 —
2 å 2 $\frac{1}{2}$ fot hög, mycket vacker växt med mörkt skarlakamröda blmr. Öfverv. i boningsrum eller varmt växthus och utplanteras följande sommar i god jord på varmt belägna platser.

Phacelia, (Hydrophylleæ.)

1576. " congesta, blå — 5 — 10
1 $\frac{1}{2}$ fot hög; tjenlig till grupper, rabatter eller bredare infattningar.

* **Phalacraea, (Eupatoriaceæ.)**

1577. " coelestina — 8 — 40
1578. " nana (Tom Tumb) — 8 — 60
1579. " *Wendlandii*, praktfull — 15 — —

Utmärkt vackra med blå blmr. Odlade i krukor och under sommaren några gånger omplant. och toppade, blomma de rikligen under höst- och de första vintermånaderna. Unga, öfverv. plantor kunna med fördel användas om våren till grupper; Ph. nana till infattningar. Kunna förökas genom sticklingar.

Phacelus, se slingerväxter.

Phlox, se modeblommor och fleråriga blomsterväxter.

Physalis; Judekörs, (Solanaceæ.)

1580. " Alkekengii — 5 — 30
1581. " edulis — 10 — 95
1582. " gigantea — 10 — 95
Utmärka sig genom sina om hösten särdeles vackra frukter, imeslutna i stora vackert orangefärgade hylsor.

Podolepis, (Senecionideæ.)

1583. " affinis — 5 — 20
1584. " chrysantha — 10 — 80
1585. " gracilis — 8 — 70
1586. " alba — 10 1 —
Vårdas i krukor under glas. I Juni kunna de utpl. på soliga ställen å kalljord. Al-

i Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

ska sol, men skadas lätt af långvarigt regn. Blommorna äro röda, gula eller hvita.

*** Polycolumna, (Senecionidea.)**1587. " *Stuartii* — 8 — 40

Immortell med hvita blommor.

Polygonum; Bohve, (Polygonæ.)1588. " *elegans*, ljusröd — 8 — 401589. " *orientale*, mörkröd — 5 — 201590. " *album*, hvit — 8 — 40

Vackra prydnadsv. för grupper och rabatter. Den förstn. kan öfverv. i krukor och utpl. om våren. P. orient. blifver 6 å 8 fot hög; kan med fördel användas äfven bland bladväxter, hvarest dess mörkröda blommor göra god effekt.

Portulaca, se modeblommor.

Reseda, (Resedaceæ.)1591. " *alba* — 5 — 251592. " *cristallina* — 5 — 301593. " *odorata*, pr *tl.* 4 rdr — 5 — 81594. " *arbores* — 5 — 301595. " *gigantea rubiginosa* — 50 — —1596. " *grandiflora*, pr *tl.* 6 rdr — 5 — 101597. " *perfecta (ameliorata)* — 5 — 301598. " *globosa* — 25 — —1599. " *pyramidalis* — 25 — —**Alla 9 sorterna rdr 1,10.**De tvenne förstn. sorterna sakna välkukt och odlas blott för bukettfabrikation. R. *arbores* låter lätt forma sig till smånätta träd. R. od. *gigant* märkt sort med stark och yfving växt samt stora, starkt välkuktande, rödbruna blmr. De tvenne sistnämnda sorterna äro äfven nya, utmärkta varieteter med stora, mera välkuktande blommor än de äldre sorterna.*** Rhodanthe; Rosenblomster, (Senecionidea.)**1600. " *atrosanguinea*, mörkröd — 25 — —1601. " *maculata*, fläckig — 12 1,251602. " *alba*, rent hvit — 20 — —1603. " *Manglesii*, rosenröd — 10 1 —1604. " *major* — 20 — —

Dessa sköna evighetsblomster blifva omkring 1 fot höga och böra, om de odlas på kalljord, skyddas mot fuktighet och kall väderlek.

Rynhocarpa, se slingerväxter.

Ricinus, se bladväxter.

Rumex, se bladväxter.

*** Sabbatia, (Gentianeæ.)**1605. " *campestris* — 25 — —

En liten mycket täck växt med talrika vackert rosenröda blommor; är tyvärr för bräcklig att odlas på kalljord. Trifves bäst under glas i kall driftbänk.

Salpiglossis, se modeblommor.

*** Salvia, (Labiatae.)**1606. " *coccinea*, skarlakauröd — 10 1 —1607. " *nana compacta*, låg — 10 1,201608. " *pumila*, liten — 10 1 —1609. " *superba (Pseudococcinea)* — 10 1,201610. " *splendens*, lysande — 10 1,201611. " *graciliflora*, rosenröd — 8 — 601612. " *Horminum* — 5 — 20

i Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

1613. *Salvia Roemeriana*, skarlakanf. — 15 — —**Alla 8 sorterna 70 öre.**S. *coccinea* med dess varieteter äro mycket vackra gruppväxter. De kunna öfverv. uti temp. växthus eller boningsrum och blomma, när de på våren utplanteras, mycket tacksamt. S. *graciliflora* är lågväxt, användes till infattningar. S. *Horminum* är utm. för sina i flera nyancer skiftande blomskärmar och kan, liksom S. *Roemeriana*, användas på grupper.**Sauvitalia, (Senecionidea.)**1614. " *procumbens*, gul — 8 — 601615. " *fl. pl.*, gul, dubbel — 10 — 80

Låga, krypande växter med talrika blommor. Särdeles passande till infattningar.

Saponaria; Sävört, (Caryophylleæ.)1616. " *multifl.*, hvit och röd — 5 — 201617. " *alba*, hvit — 5 — 201618. " *rosea*, rosenröd — 5 — 20

Begagnas till infattningar o. s. v.

*** Scabiosa; Ångvädd eller Enkeblomster, (Dipsaceæ.)**1619. " *atropurpurea (Asteroccephalus)* i flera färger — 5 — 201620. " *candidissima*, hvit — 5 — 301621. " *grandiflora (major)* i flera färger — 5 — 301622. " *miniata*, mönjeröd — 5 — 301623. " *nana*, låg — 5 — 201624. " *plena*, dubbel — 5 — 30**Alla 6 sorterna 25 öre.**

Mycket vackra blommor för grupper och buketter. Odlas äfven i kruka för dekoration af blomsterbord o. s. v.

Schizanthus; Sitsblomster eller Spaltblomster, (Scrophulariaceæ.)1625.* " *Grahamii*, lila, rosenröd. — 8 — 501626. " *grandifl. ocellatus*, storbl. — 5 — 301627. " *pinnatus*, hvit med lila — 5 — 201628. " *humilis*, låg — 5 — 201629. " *retusus*, carmin med gult — 8 — 60

2 å 4 fot höga, prydl. mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter. Den sistnämnda sorten odlas bäst i kruka under glas i kall driftbänk eller kast.

Schizopetalum; Spaltblad, (Cruciferae.)1630. " *Walkerii* — 8 — 60

1½ å 2 fot hög rabattv. m. grönhvita, välkuktande, morgon och afton öppna blmr.

Seyphanthus, se slingerväxter.

Scothanthus, se slingerväxter.

*** Sedum; Fetört eller Fetknoppar, (Crasulaceæ.)**1631. " *coeruleum azureum* — 25 — —

4 å 5 tum hög med blekblå blommor. Kan användas som infattning kring soligt belägna blomstergrupper.

Senecio, se modeblommor.

Sicyos, se slingerväxter.

Sicyosperma, se slingerväxter.

Silene, (Caryophylleæ.)1632. " *Armeria*, mörkröd, blekröd och hvit, 1 å 1½ f. — 5 — 201633. " *fl. albo*, hv. 1 å 1½ f. — 5 — 201634. " *fl. carneo*, blekröd, 1 å 1½ fot hög — 5 — 20

	å Port.	Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	
1635. <i>Silene Armeria fl. rubro</i> , röd, 1 à 1½ fot hög	—	5	— 30
1636. " <i>Atocion</i> , blekr., 8 à 10 tum	—	5	— 20
1637. " <i>Bergerii</i> , (<i>Regia</i>) carmo- sinröd, 2 à 5 fot hög	—	5	— 20
1638. " <i>compacta</i> , carmin, 1 à 2 f.	—	5	— 30
1639. " " <i>grandifl.</i> , storblommig carmosinröd	—	12	1,30
1640. " <i>orientalis</i> , röd, 2 à 2½ f.	—	10	— 75
1641. " <i>ornata</i> , brunröd, 1 à 1½ f.	—	10	— 75
1642. " <i>pendula</i> (<i>rosea græca</i> ; sca- brifolia) rosenröd, hän- gande, 8 à 12 tum	—	5	— 10
1643. " " <i>fl. alba</i> , hvit, 8 à 12 t.	—	5	— 10
1644. " " <i>ruberrima</i> , carm., blad och stjelkar brunr.	—	5	— 10
1645. " " " <i>fl. pl.</i> , omkr. 5 % af blmrna blifva dubbla	—	5	— 20
1646. " <i>procumbens</i> , röd, 6 à 8 t.	—	5	— 20
1647. " <i>Pseudo-Atocion</i> , ljuér., 1 f.	—	5	— 20
1648. " <i>reticulata</i> , carmosin, 2 f.	—	5	— 20
1649. " <i>rubella</i> , röd, 1½ à 2 fot	—	5	— 20
Alla 18 sorterna rdr 1 — 12 vackra sorter		—	60.

* **Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)**

1650. " <i>corniculatum</i>	—	10	1 —
1651. " <i>Gilo</i>	—	8	— 40
1652. " <i>heterogonum</i>	—	25	— —
1653. " <i>Lycopersicum racemi- gerum</i>	—	30	— —
1654. " <i>Melongena</i> ; (<i>Agplantan</i>)	—	5	— 10
1655. " " <i>fructo violaceo</i>	—	5	— 15

Alla 6 sorterna 75 öre.
Dessa växter utmärka sig för sina stora,
vackra frukter. Odlas i fet jord, antingen
i krukor eller på varma ställen å fritt land.

" öfriga sorter, se bladväxter.

Sorghum, se bladväxter.

* **Sphanogyne, (Senecionideæ.)**

1656. " <i>anthemoides</i> (<i>Aretotis cer- nua. pinnata & paradoxa</i>)	—	10	— 75
1657. " <i>speciosa</i>	—	8	— 50

Nätta växter med vackra, nankingula och
violettera blommor, men mycket spensliga
ömtåliga för regn, hvarföre man bör odla
några exemplar i krukor.

* **Spilanthus; Fläckblomster eller Husar-
knopp, (Senecionideæ.)**

1658. " <i>oleracea</i>	—	10	1 —
-----------------------------------	---	----	-----

Blommorna af denna växt lemna den mot
tandvärk begagnade paratincturen.

* **Sticte; Ormrot, (Plumbagineæ.)**

1659. " <i>Bonduellii</i> , gul	—	5	— 20
1660. " <i>Thouinii</i> , porslinsblå	—	5	— 20

Vackra växter, hvars afskurna och torkade
blommor kunna användas till vinterbukter,
kransar o. s. v.

Tagetes, se modeblommor.

Thumburgia, se slingerväxter.

	å Port.	Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	

* **Tithonia, (Senecionideæ.)**

1661. " <i>helianthiflora</i>	—	8	— 60
---	---	---	------

1662. " <i>tagetiflora</i>	—	8	— 60
--------------------------------------	---	---	------

6 à 8 fot höga växter med orangefärgad
blmr. Plantorna böra, eftersom de växa
flera gånger ompl. i större krukor, öfverv.
i temp. växthus och om sommaren utplan-
teras i god, fet jord på varma, lugna plat-
ser. Blifva om de väl behandlas, verk-
liga praktväxter.

Tolpis, se *Crepis*.

* **Trachymene, (Umbelliferaæ.)**

1663. " <i>coerulea</i> (<i>Didiscus coerule.</i>)	—	10	1,20
--	---	----	------

2 à 3 fot hög med blå blmr; odlas bäst un-
der glas i kruka; anv. till dekorationer.

Trifolium; Klöfver, (Leguminosæ.)

1664. " <i>incarnatum</i>	—	5	— 8
-------------------------------------	---	---	-----

1665. " <i>suaveolens</i>	—	8	— 50
-------------------------------------	---	---	------

Den förstnämnda användes till grupper,
den sistnämnda till bredare infattningar.

Trichosanthes, se gurkartade växter och
slingerväxter.

Tropæolum, se salladväxter och slingerv.

Tunica, se *Gypsophila Saxifraga*.

* **Verbena; Jernört, (Verbenaceæ.)**

1666. " <i>Aubletia</i>	—	8	— 40
-----------------------------------	---	---	------

1667. " " <i>Drummondii</i>	—	8	— 50
---------------------------------------	---	---	------

1668. " " <i>grandifl.</i> , storblommig	—	8	— 40
--	---	---	------

1669. " <i>pulchella</i>	—	8	— 50
------------------------------------	---	---	------

1670. " <i>pulcherrima</i>	—	8	— 50
--------------------------------------	---	---	------

1 à 3 fot höga växter med carmosinröda,
stundom hvitröda blmr. Om de säst tidigt,
blomma de första året. Man kan äfven sä
senare, sätta pl. i krukor, öfverv. dem i
temp. hus och följande vår utplantera dem
på kalljord. De blomma mycket rikt och
äro särdeles vackra till grupper.

* **Veronica; Avenpris, (Scrophulariaceæ.)**

1671. " <i>glauca</i>	—	10	— 75
---------------------------------	---	----	------

1672. " " <i>alba</i>	—	10	— 75
---------------------------------	---	----	------

1673. " <i>syriaca</i>	—	10	— 75
----------------------------------	---	----	------

3 à 4 tum höga, täcka växter med talrika,
blå och blåhvita blommor. Användas till
garnering af mindre grupper eller att plan-
tera i krukor.

Vicia; Vicka, (Papilionaceæ.)

1674. " <i>Gerrardii</i>	—	8	— 40
------------------------------------	---	---	------

1675. " <i>Pseudoracca</i>	—	5	— 30
--------------------------------------	---	---	------

1676. " <i>tricolor</i>	—	8	— 60
-----------------------------------	---	---	------

Passa till att bekläda mindre flätverk o. s. v.

Viola, se modeblommor & fleråriga blom-
sterväxter.

Viscaria; Tjärblomster, (Caryophylleæ.)

1677. " <i>oculata</i> , rosenröd	—	5	— 20
---	---	---	------

1678. " " <i>Buridgii</i> , hvit	—	5	— 30
--	---	---	------

1679. " " <i>Dunetti</i> , lilafärgad	—	5	— 30
---	---	---	------

1680. " " <i>elegans picta</i> , purpurf.	—	8	— 60
---	---	---	------

1681. " " <i>splendens</i> , lysande, röd	—	5	— 30
---	---	---	------

Utm. vackra, omkring 1 fot höga, med tal-
rika, ganska stora, lifigt färgade blmr.
Användas till grupper och infattningar.

* **Waitzia, (Senecionideæ.)**

1682. " <i>aurea</i>	—	35	— —
--------------------------------	---	----	-----

1683. " <i>corymbosa</i>	—	45	— —
------------------------------------	---	----	-----

Vackra, gula evighetsblomster. Odlas bäst
i kall driftbänk; fördrå sol och sandbl. jord.

* **Whitlavia; (Hydrophyllæ.)**

1684. " <i>grandiflora</i>	—	5	— 30
--------------------------------------	---	---	------

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

1685. *Whitlavia grandiflora* alba — 5 — 30
 1686. " *gloxinoides* — 5 — 30
 1 à 1½ fot höga med små, blå eller hvita, gloxinieflika blmr. Särdeles passande att odlas i krukor till dekorationer på blomsterbord o. s. v., eller att plant. i grupper.



Zinnia Haageana fl. pl.

å Port. Ort.

Rmt Rd ö. Rd ö.

Xeranthemum; Pappersblomster, (Cyanaræe.)

1687. " annum, röd och hvit — 5 — 25
 1688. " " album, hvit — 5 — 25
 1689. " " rubrum, röd — 5 — 25
 1690. " " compactum coeruleum — 8 — 50
 1691. " " plenissim. atrop. — 8 — 50
 Vackra immorteller till buketter, kransar o. s. v. Blommornas röda färg höjes om de doppas i vatten, uppblandadt med en ringa del svafvelsyra.

*** Zinnia, (Senecionidæe.)**

1692. " *tagetiflora* pl. — 20 — —
 1693. " *Haageana*, (mexicana) — 10 — —
 1694. " " fl. pl., utm. nyhet — 50 — —
 1695. " *pumila* fl. pl. — 10 1 —
 1696. " *tenuifolia* — 8 — 60
 1697. " *verticillata* — 10 1 —

Alla 6 sorterna 1 rdr.

De tvne första äro utm. passande till infattn.; hafva orangeröda eller gula blmr. *Zinnia Haageana* fl. pl. är en utmärkt nyhet, hvars blommor, som helt och hållet betäcka plantan, äro mycket dubbla, skönt orangegula. Ensamstående exemplar deraf bilda en vacker, tät, klotformig bukett. Se afbildningen här bredvid och på omslagets sista ytersida.

Då urvalet af sorterna anförts åt oss lemnas:

- 200 sorter Ettåriga växter. rdr 12 —
 100 " ettåriga växter. " 6 —
 50 " " växter. " 3 —
 25 " " " " 1,75 —
 12 " " utmärkta växter. " 1 —

VI. Frö till Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter:

De tvååriga blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, blifva störst och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör sås för tidigt. Det utsås antingen i krukor, drifvink eller på kall jord och när de flesta tvååriga växter hafva tjocka, djupt gående rötter, hvilka vanligtvis lida men af att blifva stympade, måste de planteras, innan plantorna blifvit stora, i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem tåla ej väta eller barfrost, hvarföre de deromt böra skyddas. För dem, som väl tycka om blommor i sina trädgårdar, men ej äro i tillfälle att derät egna mycket tid, äro de **mångåriga** blomsterväxterna af stort värde, emedan de i det närmaste sköta sig sjelfva. Dock böra de hvar tredje, fjerde eller femte år upptagas och omplanteras, hvarvid man genom delning fördelar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter föndra djup, lüs och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtäligare sorterna beträcka om vintern med torr tuf och granis, myrstaek, granbarr eller lyng, men ej förr än frosten nedträngt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsätas sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. *Jorden Umbelliferæ* och *Ranunculaceæ* m. fl. ligger ofta **ett helt år och ännu längre** i jorden innan det grov, hvarvid man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, eller antaga att fröet är odugligt.

Acanthus, se bladväxter.

Achillea; Rölleka, (Senecionidæe.)

1698. " *filipendula* (*tanacetifolia*)
 2 à 3 fot hög, gul. — 15 — —
 1699. " *millefolium rubrum*, 2 fot
 hög, röd — 10 — —
 1700. " *nobilis* (*hispanica*) 1 à 2
 fot hög, hvit, väluktande — 20 — —

1701. *Achillea tomentosa*, 8 à 10
 tum hög, guldgul — 15 — —

Rabattväxter, som starkt utbreda sig genom rotskott, hvarföre man hvarje år bör med en spade afsticka och bortrensa det öfverflödiga.

Aconitum; Stormhatt, Jungfru Mariæ sko eller Blåskar, (Ranunculaceæ.)

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.	
	Rmt	Rd	ö.	Rmt	Rd	ö.
1702.	Aconitum	Cammarum	(Kusnezowii) 3 à 4 f. h. ljusblå	blå blmr och till buketter passande grönt		
1703.	"	Cammarum	album, 3 à 4 fot hög, hvit	Betäckas mot sträng köld.		
1704.	"	Lycocotum,	2 à 4 fot hög, ljusgul	Anchusa; Oxtunga, (Boraginæ.)		
1705.	"	Napellus,	3 fot hög, blå	1727.†) italica (paniculata) 4 à 6 fot hög, blå		
1706.	"	pallidum,	hvitgul	1728. " sempervirens, 1 à 1½ f. h. — 5 — 30		
			Allm. kända blommor till pl. på rabatter eller i kanten af buskpartier. Fröet ligger ofta öfver ett år i jorden innan det groor.	Egna sig förtr. till rabatter. Blomma mycket rikt med blå blmr till sent på hösten.		
	Actæa;	Paddbär	eller Christoffersört, (Ranunculaceæ.)	Anemone; Sippa eller Anemon, (Ranunculaceæ.)		
1707.	"	spicata,	1 fot hög, hvit	1729. " alba, hvit		
1708.	"	latifolia,	2 fot hög, blå	1730. " albana, violett		
1709.	"	stylosa,	2 à 4 f. h. ljusblå	1731. " coronaria, iskönaste färger		
			Vackra rabattväxter med hängande, klocklika blommor.	1732. " japonica (Atragene jap.) rödaktig		
	Adonis; Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ.)			1733. " " alba (Honarine Jobert) hvit, vacker		
1710.	"	vernalis,	6 tum h., guldgul	1734. " narcissiflora, hvit		
			Särdeles vacker. Blommor tidigt på våren. Fröet groor långsamt.	1735. " Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) Gökskälla		
	Aethionema, (Crucifera.)			1736. " sylvestris, hvit		
1711.	"	persica,	rosenröd	Alla 8 sorterna rdr 1,25.		
			Särdeles vacker infattningsväxt.	Allesamman tidigt bl. rabattväxter. A. albana är vacker till infattn. och blommor i Maj; äfven A. alba och sylv. kunna användas till bredare infattn. Rotknärlarna af A. coronaria böra förvaras torra öfver vintern och utplanteras om våren, sedan de fått svälla i vatten.	Anthericum; Sandtåja, (Asphodoleæ.)	
	Agrostemma; Åkerkrans eller Klätt, (Caryophylleæ)			1737. " Liliago (Phalangium)		
1712.†)	"	coronaria,	Studentnejlika	1738. " Liliastrum (Czackia)		
1713.†)	"	fl. alba,	hvit	1739. " ramosum (Phalangium)		
1714.†)	"	bicolor,	tvåfärgad	1½ à 2 fot höga rabattv. som blomma i Maj och Juni med hvita, vackra blommor.		
1715.†)	"	carminea splendens,	lysande carminröd	Antirrhinum; Lejongap, (Scrophulariaceæ.)		
1716.†)	"	Flos Jovis,	Jupitersblomster, 1½ f. h., röd	1740. " Azarina, (Orontium; Azarina procumbens)		
			Präktiga grupp- och rabattv. Den förstn. bör skyddas mot barfrost och fukt.	1741.†) multiflorum		
	Allium; Lök, (Asphodoleæ.)			Den förstn. har bruna blommor och är särdeles passande till amplar och klipparläggningar. Blommor i Juni och Juli.	Apocynum; Flugfälla, (Apocynæ.)	
1717.	"	magicum,	Trollök, hvit	1742. " androsæmifolium		
1718.	"	Moly,	1 fot hög, guldgul	De små blommorna hafva retliga ståndare hvilka sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja hemta honning ur blomman. Trives i god trädgårdsjord och fortplantar sig ofta genom rotskott.	Aquilegia; Aketeja, (Ranunculaceæ.)	
1719.	"	narcissæeflorum,	hvit	1743. " alpina		
1720.	"	Victoralis,	Ormlök, 1 fot hög, grön eller hvitgrön	1744. " arctica		
			Althea; Stockros, (Malvææ.)	1745. " atropurpurea, mörk		
1721.	"	ficifolia,	Guldmatva	1746. " californica		
			5 à 6 fot hög rabattväxt. Öfriga sorter, se modeblommor och ettåriga växter.	1747. " canadensis, gul och röd		
	Alyssum; Gråddära eller Stenört, (Crucifera.)			1748. " " elatior, hög		
1722.	"	argenteum,	2 à 3 fot hög, silfverhvit	1749. " " rosea gigantea		
1723.†)	"	Benthamii,	1 fot h., hvit	1750. " coelestina		
1724.	"	Wierbeckii,	1 fot h., gul	1751. " formosa fl. pl., dubbel		
			Den förstn. bör öfverv. frostfritt och om våren utpl. A. Benth. egnar sig till infattn. och kan behandlas som ettårig; den sistnämnda är en vacker rabattväxt.	1752. " " rosea pl., rosenfärgad		
	Ammobium, se ettåriga blommor.			1753. " " rubra pl., röd		
	Amsonia, (Apocynæ.)			1754. " " coelestina, blå		
1725.	"	angustifolia	(Tabernemontana)	1755. " glandulosa, blåhvit, storblommig		
1726.	"	salicifolia	1 à 2 fot höga rabattv. med prydliga, ljus	1756. " hybrida fl. pl.		

	å Port. Ort.		å Port. Ort.	
	Rmt Rd ö.	Rd ö.	Rmt Rd ö.	Rd ö.
1757. <i>Aquilegia hybrida lucida</i>	—	15	—	—
1758. „ <i>jucunda</i> , blå och hvit	—	15	—	—
1759. „ <i>leptoceros</i> , blå med gult	—	10	—	95
1760. „ <i>lutea</i> , gulaktig	—	10	—	—
1761. „ <i>pubiflora</i> , blå eller hvit	—	10	—	—
1762. „ <i>Skinnerii</i> , gul med rödt	—	20	—	—
1763. „ „ <i>cupreata</i>	—	20	—	—
1764. „ <i>sibirica</i> , blå eller hvit	—	10	1	—
1765. „ „ <i>compacta violaceae pl.</i> rödviollett, dubbel	—	20	—	—
1766. „ „ <i>fl. pl.</i> , dubbel	—	15	—	—
1767. „ <i>speciosa</i>	—	10	—	—
1768. „ <i>spectabilis</i> , mörkblå med gult och grönt	—	20	—	—
1769. „ <i>Vervæneana</i> , blom. obet., men bladen brokiga, utm.	—	15	—	—
1770. „ <i>viridissima</i>	—	15	—	—
1771. „ <i>viscosa</i>	—	10	—	—
1772. „ <i>Wittmanniana unicolor</i> , blå	—	10	—	80
1773. „ „ <i>carminea pl.</i> , röd, dubb.	—	25	—	—
1774. „ „ <i>cærulea corolla alba</i> , blå med hvitt	—	30	—	—
1775. „ <i>vulgaris</i> , i flera färger	—	5	—	20
1776. „ „ <i>caryophylloides pl.</i> , neglikartad	—	10	—	85
1777. „ „ <i>Durandii pl.</i> i fl. färg.	—	10	—	85
1778. „ „ <i>fl. pl.</i> i flera färger	—	5	—	30
1779. „ „ <i>plenissima</i> , i flera färg.	—	15	—	—
1780. „ „ <i>stellata alba pl.</i> , hvit, vacker	—	15	—	—
1781. „ „ „ <i>carminea pl.</i> , röd	—	15	—	—
1782. „ „ „ <i>fl. pl.</i> , stjernlik, i flera färger	—	10	—	80
1783. „ „ <i>tricolor fl. pl.</i>	—	12	—	—
Alla 40 sorterna rdr	5	—	—	—
15 vackra sorter „	3,25	—	—	—
8 „ „ „	1,45	—	—	—
Dessa utmärkt vackra, 1, 2 å 2½ fot höga, i Juni blommande grupp- och rabattväxter böra ej saknas i någon trädgård. Alla arterna med undantag af <i>A. canadensis</i> & <i>Skinnerii</i> , som behöva en tunn granis- betäckning mot barfrost, äro mycket här- diga och tåla de strängaste vintrar.				
Arabis; Gåsvört eller Gås, (Cruciferæ.)				
1784. „ <i>albida</i> , hvit	—	8	—	40
1785. „ <i>blepharophylla</i> , röd	—	35	—	—
Blomma redan i April eller Maj och passa till bredare infattn. Mycket eftersökta af bien.				
Aralia, se bladväxter.				
Armeria; Gräsneglika eller Trift, (Plum- baginææ.)				
1786. „ <i>cephalotes</i> (<i>A. formosa</i> ; latifol.; <i>Statice cephal.</i> ; <i>formosa</i> ; <i>Pseudo-Armeria</i>) 2 fot hög, rosenröd	—	20	—	—
1787. „ <i>dianthoides</i> , 1 f. h., ljusröd	—	8	—	50
1788. „ <i>maritima; Engelskt gräs</i> , låg, ljusröd	—	10	1	—
1789. „ „ <i>alba</i> , hvit	—	25	—	—
1790. „ <i>pinifolia</i> , 1 f. hög, ljusröd	—	10	1	—
1791. „ <i>plantaginea</i> , ljusröd	—	10	1	—
Alla 6 sorterna 75 öre.				
Den förstn. är en verklig praktblma, som dock ej tål våra vintrar, utan bör öfverv. frostfritt och om våren utpl. <i>A. maritima</i> är mycket omtyckt till infattningar och användes äfven till grupper. De öfriga äro vackra rabattväxter.				
Artemisia, se bladväxter.				
Asclepias; Svalrot, (Asclepiadææ.)				
1792. „ <i>Douglasii (speciosa)</i> 1½ f. h., hvit m. rödt och grönt	—	12	—	—
1793. „ <i>incarnata</i> , 3 å 4 fot, röd	—	10	—	80
1794. „ <i>syriaca</i> , 4 å 5 fot, ljusröd	—	12	—	—
Vackra rabattv. Den förstn. bör betäckas om vintern eller förvaras inne. <i>A. syriaca</i> sprider sig mycket genom rotskott; bör derföre helst planteras så att den ej ska- dar spådere växter.				
Asphodelus; Afodill, (Asphodelææ.)				
1795. „ <i>albus</i> , hvit	—	12	—	—
1796. „ <i>luteus</i> , gul	—	10	1	—
Praktfulla rabattv. med knippevis hängan- de blommor. Betäckas mot sträng frost.				
Aster; Stjernblomster eller Aster, (Aste- roidææ.)				
1797. „ <i>alpinus</i> , 4 å 6 tum h., blå	—	15	—	—
1798. „ <i>Amellus</i> , 2 å 3 fot, blå	—	20	—	—
1799. „ <i>Novæ Angliææ</i> , 6 å 10 fot, purpurviollett med gult	—	10	—	—
1800. „ <i>spectabilis (elegans; spe- ciosus)</i> 2 å 3 fot hög, blå	—	12	—	—
Den förstn. blommor redan i Maj och Juni; är en af de vackraste fleråriga infattningsv. De öfriga sorterna blomma till långt in på hösten; äro mycket vackra på rabatter eller i kanten af buskpartier.				
Astragalus; Kloärter, (Leguminosææ.)				
1801. „ <i>galegiformis</i> , 5 å 8 fot.	—	5	—	20
Vacker rabattv.; blommor i Juni och Juli.				
Astrantia; Stjernfloka, (Umbelliferææ.)				
1802. „ <i>helleborifolia</i>	—	15	—	—
1803. „ <i>major</i>	—	8	—	70
1 å 2 fot höga rabattväxter med fina, vackra blommor i Juni och Juli.				
Aubrietia, (Cruciferææ.)				
1804. „ <i>deltoidæa (Alyssum; For- setia)</i>	—	15	—	—
1805. „ <i>græca</i> , storblommig	—	15	—	—
Låga; blomma i April, Maj & Juni; passa till infattn. och att plantera på stenpartier.				
Balsamita, se bladväxter.				
Baptisia, (Papilionosæææ.)				
1806. „ <i>australis</i> , blå	—	10	—	75
1807. „ <i>leucantha</i> , hvit	—	12	1,30	—
2 å 3 fot höga rabattväxter med vackra blad och blommor.				
Barbarea, se bladväxter.				
Bellis; Tusenskön, (Asteroidææ.)				
1808. „ <i>perennis</i>	—	35	8	—
Fröt, samladt af de bästa dubbla sorter lemnar omkring 50 % utmärkta blommor.				
Betonica, (Labiataææ.)				
1809. „ <i>grandiflora</i> , 1½ fot, röd	—	20	—	—
Rabattv. med stora blmr i Juli och Aug.				
Bocconia, se bladväxter.				
Bryonia, se slingerväxter.				
Buphtalmum; Oxögä (Asteroidæææ.)				
„ <i>cordifol.</i> (<i>Teleckia</i>) se bladv.				
1810. „ <i>salicifolium</i> , 1 å 2 fot, gul	—	10	—	80

- à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
- Vacker, i Augusti och September blommande rabattväxter.
- Calamintha; Hartmanjan, (Labiatae.)**
1811. " grandifl. (Melissa; Thymus) — 10 — —
1 fot hög rabattv. med långa, vackra, purpuröda blmr i Juli och Aug. Betäckas.
- Campanula; Klockblomster, (Campanulaceae.)**
1812. " alliarifolia (lamifolia) 2
fot hög, hvit — 12 — —
- 1813.† " americana (acuminata; asteroides obliqua) 2 à 5
fot hög, blå; betäckes. — 15 — —
1814. " carpathica, 1 fot hög, blå — 8 — 60
1815. " " alba, 1 fot hög, hvit — 10 — —
- 1816.† " eximea, 1½ fot, violblå — 10 1 —
1817. " grandis, 2 à 3 f., ljusblå — 15 — —
1818. " " fl. alba, 2 à 3 f., hvit — 12 — —
1819. " gummifera (betonicifol.; sarmatica) 2 fot, ljusblå — 12 1,30
1820. " lactiflora, 2 à 3 fot hög, blåhvit — 10 1 —
1821. " latifolia, 3 à 4 f. h., blå, violett eller hvit — 15 — —
1822. " Medium; Marielocka, 2 à 3 f., ljusblå eller hvit — 5 — 30
1823. " " fl. alba, hvit — 5 — 30
- 1824.† " " " pl., dubb. hvit — 15 — —
- 1825.† " " " cœrulea pl., dubbel blå — 15 — —
1826. " nobilis, 1½ à 2 fot hög, purpuröd, vacker — 15 — —
1827. " persicifolia, 2 à 3 fot hög, vacker, blå — 12 1,35
1828. " " alba, 2 à 3 fot, hvit — 15 — —
1829. " pyramidalis, 6 à 8 f., blå — 8 — 10
1830. " " alba, 6 à 8 fot, hvit — 10 1 —
1831. " rhomboidea, 1 fot h., blå — 12 — —
1832. " " fl. pl., dubbel, blå — 25 — —
1833. " " soldanelliflora pl., 1 f. — 35 — —
1834. " Trachelium (urticæfol.) 2 à 3 fot hög, violblå — 8 — 70
- Alla 23 sorterna rdr 2,75.
6 vackra sorter " 1 —
- Alla dessa i Juni, Juli & Aug. blommande växter, äro särdeles vackra på rabatter. Till infattm. af större grupper äro C. carpat. rhomb. med dess varieteter & C. rotundif. väl passande. C. medium äro praktfulla på grupper; kunna äfven med fördel odlas i krukor för dekorationer. C. pyram. är, om den väl behandlas, en af våra bättre praktväxter och borde användas mera än som sker. Om den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör den i mån af behof ompl. i större kärl. Tycker om lös och fet jord, mycket vatten, emellanåt gödselvattnen, under sommaren en öppen plats i det fria orh om vintern en frostfri, ej för fuktig lokal. Andra sorter, se ettåriga blomsterväxter.
- Catananche; Kasselblomster, (Cichoraceae)**
1835. " cœrulea, 3 fot hög, blå — 5 — 30
1836. " bicolor, 3 f. h., tvåfärg. — 5 — 30
Prydliga rabatt- och krukv., som blomma i Juli och Aug. Säkkrast är att odla några st. i krukor, öfverv. dem frostfritt och om

- à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
- våren utplantera dem. På fritt land böra de betäckas väl öfver vintern.
- Cedronella; Cedronell, (Labiatae.)**
1837. " cana, 3 fot hög, röd — 10 — —
Vacker rabattväxt som blomma i Juli. Bladen innehålla en eterisk olja och sprida, om de gnuggas, en svag, aromatisk välukt.
- Centaurea; Klint, (Cynareae.)**
1838. " dealbata, 1½ fot, röd. — 25 — —
1839. " macrocephala, 1 à 3 f., gul — 10 — —
1840. " montana, 1½ fot hög, himmelsblå — 10 — —
Vackra, i Juli & Aug. blommande rabattv. äro bladväxter.
- Chelone; Sköldblomster, (Scrophulariaceae)**
1841. " barbata, 2 à 3 fot, röd — 8 — 55
1842. " " Toreyii, 3 à 4 f., skarl. — 12 1,25
Vackra, i Aug. & Sept. blommande rabattv. Böra väl betäckas om vintern, eller öfvervinttras i en frostfri lokal.
- Clematis, se slingerväxter.
- Colchicum; Tidlösa eller Nakna Jungfrun, (Melanthaceae.)**
1843. " autumnale, rosenröd — 5 — 25
Bildar stora rotknöl och, om våren, stora, breda blad, som vissna om sommaren. Mot hösten framkomma de vackra, krokuslika blommorna. Fröet grov ojämt och långsamt.
- Commelina, se ettåriga blomsterväxter.
- Convallaria; Liljekonvalje, (Smilacineae)**
1844. " bifolia (Majanthem. bif.)
Ekoorebär — 15 — —
1845. " japonica, 1 à 2 fot hög — 5 — 30
1846. " majalis — 8 — 50
1847. " " major, stor — 15 1,75
1848. " " rosea, rosenröd — 30 — —
1849. " " Polygonatum, 2 f. hög — 5 — 30
C. bifol. & maj, äro mycket vackra till infattningar af ormbunkgrupper. C. japon. och polyg. planteras på rabatter och i kanterna af buskpartier.
- Coreopsis, (Senecionideae.)**
1850. " (Calliopsis) Atkinsonii, 3 à 4 fot h., gul med brunt — 5 — 30
1851. " grandifl., 2 à 3 fot, gul — 10 — —
1852. " lanceolata (Chrysomela)
3 à 4 fot hög, gul — 8 — 50
Präktiga rabattväxter, som blomma från Juli till sent på hösten.
- Crambe; Strandkål, (Cruciferae.)**
1853. " maritima — 5 — 10
Bildar vackra grupper på gräsmattor; se köksväxter, rubriken Sparrisväxter.
- Crusianella; Korsblad, (Rubiaceae.)**
1854. " stylosa, rosenröd — 5 — 30
Endast några tum hög infattningsväxt med frisk, fin grönska och mycket prydliga blmr, hvilka, såväl som bladen, är användbara i buketter.
- Cynoglossum; Hundtunga eller Munklöss, (Boraginæae.)**
- 1855.† " coelestinum, 2 fot hög — 5 — 30
- 1856.† " glochidiatum, 3 fot hög. — 8 — 50
Rabattväxt med himmelsblå blommor från Juni till hösten.
- Dahlia, se Georgina.

	à Fort.	Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
Delphinium; Riddarsporre, (Ranunculaceae.)			
1857.	"	bicolor, 8 à 10 tum h., blå	— 8 — 70
1858.	"	chinensis, 1 f. h., fl. färger	— 5 — 30
1859.	"	" album grandifl., 1 fot	— 8 — 50
1860.	"	" pumilum, låg, fl. färger	— 5 — 30
1861.	"	" " album, låg, hvit.	— 8 — 50
1862.	"	" " atrocœruleum, mörk	— 8 — 50
1863.	"	" elatum, 4 à 5 fot, blå	— 8 — 40
1864.	"	" formosum, 2 f. h., mörkblå	— 8 — 50
1865.	"	" coelestinum, 2 fot	
		hög, ljusblå	— 20 — —
1866.	"	" album, coeruleum,	
		porlinsblå	— 25 — —
1867.	"	hybridum, 2 à 5 fot,	
		många olika nyanser	— 10 — 75
1868.	"	" cheiranthiflorum, dub-	
		bel, utmärkt	— 35 — —
1869.	"	" fl. pl., dubb., fl. färger	— 35 — —
1870.	"	" Dagobert	— 20 — —
1871.	"	" Gerard Leigh	— 20 — —
1872.	"	" Herman Stenger, dubb.	— 20 — —
1873.	"	" Nancyanum, dubbel.	— 20 — —
1874.	"	" hyacinthiflorum, dub-	
		bel, flera färger	— 30 — —
1875.	"	" Luigi Orloff, dubb., blå	— 10 — 75
1876.	"	" speciosum, 5 à 7 fot, blå	— 15 — —
		Alla 20 sorterna rdr 2,85.	
		10 vackra sorter " 1,75.	
		Allesamman höra till de vackraste grupper och rabattv. D. chin. kunna alla behandlas som ettåriga, men blifva då ej så kraftfulla och vackra, som då plant. öfverv. Af D. formos. och dess variet. fås praktfulla grupper och de dubbla formerna äro förträffliga till odling i krukor. Fröet groor ofta långsamt.	
Desmodium. (Leguminosae.)			
1877.	"	canadense (Hedysarum sca-	
		brum) 2 à 3 fot, röd.	— 15 — —
1878.	"	paniculatum, 2 à 3 fot	
		hög, röd	— 15 — —
		Vackra rabattväxter med prydliga blommor i Juli och Augusti.	
Dianthus; Neglika, (Caryophylleae.)			
1879.	"	arenarius, Sandnegl., röd	— 12 1,50
1880.	"	atrococcineus, 1 fot hög,	
		skarlakänfärgad	— 8 — 50
1881.	"	eruentus, 1 à 2 f., blodröd	— 15 — —
1882.	"	deltoides; Ångsneglika,	
		låg, röd	— 8 — 50
1883.	"	" albus, låg, hvit	— 8 — 50
1884.	"	" dentosus, 1 fot hög, röd	— 10 — —
1885.	"	plumarius; Ejäderneglika,	
		8 à 10 tum hög	— 5 — 30
1886.	"	" fl. pl., dubbel	— 30 — —
1887.	"	" nanus fl. pl., låg, dubb.	— 40 — —
1888.	"	" sanguineus, blodröd	— 8 — 50
1889.	"	" superbus, 2 f., hvit & röd	— 10 — 85
1890.	"	" grandifl., storblommig	— 10 — 85
		Alla 12 sorterna rdr 1,50.	
		Utmärkta, på flerfaldiga sätt, i rabatter, krukor, grupper o. s. v. användbara prydnadsväxter. Till infattn. äro D. deltoideus	

	à Fort.	Ort.	
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.
& plumarius, symnerligen den låga formen, utmärkt väl passande. D. barbatus, caryophyllus och chinensis finnas upptagna bland modeblommorna.			
Diclythra; Blomsterlyra, (Fumariaceae.)			
1891.	"	spectabilis	— 25 — —
		Känd och omtyckt prydnadsväxt för såväl fritt land, som för krukor. Fröet groor långsamt.	
Dictamnus; Diptam, (Rutaceae.)			
1892.	"	augustifol., 2 f., purpurföd	— 25 — —
1893.	"	Fraxinella (albus var. ru-	
		ber) 1 à 3 fot hög, röd	— 15 — —
1894.	"	" alba (D. albus), hvit	— 15 — —
		Praktfulla, 1 à 3 fot höga, starkt luktande rabattv. med vackra blmr i Juni och Juli.	
Digitalis; Fingerborgsblomster, (Scrophulariaceae.)			
1895.†	"	Buxbaumii, 6 à 7 fot hög,	
		hvitgul	— 8 — 60
1896.	"	ferruginea, 4 à 6 f., gul-	
		aktig med rostbrunt	— 12 1,50
1897.	"	" gigantea, stor	— 8 — 70
1898.	"	grandiflora (ambigua) 2	
		fot hög, blekgul	— 8 — 60
1899.†	"	lanata, 2 f., hvit m. brunt	— 8 — 50
1900.†	"	purpurea, 2 à 3 f., rödf.	— 5 — 20
1901.†	"	" alba, 2 fot, hvit	— 5 — 30
1902.†	"	" gloxinæfl., praktf. var.	— 8 — 60
1903.†	"	" maculata Iveryana,	
		utmärkt, fläckig !	— 25 — —
		Alla 9 sorterna 75 öre.	
		Präktiga, i Juni och Juli blommande rabattväxter. Till grupper passa bäst D. purp. med dess varieteter.	
Dodecatheon; Gudsgäfvä eller Gudsblomster, (Primulaceae.)			
1904.	"	integrifolium, 1 f., mörkr.	— 30 — —
1905.	"	Meadia, 1 fot, lilafärgad	— 15 — —
		Utm. vackra, i Maj och Juni blommande växter för fritt land eller krukor. På kalljord betäckas de under vintern.	
Doronicum; Gemsrot, (Senecionideae.)			
1906.	"	Columnæ (cordifolia) 2 fot	
		hög, gul	— 10 — —
1907.	"	plantagineum, 1 fot, gul	— 10 — —
		Rabattväxter, som förtjena att odlas för sin tidiga blomstring.	
Dracocephalum; Drakhufvud, (Labiatae.)			
1908.	"	altaïense, blå	— 8 — 50
1909.	"	argunense, blå	— 10 — 80
1910.	"	austriacum, mörkblå	— 8 — 50
1911.	"	canescens, blå	— 5 — 20
1912.	"	peregrinum, blå	— 8 — 60
1913.	"	" grandifl., storblommig	— 15 — —
1914.	"	Ruyschianum, blå	— 10 — —
1915.	"	virginianum (Phystostegia)	— 15 — —
		Alla 8 sorterna 70 öre.	
		1 à 2 fot höga, från Juni till i Augusti blommande vackra rabattväxter.	
Echinacea, (Senecionideae.)			
1916.	"	angustifolia	— 20 — —
1917.	"	purpurea	— 20 — —
		Vackra rabattväxter med gula blommor i Augusti och September.	

- | | à Port. | Ort. | | à Port. | Ort. |
|--|---------|--|-------|---------|-------|
| | Rmt | Rd ö. | Rd ö. | Rmt | Rd ö. |
| Echinops; Klottistel, (Cynareæ.) | | | | | |
| 1918. | " | bannaticus (ruthenicus), | | | |
| | | 4 à 5 fot hög, blå . . . | 8 | — | 40 |
| 1919.† | " | exaltatus (strictus), 5 à 7 f. | — | 10 | 1,50 |
| 1920. | " | paniculatus (sphaerocephalus var. glabratus) 6 à 10 f. | 8 | — | 60 |
| 1921. | " | Ritro, 4 à 6 fot, ljusblå — 10 | 1 | — | |
| | | Vackra, egendomliga, i Juli och Augusti blom. tistelväxter med stora, klötrunda, ljus- och mörkblå blomhufvuden. Användes till plantering på gräsplaner, i kanten af buskpartier eller på breda rabatter. | | | |
| Erigeron; Binka, (Asteroideæ.) | | | | | |
| 1922. | " | glabellum, 4 à 8 tum hög — 10 | — | — | |
| 1923. | " | speciosum (Stenactis sp.) | | | |
| | | 2 à 3 fot hög | 5 | — | 30 |
| | | Särdeles vackra grupp- och rabattv. med blå blmr i Juni, Juli och Aug. Den förstnämnda passar äfven till infattningar. | | | |
| Eriogonum, (Senecionideæ.) | | | | | |
| 1924. | " | umbellatum, gul | 30 | — | — |
| | | Låg, länge blommande rabattväxt med talrika blomhufvuden. | | | |
| Eryngium; Manskraft, (Umbelliferae.) | | | | | |
| 1925. | " | alpinum, 1 à 3 fot hög. — | 8 | — | 60 |
| 1926. | " | giganteum, 4 à 5 fot hög — | 5 | — | 30 |
| 1927. | " | maritimum, 1 à 2 fot hög — | 12 | 1,25 | |
| 1928. | " | planum, 2 fot hög | 5 | — | 30 |
| | | Egendomliga, vackra, under sommaren bl. rabattv. med blå eller hvita blmr. Fröet gror långsamt och ojemnt, såvida det ej säs genast efter mognaden. Så är förhållandet med fröet af de flesta Umbelliferae. | | | |
| Erysinum; Vinterkrasse, (Cruciferae.) | | | | | |
| 1929. | " | ochroleucum (Cheiranthus ochr., decumbens & dubius; Erysinum pallens) — | 20 | — | — |
| | | 6 à 8 tum hög, under våren och sommaren blommande växt med gula blmr för rabatter. Fordrar god jord och ett torrt, soligt läge. | | | |
| Eupatorium; Flockblomster, (Eupatoriaceæ.) | | | | | |
| 1930. | " | ageratoides (urticaefol., altissimum) 4 à 6 fot hög — | 15 | — | — |
| 1931. | " | Fraserii, 3 à 4 fot hög — | 15 | — | — |
| | | Under sommaren och hösten blommande rabattväxter. | | | |
| Ferula; Dyffelsträck, (Umbelliferae.) | | | | | |
| 1932. | " | communis, 3 à 4 fot hög — | 5 | — | 30 |
| | | Har mycket vackra blad och passar till plantering på gräsplaner, i kanten af buskpartier o. s. v. Fröet ligger ofta 1 à 2 år i jorden. | | | |
| Fritillaria; Kejsarkrona, (Liliaceæ.) | | | | | |
| 1933. | " | imperialis, blandade | 15 | — | — |
| 1934. | " | Meleagris; Dampelsblomster, blandade | 15 | — | — |
| | | Bekanta, omtyckta prydnadsväxter. | | | |
| Funkia, (Liliaceæ.) | | | | | |
| 1935. | " | coerulea, blå | 15 | — | — |
| 1936. | " | lanceifol. fol. var., brokbl. — | 15 | — | — |
| 1937. | " | Sieboldii, hvit eller blå. — | 15 | — | — |
| | | Praktfulla rabattv. Fröet gror långsamt. | | | |
| Gaillardia, (Senecionideæ.) | | | | | |
| 1938. | " | aristata (bicolor) | 8 | — | 50 |
| 1939. | " | Bosselarii, praktfull | 8 | — | 70 |
| 1940. | " | grandiflora speciosa | 8 | — | 70 |
| 1941. | " | Gaillardia grandiflora vera — | 8 | — | 70 |
| 1942. | " | Loiselii | 8 | — | 70 |
| 1943. | " | pulchella | 8 | — | 40 |
| 1944. | " | Richardsonii | 8 | — | 40 |
| | | Alla 7 sorterna 50 öre. | | | |
| | | Utm. från 1 1/2 till 3 à 4 fot höga praktv. Blmorna äro stora, mycket vackra, gula med brunt och rödt och framkomma under sommaren och hösten. | | | |
| Galega, (Leguminosæ.) | | | | | |
| 1945. | " | officinalis, 3 à 5 fot hög — | 5 | — | 20 |
| 1946. | " | persica, 2 à 3 fot, hvit. — | 5 | — | 20 |
| | | Vackra, i Juni, Juli och Augusti blommande rabattväxter. | | | |
| Gentiana; Höstklocka, (Gentianeæ.) | | | | | |
| 1947. | " | acaulis, låg, blå, praktf. — | 30 | — | — |
| 1948. | " | asclepiadea (Pneumonanthe plicata), 1 à 2 fot hög, skön, blå. | 30 | — | — |
| 1949. | " | catesbaei (Saponaria) 1 1/2 fot hög, blå eller hvit | 20 | — | — |
| 1950. | " | lutea (Asteris) 3 à 4 f., gul — | 15 | — | — |
| 1951. | " | macrophylla (Heppion macrophylla), blå | 10 | — | 80 |
| 1952. | " | Pneumonanthe, 4 à 8 tum hög, skön, blå. | 20 | — | — |
| | | Alla 6 sorterna 1 rdr. | | | |
| | | Mycket vackra, under våren, sommaren och hösten blommande rabattv. G. acaulis är, på fuktigt, lerblandad jord, en praktfull infattningsväxt. | | | |
| Georgina eller Dahlia; Georgin, (Asteroideæ.) | | | | | |
| 1953. | " | coccinea, 1 à 2 fot, skarlakanröd, enkel | 12 | 1,50 | |
| 1954. | " | glabrata, 1 à 2 fot, lilafärgad, enkel. | 10 | — | 80 |
| 1955. | " | fl. alba, hvit, enkel. — | 10 | — | 80 |
| 1956. | " | variabilis, vanlig | 20 | 2,25 | |
| 1957. | " | Liliput, småblommig — | 35 | 5,50 | |
| | | De trenne förstn. sorterna kunna behandlas som ettåriga, d. v. s. att fröet utsås hvarje år, då de blomma från Juni till hösten, men de blifva dock större och vackrare om rotknälarne öfverv. Fröet af de vanliga georginerna (G. variab.) är samlat af de vackraste dubbla sorter. | | | |
| Geum; Neglékrot, (Rosaceæ.) | | | | | |
| 1958. | " | chiloense (coccineum) | 8 | — | 60 |
| 1959. | " | coccineum | 8 | — | 60 |
| 1960. | " | grandiflorum | 10 | 1 | — |
| | | Dessa prydliga 1 à 1 1/2 fot höga växter planteras bäst i krukor, öfverv. frostsfrött och utpl. om våren i god jord. De utveckla under hela sommaren en mängd praktliga, högröda blommor. | | | |
| Glaucium; Strandvallmo, (Papaveraceæ.) | | | | | |
| 1961.† | " | fulvum (grandifl.), gulröd — | 10 | 1 | — |
| 1962.† | " | luteum, gul | 5 | — | 35 |
| | | Från Juli till hösten blommande, 1 à 2 fot höga rabattväxter. | | | |
| Globularia; Bergskrabba, (Globularieæ.) | | | | | |
| 1963. | " | trichosantha | 20 | — | — |
| | | Låg infattningsväxt med frisk grönska och, om våren, lysande, blå blommor. | | | |
| Gypsophila; Gipsblomster, (Caryophylleæ) | | | | | |
| 1964. | " | acutifolia, 3 à 4 fot hög — | 5 | — | 20 |

- à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
1965. *Gypsophila glauca* (Stevonii; repens) 1½ à 2 f. h., hvit — 8 — 60
1966. " *paniculata*, 3 à 4 fot hög — 5 — 20
Hafva små, men ofantligt talrika, hvita blommor. Användas mycket till buketter, hvartill de äro särdeles vackra. Skyddas mot barfrost.
- Hedysarum; Tuppelvrud, (Leguminosæ)**
1967. " *caucasicum*, 2 à 3 f., röd — 20 — —
1968. " *coronarum*, 2 à 3 f., röd — 5 — —
1969. " fl. albo, 2 à 3 f., hvit — 5 — 30
1970. " *sibiricum*, 3 fot, violetteröd — 10 — —
Särdeles vackra, under Juni och Juli blom. rabattväxter. H. coron. äro ömtåliga för sträng frost och fuktighet; böra därför öfvervintras frostfritt och torrt samt om våren utplanteras på grupper.
- Helenium, (Senecionideæ.)**
1971. " *autumnalis*, 4 à 6 fot, gul — 10 — —
1972. " *californicum* 3 à 4 f., gul — 10 — —
1973. " *Hopesii*, orangef., storbl. — 8 — 50
Ståtliga, från Juli till Okt. blom. växter, som kunna plant. på rabatter eller i kanten af buskpartier. De höga sorterna kunna äfven användas bland fleråriga bladväxter på fritt land.
- Helianthemum; Solvända, (Cistineæ.)**
1974. " *luteum*, ½ fot hög, gul. — 10 — —
1975. " *mutabile*, ½ fot hög, hvit, senare röd. — 10 — —
Nätta växter; fordra torr, sandbl. jord och torra platser. Betäckas under stark barfrost med granisqvistar.
- Helianthus; Solros, (Senecionideæ.)**
1976. " *Maximilianus*, gul. — 15 — —
6 à 8 fot hög, om hösten blom. växt; passande bland fleråriga bladväxter, i kanten af större buskpartier eller som fristående på gräsplaner.
- Helleborus; Prustrot eller Nysrot, (Ranunculaceæ.)**
1977. " *atrorubens* — 35 — —
1978. " *foetidus* — 10 — —
1979. " *hyemalis* (Eranthis) 3 à 4 t. — 30 — —
Intressanta, omkring 1 fot höga rabattv., som blomma i Mars! och April, stundom senare. H. hyemal. har små gula blmr, framkommande så snart snön smält och frosten gått några tum ur jorden.
- Hemerocallis; Dagblja, (Liliaceæ.)**
1980. " *graminea*, ½ fot, gul — 25 — —
Ganska vackra blad och blommor.
- Hepatica; Sippa; Blåsippa eller Anemon, (Ranunculaceæ.)**
1981. " *triloba*, (Anem. hepat.) blå — 30 — —
1982. " fl. alba, hvit. — 20 — —
1983. " fl. rubra, röd — 20 — —
Tidigt blommande växter; kunna inplanteras i krukor och drivas till blomning i Februari och Mars.
- Heracleum, se bladväxter.
- Hesperis; Nattniol, (Cruciferaæ.)**
- 1984.†, *matronalis*, 3 fot, röd. — 5 — 15
- 1985.†, fl. alba, 3 fot, hvit. — 5 — 15
1986. " *tristis*, 1½ f., grå, vällykt. — 5 — 20
Blomma i Juni och Juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blmr. Fortplantas ofta genom sjelfsädd.
- à Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
- Hieracium; Hökblomster, (Cichoraceæ.)**
1987. " *aurantiacum*, 1½ fot hög — 10 1 —
Användes till breda infattningar. Fortplantas genom utfallande frö.
- Hyoscyamus; Bolmjört, (Solanaceæ.)**
1988. " *orientalis*, 2 fot, violett — 30 — —
Tidigt om våren blommande rabattväxter.
- Hypericum; Johannisblomster, (Hypericaceæ.)**
1989. " *Ascyron*, 1½ fot hög. — 10 — —
1990. " *elegans*, 1 à 1½ fot hög — 8 — 60
1991. " *pyramdatum*, 4 à 6 fot — 15 — —
Prydliga rabattväxter med gula blommor i Juli och Augusti.
- Iberis; Pipkrage, (Cruciferaæ.)**
1992. " *sempervirens*, 8 à 12 tum — 12 — —
1993. " *semperflorens*, 1 fot hög. — 15 — —
1994. " *Tenoreana*, 10 tum hög. — 8 — 60
Egna sig allesamman till infattningar. De båda förstn. kunna plant. i krukor och drivas till blomning i Mars och April. Betäckas, under stark barfrost.
- Inula; Ålandsrot, (Asteroidæ.)**
1995. " *suaveolens*, 1½ fot hög, gul, vällyktande — 15 — —
andra sorter, se bladväxter.
Ipomea, se slingerväxter.
- Iris; Svärdsblja, (Irideæ.)**
1996. " *anglica*, i flera färger. — 10 — 80
1997. " *foetidissima* 1½ f., blåviol. — 10 — 80
1998. " *furcata*, 2 fot hög, blå — 10 — 75
1999. " *germanica*, 1½ fot hög, i många färger — 15 — —
2000. " *graminea*, 3 à 4 fot, blå — 10 — —
2001. " *Guldenstädtii*, guldgul. — 10 — 80
2002. " *hispanica* (Xiphium) i flera färger — 10 — 85
2003. " *pumila nova*, låg, blandade i flera praktf. färger — 25 — —
Alla 8 sorterna 90 öre.
Dessa praktf. grupp- eller rabattv. borde finnas i hvarje blomsterträdgård. I *pumila* är äfven en af de vackraste infattningsv.
- Jasione; Färrapunsel eller Monke, (Campanulaceæ.)**
2004. " *humilis*, blå. — 20 — —
En låg, under sommaren blom., särdeles pryddlig växt för rabatter och infattningar.
Knautia, se bladväxter.
Lathyrus, se slingerväxter.
- Leontice; Lejonblad, (Berberideæ.)**
2005. " *Leontopetalum*, äkta — 20 — —
Denna intressanta, sällsynta växt har tidigt om våren gula blmr. Tål ej barfrost eller vinterfuktighet, hvarföre de på fritt land stående exempl. deremot böra skyddas. Säkrast är dock att plant. några exempl. i krukor, öfverv. dem frostfritt och utpl. dem om våren på passande platser.
- Liatris, (Eupatoriaceæ.)**
2006. " *spicata* (picta, gracilis eller Seratula) — 15 — —
Vacker; blommor om sommaren. Bör antingen sorgfälligt betäckas eller öfvervintras frostfritt.
- Linaria; Flugblomster, (Scrophulariaceæ.)**
2007. " *alpina*, mörkblå — 20 — —

- å Port. Ort.
Rmt Rd öre. Rd ö.
2008. *Linaria tristis* (Antirrhin.) ask-grå, blekgrå och purpuröd — 10 — 60
 andra sorter, se ettåriga blomsterväxter.
 Den förstn. är synnerligen vacker till klippanläggningar, stenpartier och amplar. *L. tristis* är en vacker rabattväxt. Båda blomma under sommaren.
 Lindelofia, se Omphalodes.
- Linum; Län eller Hög, (Lineæ.)**
2009. " *alpinum*, himmelsblå . . . — 10 — 85
 2010. " *anglicum*, 2 à 3 f., ljusblå — 12 1,30
 2011. " *candidissimum*, hvit . . . — 20 — —
 2012. " *campanulatum* grandifl. gul — 10 — 90
 2013. " *Levisii* variegata . . . — 8 — 45
 2014. " *narbonense*, 1 à 2 f., blå — 10 — 80
 2015. " *perenne*, 2 à 3 fot, blå . . . — 5 — 20
 2016. " " fl. albo, 2 à 3 f., hvit — 8 — 60
- Alla 8 sorterna 75 öre.
 Förträffliga grupp- och rabattväxter, blom. i Juni och Juli. *L. campanul.* öfverv. säkrast i växthus vid + 5 à 6°; de öfriga fördra tunn betäckn. under stark barfrost.
- Lobelia, se ettåriga & krukväxter.
- Lunaria; Månviol, (Cruciferae.)**
2017. † *biennis* (amma) *Judeæ silfverpenningax*, 1 à 2 fot, purpuröd eller hvit . . . — 10 — —
 2018. " *rediviva*, 1 à 3 f., violett — 15 — —
 Särdeles vackra för rabatter och grupper. Den förstnämnda bör säs hvarje år.
- Lupinus; Vargböna eller Lupin; (Leguminosæ.)**
2019. " *arbuscus*, lila med blåröd — 10 — 50
 2020. " *Douglasii*, blå, violett. . . — 10 — 50
 2021. " *elegans*, violett . . . — 8 — 30
 2022. " *grandifolius* (maerophyll.)
 brun eller violett . . . — 8 — 40
 2023. " " *odoratus*, väluktande — 10 — —
 2024. " *mexicanus*, blå; blåhvit . . . — 5 — —
 2025. " *perennis*, blå, violett . . . — 5 — 20
 2026. " *polyphyllus*, blå, violett. — 5 — 20
 2027. " *albus*, hvit. — 8 — 30
 2028. " " *atropurpureus*, mörk. — 12 — 80
 2029. " " *bicolor*, blåhvit. . . . — 12 — 80
- Alla 11 sorterna 80 öre.
 Utm. 2 à 4 fot höga, från Juni till i Aug. blommande rabatt. Fördra god jord och en tunn granrisbetäckning mot barfrost.
- Lychnis; Studentneglaka eller Tjårblomster, (Caryophylleæ.)**
2030. " *calcedonica*, 3 à 5 f., röd — 5 — 20
 2031. " " fl. albo, hvit. — 8 — 50
 2032. " " *carneo*, ljusröd. — 5 — 30
 2033. " *fulgens*, 3 à 2½ f., skarl. röd — 15 — —
 2034. " *grandiflora gigantea*, 1 f. hög, skarlakaröd . . . — 25 — —
 2035. " *Haageana* (hybrida) 1 fot hög, i många färger. — 25 — —
 2036. " " *atrococcinea*, mörkröd — 25 — —
 2037. " " *carnea*, ljusröd. — 30 — —
 2038. " *Sieboldii* (grandifloraalba) 1 fot hög, hvit — 25 — —
 2039. " *Viscaria splendens*, 1 fot hög, carmosinröd. — 8 — 60

- å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.
- Alla 10 sorterna rdr 1,60.
 Dessa prackt. under Juni och Aug. i alla nyanser från hvitt till mörkröd, varierende blmr, äro förtjenta af den största uppmärksamhet. De kunna användas såväl till grupper och rabatter, som till odling i krukor. Till sistn. ändamål äro *L. grandifl.*, *Haageana* och *Sieboldii* vackrast. Ute fördra dessa sorter en tunn betäckning mot barfrost.
- Lysimachia; Lysing, (Primulææ.)**
2040. † *atropurpurea*, mörkröd. — 10 — 75
 Odlas bäst i krukor, öfvervintnas frostfritt och utplanteras om våren. Utmärkt.
- Lythrum; Rackellblomster, (Lythrarieæ.)**
2041. " *Salicaria* (roseum super-balicum) 2 à 4 fot hög, röd — 5 — 30
 2042. " *virgatum*, 3 à 4 fot, röd — 10 — —
 Mycket vackra till rabatter; fördra en god, något fuktig jordmån.
- Macheranthera, (Asteroideæ.)**
2043. " *glabra*, 1½ fot hög, blå — 25 — —
 Riktblom. rabattväxt; kan äfven användas till bredare infattn. Blmar i Juni och Aug.
- Malva; Kattost, (Malvææ.)**
2044. " *Morenii* (Alcea var.) 1½ fot hög, rosenröd . . . — 8 — 50
 2045. " *moschata*, 2 à 3 fot, hvit — 10 — 95
 Vackra rabattväxter. Den sistnämnda har en svag bisamlukt.
- Michauxia, (Campanulææ.)**
2046. † *campanuloides* (strigosa) — 25 — —
 4 à 5 fot hög rabattv. med talrika, stora, hvita, något blåviolet. blmr i Juli och Sept.
- Monarda, (Labiatae.)**
2047. " *didyma* (coccinea) röd . . . — 25 — —
 2048. " *elegans*, röd — 25 — —
 2049. " *splendens*, röd — 25 — —
 Sköna rabattväxter, hvars blad lenna ett hellsamt och välsmakande thé.
- Morina, (Dipsacææ.)**
2050. " *longifolia*, rosenröd. — 20 — —
 Tistellik växt med vackra blommor.
- Myosotis; Förgätmigej, (Boraginææ.)**
2051. " *alpestris*, blå — 8 — 50
 2052. " " fl. albo, hvit — 8 — 60
 2053. " " fl. roseo, rödaktig. — 8 — 60
 2054. " *azorica*, mörkblå. — 35 — —
 2055. " *oblongata*, storbl. vacker — 25 — —
 2056. " *palustris*, äkta, blå — 8 — 60
 2057. " *sylvatica*, blå — 8 — 45
- Alla 7 sorterna 85 öre.
 Dessa allmänt omtyckta blommor äro särdeles vackra till grupper, infattn. och krukor. *M. azorica* måste öfverv. inomhus och *M. palustris* trives endast på fuktiga ställen; de öfriga växa och blomma rikt i vanlig god trädgårdsjord men fördra skydd mot barfrost.
- Obeliscaria; Ruckellblomster, (Senecioideæ.)**
2058. " *columnaris* (Rudbeckia column. och columnifera; *Ratibida sulcata*). — 25 — —
 6 à 7 fot hög med stora, gula blmr i Juli och Sept. Planteras på stora rabatter eller i kanten af buskpartier.
- Oenothera; Natljus, (Onagrariææ.)**
2059. " *Fraserii*, 1 fot hög, gul — 10 — 75

å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

2060. *Oenothera fruticosa* (tetragona) 2 à 3 fot hög, gul — 15 — —
2061. „ *fruticosa* major, storblomm. — 15 — —
2062. „ *glauca*, 1 à 2 fot guldgul — 10 — —
2063. † „ *grandiflora* (suaveol.) 3 à 4 fot gul, välluktande — 5 — 30
2064. † „ „ major, mycket större — 8 — 60
2065. † „ *missouriensis* (macrocarpa; alata) låg, gul, storbl. — 10 — 75
2066. † „ *speciosa*, hvit med gult, praktfull — 8 — 60

Alla 8 sorterna 70 öre.

Praktf. från Juni till hösten blomm. grupp- & rabattv., hvilka, liksom de ettåriga arterna, förtjena mycken uppmärksamhet af blomsterodlare. *O. fruticosa* kan med fördel plant. i kruka och anv. till dekorat. *O. speciosa* bör öfvervintras frostfritt och utplanteras om våren.

Omphalodes, se *Cynoglossum*.

Onopordon, se bladväxter.

Orobis; Skogsörta, (Papilionaceæ.)

2067. „ *lathyroides*, 2 à 3 fot, blå — 10 — 95
2068. „ *venosus*, 12 à 16 t., blå — 15 — —
2069. „ *vernus*, 1 fot, purpurrd — 15 — —
Vackra i Maj och Juli blommande rabattv.

Peonia; Pion, (Ranunculaceæ.)

2070. „ *arborea; Moutanpion* . . . — 25 — —
2071. „ *officinalis*, bästa sorter, bl. — 5 — 20
2072. „ *sinensis*, bästa sorter, bl. — 15 — —
Efter frösädd får man ofta nya, vackra varieteter. Om fröet ej utsås genast efter mogn., ligger det vanl. ett år och deröfver i jorden innan det gror. Plantorna böra värdas i krukor de första åren och först tredje året utplanteras på kalljord. Den förstnämnda betäckes om vintern.

Papaver; Valmo, (Papaveraceæ.)

2073. „ *alpinum croceum*, 1 f., gul — 12 — —
2074. † „ *bracteatum*, 2 fot, högröd — 8 — 60
2075. „ *caucasicum*, 1 f., mönjer. — 10 — 75
2076. „ *orientale*, 2 f., skarl-röd — 10 — 75
Vackra från Juni till Sept. blom. rabattv. *P. bracteatum* & *orientale* hafva stora, praktf. högröda blmr och användas med fördel till plantering i kanten af från vägarne något aflägsna buskpartier. *P. alp.* och *caucasicum* fordra om vintern skydd mot barfrost.

Penstemon, (Scrophulariaceæ.)

2077. „ *atropurpureus* — 12 1,50
2078. „ *campanulatus* (*Chelone camp.*, *angustif.*, *atropurpureum* & *roseum*) — 12 1,60
2079. „ *Digitalis* — 5 — 25
2080. „ *elegans* (*camp. eleg.*) — 8 — 50
2081. „ *grandiflorus*, mycket storblommig, skön — 20 — —
2082. „ *Hartwegii* (*gentianoides*) — 15 — —
2083. „ „ *coccineus* — 20 — —
2084. „ *Murrayanus* — 25 — —
2085. „ *pulchellus* — 10 — —
2086. „ hybridä former, utmärkt vackra, blandade — 25 — —

Alla 10 sorterna rdr 1,40.

Dessa sköna, 2, 3 à 4 fot höga, mycket

tacksamt blom. grupp. fåla ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utplanteras om våren. De vackraste sorterna böra förkas genom steklingar.

Phlox; Plumbomster eller Höstsyren, (Polemoniaceæ.)

2087. „ *suffruticosa* hybr. i fl. färg. — 20 — —
2088. „ *decussata* hybr. i fl. färg. — 30 — —
Äro bland de allra bästa grupp- och rabattv. Fordra fet, något fuktig jord och skydd mot det starkaste solskenet. Fröet gror långsamt.

Phygelius; (Scrophulariaceæ.)

2089. „ *capensis*, 2 à 3 fot hög. — 25 — —
Vacker grupp. Blrarna äro 1 1/2 tum långa, skarl-röda. Behandl. som *Penstemon*.

Phyteuma, (Campanulaceæ.)

2090. „ *spicata*, 1 fot hög, blå — 30 — —

Phytolacca, (Phytolacæ.)

2091. „ *decandra*, 5 à 8 fot hög — 5 — 20
En buskig, till plant. på gräsplaner särdeles användbar växt; betäckes eller öfvervintras frostfritt.

Plantago; Vågrörda, (Plantaginææ.)

2092. „ major fol. purpureis — 12 1,25

Plumbago; Blyrot, (Plumbaginææ.)

2093. „ *Larpena* (*Valoradia plumbaginoides*) — 30 — —
1 1/2 fot hög, under sommaren och hösten blom. rabattv. med sköna blå blmr. Bör omsorgsfullt betäckas eller öfverv. inomhus.

Polemonium; Venusvagn, (Polemoniaceæ.)

2094. „ *boreale*, 2 fot hög, blå — 10 — —
2095. „ *coeruleum*, 2 à 3 fot, blå — 5 — 20
2096. „ „ *album*, hvit — 5 — 20
Vackra, från Maj till i Aug. blommande rabattv.; fortplantas genom sjelfsädd.

Polygonum; Bolvete, (Polygonææ.)

2097. „ *polymorphum ajanense* — 15 — —
Vacker i buketter, 1 fot hög, hvit.

Potentilla; Femfingerört, (Rosaceæ.)

2098. „ *atrosanguinea*, 2 à 3 fot — 10 — —
2099. „ *aurea*, 1 fot hög, gul. — 5 — 30
2100. „ *colorata* (*formosa; nepalensis*) 2 fot hög, ljusröd — 10 1 — —
2101. „ *Hopwoodiana*, 2 f., mångf. — 15 — —
2102. „ *insignis*, 1 à 2 fot, gul. — 12 — —
2103. „ *Mac Nabiana*, 2 à 3 fot, skarlakanröd med gult — 15 — —
2104. „ *hybrida*, blandade färger — 15 — —
2105. „ „ fl. pl., dubbla, bland. — 35 — —
2106. „ *Roemeriana* — 12 — —

Alla 10 sorterna rdr 1,20.

Sköna, från Juni till sent på hösten uppljörligt blom. rabattv. De dubbla arterna äro verkliga praktväxter för såväl krukor, som fritt land.

Primula; Majnyckel eller Gullwifva, (Primulaceæ.)

2107. „ *Auricula, Aurikler*, bl. f. — 30 6 —
2108. „ „ *Laukeaurikler*, bland. — 20 — —
2109. „ *cortusoides*, röd — 20 — —
2110. „ *elatior* (*veris* var.; *inodora*) i flera färger — 12 1,50
2111. „ *luteola*, citrongul. — 20 — —

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
2112. <i>Primula mollis</i> , mörkcarminröd	—	25 — —
2113. " <i>suaveolens</i> , svagt vällukt. gul eller röd, se afbildn.	—	10 1 —
2114. " " <i>splendens</i> , lysande skarlakanröd	—	25 — —
2115. " <i>veris</i> , gul eller mörkröd.	—	10 1 —
Alla 9 sorterna rdr 1,60.		
Tidigt om våren bl. vackra grupp-, rabatt- eller infattningsv. <i>P. cortus</i> , <i>mollis</i> och <i>luteola</i> böra beträckas eller öfverv. frostfr.		



Primula suaveolens.

Ptarmica, (Senecionideæ.)		
2116. " <i>Clavenna fl. pl.</i>	—	45 — —
Utm. vacker i Juni och Aug blom. grupp- eller rabattv. med talrika, dubbla, belliska, hvita blommor till buketter.		
Pulsatilla, se Anemone.		
Pyrethrum; Batransört, (Senecionideæ)		
2117. " <i>carnem</i> , 1 à 2 f., ljusröd	—	10 1 —
2118. " <i>roseum</i> , 1 à 2 f., rosenröd	—	10 1 —
hybrida, enkla variet.:		
2119. " <i>atroroseum</i> , lys. mörkröd	—	10 1 —
2120. " <i>atrosanguineum</i> , lys. röd	—	12 1,50
2121. " <i>carmineum</i> , lys. carminröd	—	15 — —
2122. " <i>Delhayii</i> , lysande röd	—	12 — —
2123. " <i>Gloire de Nimy</i> , lys. röd	—	25 — —
2124. " <i>Millerii</i> , hvit	—	12 1,30
2125. " <i>album floribundum</i> , hvit	—	15 — —
hybrida, dubbla variet.:		
2126. " <i>carmineum plenum</i>	—	30 — —
2127. " <i>floribundum pl.</i>	—	30 — —
2128. " <i>multiflorum album pl.</i>	—	30 — —
2129. " <i>purpurum pl.</i>	—	30 — —
2130. " <i>roseum pl.</i>	—	30 — —
2131. " <i>hybr. blandade sorter.</i>	—	25 — —
2132. " <i>parthenifolium aureum.</i>	—	20 2,50

Alla 15 sorterna rdr 2,60.

7 sorter enkla var. — 95.

5 dubbla var. 1,35.

De båda förstn. arterna lemna det bekanta persiska insektpulvret. *P. parthenif. aur.* är en utm. skön, 6 tum hög infattningsv. med friskt, gulgrönt bladverk och hvita

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
blmr. Kan ej nog rekommenderas till garnering af blomster- och bladväxtanordningar på finare gräs mattor. De hybrida formerna hafva allesamman från Juni till Aug. utm. stora blmr i de mest lysande färgnyanser. De höra till våra präktigaste grupp- och rabattv. och kunna dessutom användas i krukor till dekorerings af växthus, boningsrum, blomsterbord o. s. v. Behöfva god, lös jordmån och för säkerhets skull en tunn ljung- eller gransris-betäckning under barfrost.		

Ranunculus; Smörblomster eller Ranunkel, (Ranunculaceæ.)

2133. " <i>asiaticus superbissimus.</i>	—	40 — —
2134. " <i>cæcius; Smörblomster</i> , 4 à 5 fot hög, gul, enkel.	—	10 — —
Den förstn. är en af de vackraste kända gruppv. utomordentligt praktfull, varierande i alla möjliga nyanser, från rent vitt, gult, violett o. s. v. till svartrött. Om fröet utsås tidigt, blomma en del redan första året. Rötterna upptagas om hösten, förvaras torrt och frostfritt samt utpl. följande vår i god, kraftig jordmån. <i>R. cæcius</i> är användbar på rabatter och i kanten af buskpartier.		

Rheum, se bladväxter.

Rudbeckia; (Senecionideæ.)

2135. " <i>fulgida (chrysomela; aspera)</i> 1 à 2 fot hög, mörkgul med svartrött	—	10 — 85
2136. " <i>grandifl. (nudicaulis)</i> storblommig, gul m. mörkrött	—	20 — —
2137. " <i>(Centrocarpa) hirta</i> , 1 à 3 fot hög, guldgul	—	30 — —
2138. " <i>(Neumanniana) speciosa</i> guldgul med mörkrött	—	15 — —

Särdeles ståtliga, från Juni till Sept. och Okt. blom. prydnadsv. för breda rabatter eller kanterna kring buskpartier.

Salvia, (Labiatae.)

argentea, se bladväxter.		
2139. † <i>bicolor</i> , 2 à 3 f., violett	—	20 — —
2140. " <i>pendula</i> , 2 à 3 fot, blå	—	35 — —
2141. † <i>Sclarea</i> , 2 à 3 f., blåhvit	—	8 — 45

Sanguinaria; Blodört, (Papaveraceæ.)

2142. " <i>canadensis</i>	—	20 — —
8 à 10 tum hög med prydl. hvita, krokuslika blmr. Fordrar lös, god jord, något skugga och betäckning mot frost.		

Saxifraga; Stenbräcka, (Saxifrageæ.)

2143. " <i>descipiens</i>	—	15 — —
2144. " <i>hypnoides</i>	—	15 — —
Mosslika växter med hvita blmr i Maj och Juni. Användas till infattningar eller planteras på gravar o. s. v.		

*** Scabiosa; Ängsvädd eller Enkelblomster, (Dipsacæ.)**

2145. " <i>caucasica connata (Asteroccephalus)</i> 2 à 3 f. h., blå	—	10 1 —
2146. " <i>pyrenaica</i> , 1½ fot hög	—	10 1 —

Passande till plantering på rabatter.

Scutellaria; Hjelmört eller Getnos, (Labiatae.)

2147. " <i>macrantha</i> , 6 t. h., violblå	—	15 — —
2148. " <i>peregrina</i> , 2 à 3 f., violett	—	10 — —

Den förstn. passar till pl. på klippanläggningen senare på rabatter. Blma i Juni & Aug.

å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

Sedum; Fetört eller Fetknoppar, (Cras-
sulaceae.)

2149. „ Aizoon, 1 fot hög, gul . . . 10 — —
2150. „ album, 6 tum hög, hvit . . . 20 — —
2151. „ hybridum, 6 t., svafvelgul . . . 15 — —
2152. „ kantschatium, gul. 10 — —
2153. „ spurium, purpurröd 10 — —
Särdeles passande till plantering på stenhögar o. s. v.

Silene; Silen, (Caryophylleae.)

2154. „ alpestris, låg, hvit 35 — —
2155. „ chlorifolia, 1 à 2 f., hvit 35 — —
2156. „ maritima, 1 fot hög, hvit 8 — 60
2157. „ Schafta, 4 à 6 t. h., hvit 12 — —
2158. „ Zawadskii, 4 à 6 t., hvit 12 — —
Alla 6 sorterna 90 öre.

Rabattv. De ligre arterna äfven användbara till infattn. och klippanläggningar.

Silphium, se bladväxter.

Sisyrinchium; Gråstulja, (Iridae.)

2159. „ aneans, 6 à 8 tum h., blå 12 150
Infattningsväxt med gråslika blad och vackra blommor.

Solidago; Guldris, (Asteroideae.)

2160. „ Riddeli, 2 à 4 fot, gul. 15 — —
2161. „ recurvata, 2 à 4 fot, gul 10 — —
Andvändbara till försköning af rabatter o. buskpartier. Blomma i Juli och Augusti.

Spergula; Spergel, (Alsinaceae.)

2162. „ pilifera, fin, hvita blmr. 20 — —
Denna mosslika växt är särdeles användbar till fina infattningar. I England nyttjas den stundom i stället för gräs till bildande af små, fina mattor.

Spiraea; Brudspira, (Rosaceae.)

2163. „ callosa, 3 à 4 f., rosenröd 8 — 40
2164. „ Ulmaria fol. var., 2 à 3 fot, hvit m. brokiga blad 15 — —
Den förstnämnda är buskattad, användbar till garnering af buskpartier; den senare vacker rabattväxt.

Statice; Ormnrot, (Plumbagineae.)

2165. „ coccinea 8 — 60
2166. „ echinoides 15 — —
2167. „ eximea 8 — 60
2168. „ incana hybrida nana 5 — 30
2169. „ rubra 8 — 60
2170. „ speciosa 8 — 60
2171. „ scoparia 8 — 60
Alla 7 sorterna 55 öre.

Mycket vackra till plantering på stenhögar eller rabatter. Afskurna hålla sig blommorna och äro vackra till vinterbuketter och kransar.

Stenactis, se Erigeron.

Stevia, (Eupatoriaceae.)

2172. „ Eupatoria (hysopifol.; Ageratum punctatum) 10 — 75
2173. „ Lindleyana 8 — 50
2174. „ purpurea 10 — 85
Vackra, med flockvis sittande purpurröda blmr. Öfverv. frosthritt och utpl. om våren; äfven användbara som krukväxter.

Telekia, se Puphtalmum.

Thalictrum; Angeruta, (Ranunculaceae.)

2175. „ acutilobum, 2 à 3 fot hög 8 — —

å Port. Ort.
Rmt Rd ö. Rd ö.

2176. Thalictrum anemonoides (Ane-

- monethalicetum) 6 à 8 f., hvit 8 — 60
2177. „ appendiculatum, 2 à 3 f. 8 — 60
2178. „ aquilegifolium, 4 à 5 f., hvit 10 — 85
2179. „ concinnum, 4 fot, gul 10 — 85
2180. „ glaucum, 6 fot, svafvelgul 8 — 60
2181. „ Kockii, 2 à 4 fot hög 8 — —
2182. „ laserpitifol., 2 à 3 fot hög 8 — —
2183. „ lucidum, 2 à 4 fot hög 8 — —
2184. „ majus, 3 à 4 fot hög 10 1 —
2185. „ minus, 2 fot hög 8 — 60
2186. „ purpurascens, 3 à 4 f., röd 12 — —
2187. „ rigidum, 3 fot hög. 8 — —
2188. „ trigynum, 2 à 3 fot hög 8 — —
2189. „ verticillatum, 2 à 3 f. h. 8 — —

Alla 15 sorterna rdr 1,15.

Mycket prydl. till buketter & rabatter. Både blad & blmr kunna dessutom användas i buketter. Den första bl. i April och Maj och är en af de mest intressanta värbmr. De öfriga blomma i Juni & Aug.

Thermopsis; Kärlböna (Papilionaceae.)

2190. „ fabacea (Sophora) 15 — —
2191. „ lanceolata (Thermia lupinoides) gul 15 — —
Vackra, i Juni & Juli blomm. rabattväxter.

Tradescantia, (Commelineae.)

2192. „ virginica, blandade 10 — —
Omkring 1 fot hög infattningsväxt med gråslika blad och ganska prydliga, blå, violetta, röda och hvita blommor från Juni till September.

Tricyrtis, (Iridae.)

2193. „ hirta 15 — —
2194. „ aestivalis 20 — —
2195. „ fl. nigro 25 — —
Egendomliga, vackra växter, hvars köttiga rötter bäst öfvervintras inomhus.

Tulipa; Tulpan, (Liliaceae.)

2196. „ sylvestris, Skogstulpan. 25 — —
En gång pl. och öfverlemnad åt sig sjelf fortpl. den sig genom sidlökar; kan lätt förvildas på fuktiga gräsmattor. Blmrna äro om våren utvärdigt gula och vållukt.

Valeriana; Vendelrot eller Baldrian, (Valerianaceae.)

2197. „ officinalis, röd eller hvit 5 — —
2 à 4 fot hög, i Juni och Juli blommande rabattväxt.

Verbascum; Kungsljus, (Scrophulariaceae.)

2198. † „ Blattaria, 2 à 3 fot, gul 8 — 70
2199. „ phoeniceum, 2 à 3 f., fl. färg. 8 — 50
2200. † „ pyramidatum, 3 à 5 f., gul 5 — 30
2201. † „ Thapsus, 6 à 7 fot, gul 5 — 20
Vackra, egendomliga rabattväxter. Verb. phoen. kan äfven användas till grupper.

Veronica; Arenpris, (Scrophulariaceae.)

2202. „ Bachofenii, 1 fot hög, hvit 80 — 80
2203. „ gentianoides, 1 à 2 f., hvit 25 — —
2204. „ grandis, 2 fot hög, blå 8 — 60
2205. „ incisa, blå och hvit 8 — 50
2206. „ pinnata, 1 f., blå eller hvit 10 — —
2207. „ pygmaea, 1 fot, blå 10 — —
2208. „ spicata, 1 fot, blå 10 — —
Alla 7 sorterna 55 öre.

	à Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Under sommaren blommande rabattväxter.		
Viola; Viol. (Violariæ.)		
2209. "	cornuta Mauve Queen	— 15 —
2210. "	" purple Queen	— 15 —
2211. "	" blandade	— 15 —
2212. "	odorata semperflorens (italica) <i>Luktvio.</i>	— 12 1 —
2213. "	" semperflorens, fl. alba	— 15 —
2214. "	" russica	— 20 —
V. cornuta äro utm., under hela somma-		

ren med tusentals violetta blm prydda infattningsväxter. V. odorata kunna inplant. i krukor och drivvas om våren; blomma lifven om hösten. V. russica har större blommor.

Om urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:
 200 sorter två- och fleråriga växter, rdr 20 —
 100 " två- och fleråriga växter " 10,50
 50 " och fleråriga växter " 5,50
 25 vackra sort. två- & flerår. växter " 3,25
 12 vackra sort. två- & flerår. växter " 1,75

VII. Frö till Krukväxter:

En stor del af fröet till de under denna rubrik anförde växter införskrifves till Europa direkte från växternas hemländer, i synnerhet från Nya Holland, Ost- och Vestindien, Goda Hoppsudden, m. fl. ställen. Många sorter hafva derföre genom den långa resan redan vid hitkomsten förlorat en del af sin groningskraft, så att de behöfva ligga länge i jorden innan de gro, och uppkomma ojemnt. Derföre är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af dess groningsförmåga. Sålunda bör fröet af de flesta **exotiska Leguminosæ**, sasom: *Acacia*, *Bossica*, *Chorozema*, *Chianthus*, *Edwardia*, *Poinciana* m. fl., innan det utsås antingen inläggas i linnelappar och hastigt neddoppas i 75 à 80° varmt vatten, eller ock bör det få ligga ett à två dygn i hult, med en 100:del saltsyra uppländadt regn- eller ävatten. Man kan äfven der till nyttja starkt utspädd chlorvatten. På större frösor, såsom fröet till en del *Palmer*, *Canna* och dylikt bortfilas det grodden omgifvande yttre skalet, dock så försigtigt att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör bortfilas, utan blott det ställe, der grodden skall framskjuta. Mycket **finkorniga fröslag**, såsom *Azalea*, *Begonia*, *Calceolaria*, *Epacris*, *Erica* m. fl. böra vid såningen endast helt obetydligt eller ock alldeles intet betäckas med jord, utan bör man i stället öfverträcka de med dylikt frö besädda krukorna med glasskivor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt att man uti andra, vattenfyllda kärl nedsätter fröerukorna och låter dem genom bottenhålens uppsuga vattnet. Alla sorter krukväxtfrö fordra för att kunna gro: jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solskin.

	à Port.	Rmt Rd ö.
Abroma; Kakaomalva, (Byttneriacæ.)		
2215. "	Augusta (fastuosa) 6 à 7 fot hög	— 40
	Blommorna brunröda; fordra drifbänkjord och + 15 à 16° C.	
Abutilon, (Malvaceæ.)		
2216. "	aurantiacum, orangeröd	— 40
2217. "	insigne, rosenröd, mörkstrimmig	— 40
2218. "	striatum, gul med rött	— 10
2219. "	venosum, gul med blodröda ådror	— 20
2220. "	hybridum, Duc de Malakoff	— 20
2221. "	" Medicis Spada	— 30
2222. "	" Montgolfier	— 30
2223. "	" souvenir d'Aragon	— 20
2224. "	" van Houteii	— 10
Alla 9 sorterna 1 rdr.		
Präktiga växter för boningsrum. Blmrna klocklika, utmärkt vackra; fordra kraftig jord och + 5 à 15° C.		
Acacia; Akasia, (Mimosæ.)		
2225. "	albicans	— 10
2226. "	argyrophylla	— 15
2227. "	armata, pr ort 90 öre	— 12
2228. "	aroma	— 20
2229. "	calamifolia	— 30
2230. "	celastrifolia	— 15
2231. "	chordophylla	— 25
2232. "	cultriformis (dolabriformis)	— 10

	à Port.	Rmt Rd ö.
2233. "	Acacia cyanophylla	— 10
2234. "	dealbata (affinis), pr ort 70 öre	— 10
2235. "	decipiens	— 15
2236. "	decurrens	— 15
2237. "	dentifera (erythropus)	— 10
2238. "	discolor (botryceph; Mimosa disc.)	— 35
2239. "	eburnea, pr ort 60 öre	— 10
2240. "	elata	— 20
2241. "	falcata	— 20
2242. "	farnesiana (pedunculata; Farnesia odora), pr ort 20 öre	— 5
2243. "	floribunda	— 25
2244. "	" pendula	— 15
2245. "	glauca pendula (leucocephala)	— 5
2246. "	glomerata, pr ort 40 öre	— 8
2247. "	grandis	— 25
2248. "	graveolens (verniciflua)	— 15
2249. "	heterophylla	— 25
2250. "	horrida, pr ort 70 öre	— 10
2251. "	La Trobeii	— 20
2252. "	leiophylla (Blomeii)	— 10
2253. "	leptophylla, pr ort 20 öre	— 5
2254. "	linifolia (abietina; pinifolia)	— 30
2255. "	longifolia, pr ort 60 öre	— 10
2256. "	" magnifica	— 25
2257. "	" pendula, pr ort 70 öre	— 10

å Port. Rmt Rd ö.

2258. *Acacia longissima glauca pendula* (linearis) — 10
 2259. " *lophanata*, pr ort 25 öre — 5
 2260. " " *speciosa*, pr ort 75 öre — 10
 2261. " *lunata* (brevifolia; austral.) — 25
 2262. " *Meissnerii*, pr ort 70 öre — 10
 2263. " *Melanoxylon* (arcuata, latifolia) — 15
 2264. " *mollissima* (decurrens v. moll.) — 12
 2265. " *Neumannii* (*lophanata* N) — 5
 pr ort 80 öre.
 2266. " *oleifolia* (elegans; purpurea) — 10
 2267. " *paradoxa* (armata; angustifolia eller undulata) — 15
 2268. " *petiolaris* — 10
 2269. " *pulchella* — 40
 2270. " *pychantha* — 10
 2271. " *reclinata* — 20
 2272. " *retinoides* (glaucescens) — 10
 2273. " *Sophora*, pr ort 50 öre — 8
 2274. " *trinervata*, pr ort 70 öre — 10
 2275. " *verticillata* — 15
 Alla 50 sorterna rdr 7 —
 40 vackra sorter " 5,75
 20 " sorter 3 —
 12 " " " " 1,75

Acacierna höra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter. De bilda efter beskärning utm. vackra träd, hvilka kunna uppdragas till ansenlig höjd. Blomma om våren, stundom äfven under hösten och vintern. Fordra ljungjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfvervintras vid + 5 å 8° C. och utflyttas under sommaren i det fria.

Agapanthus; Flocklilja, (Hemerocallidæ)

2276. " *umbellatus*, blå — 10
 2277. " " *fl. albo*, hvit — 30

Kända, onttyckta fönsterväxter; bära ej för ofta omplanteras. Fröet grov långsamt.

Agave; Amerikansk Aloe, (Liliaceæ)

2278. " *americana*, S. k. *Hundsvärrig Aloe* — 30
 2279. " *filifera*, utmärkt praktfull — 50
 2280. " *mexicana*, storväxt — 20

Bekanta dekorationsväxter. Fordra kraftig jord, blandad med grofkornig sand, sparsam vattning om vintern och + 5 å 10° C.

Aloe; Aloe, (Liliaceæ)

2281. " *arborescens* — 35
 2282. " *attenuata* — 35
 2283. " *cæcia* — 35
 2284. " *formosa* — 35
 2285. " *mitreiformis* — 35

Tacksamma växter för boningsrum. Fordra sol och sparsam vattning, särdeles om vintern. Af *A. mitreiformis* erhålles det ämne som under namn af aloe nyttjas i medicinen.

Alstrømeria, (Amaryllidæ)

2286. " *aurantiaca* — 10
 2287. " *chilensis*, i flera färger — 20

Vackra, under sommaren i det fria användbara växter. Rötterna förv. torra om vintern. Öfvervintras vid + 5° C.

Amaryllis, (Amaryllidæ)

2288. " *vitata* — 25

Lökväxt med praktfulla blommor. Öfvervintras vid + 15 å 20 C.

å Port. Rmt Rd ö.

Angelonia, (Scrophulariaceæ)

2289. " *grandiflora* — 25
 2290. " *Gardneriana* — 25

Vackra, ungefär 1 fot höga småbuskar med blå, hvitpunktade blommor. Fordra + 15° C. och sandblandad grästorfjord.

Anomatheca, (Iridæ)

2291. " *eruenta* — 20

Rotknölarne ligga under vintern torra. Utplanteras om sommaren. Blommorna vackra, blodröda.

Anona; Flaskträd, (Anonæ)

2292. " *Cherimolia* — 10
 2293. " *suavissima* — 10

Trädartade; fordra fet, lös jord. mycket vatten och + 15° C.

Aralia; Bergangelika, (Araliæ)

2294. " *digitata*, (*Hedera xalapensis*) — 30
 2295. " *umbraculifera* — 30

Ståtliga dekorationsväxter för tempererade växthus och boningsrum.

Arbutus; Smultronträd, (Ericaceæ)

2296. " *Andrachne* — 20
 2297. " *Unedo* — 10

Utmärkta för sina smultronlika frukter. Planteras i god ljung- och löfjord. Öfvervintras vid + 5° C.

Ardisia; Spetsblomster, (Myrsinæ)

2298. " *eroulata* — 30

Kan odlas i boningsrum; utmärkt för dess röda bär.

Asclepias; Svalrot, (Asclepiadæ)

2299. " *curassavica*, pr ort 70 öre — 10

3 å 5 fot hög med vackra, mörka orange-färgade blmr. Odlas bäst i varm drifbänk och om vintern vid + 12 å 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.

Aspalanthus, (Papilionaceæ)

2300. " *nivea* — 15
 2301. " *cericea* — 30

Sällsynta prydnadsv. Fordra lätt sandblandad ljung- och löfjord, + 5 å 8° C.

Azalea; Hjellros, (Rhodoraceæ)

2302. " *indica*, i flera färger — 30
 2303. " *pontica* — 15

Fröet hemtadt af de nyaste praktsorter.

Begonia, (Begoniaceæ)

2304. " *boliviensis*, praktfull — 25
 2305. " *diversifolia* — 15

2306. " *Pearceii*, vackra blad och blmr — 20
 2307. " *Rex hybrida*, praktfulla blad — 25

Fröet bör ej betäckas med jord. Den förstn. är utmärkt för grupper; bär, liksom *B. diversifolia* hållas torr om vintern och omplanteras på våren. *B. Pearceii* & *Rex* äro präktiga fönsterväxter. Den sistnämnda har olika tecknade, vackra blad.

Berberis; Surtörne, (Berberidæ)

2308. " *Bealii* — 25
 2309. " *Darwynii* — 25

2310. " *Ehrenbergii* — 35
 2311. " *fascicularis* (pinnata; Mahonia) — 5

2312. " *Fortunei* — 25
 2313. " *japonica* — 15

Prydliga, ständigt gröna buskar med praktfulla gula och gulröda blommor. Öfverv. vid + 2 å 5° C. Fröet grov långsamt.

Bignonia; Trumpetblomster, (Bignoniaceæ)

å Port. Rmt Rd ö.

2314. *Bignonia gracilis*, guldgul — 25
 2315. " *jasminoides*, blekröd — 25
 Rankväxter med skönt bladverk och praktfulla blommor. Fordra löfjord och + 10 à 15° C.

Billbergia, (Bromeliaceæ.)

2316. " *fasciata* — 30
 2317. " *vittata* — 30
 2318. " *zebrina* — 25
 Ananaslika dekorationsväxter för varma växthus och boningsrum, med särdeles vackra blommor. Fordra lätt jord eller mossa och + 15° C.

Bocconia, se bladväxter.

Boehmeria, se bladväxter.

Bossiaea, (Papilionaceæ.)

2319. " *cinerea* — 30
 2320. " *heterophylla* — 20
 2321. " *ovata* — 20
 Vackra, nyholl. småbuskar med tatrika blommor. Fordra lätt ljunjord, god dränering, lagom vatten & + 5 à 10° C.

Brachyzema, (Papilionaceæ.)

2322. " *latifolium*, behandl. som förest. — 10

Cactus, (Cactææ.)

2323. " *acutangulus* — 35
 2324. " *eriphorus* (*cubensis*) — 35
 2325. " *grandiflorus*, *Nattens drottning* — 60
 2326. " *speciosissimus* — 50
 2327. " *triangularis* — 35

Alla 6 sorterna rdr 2,70.

Kammarväxter med praktf. blmr. Fordra mycket sol och sparsam vattning. Hvarje portion innehåller blott 5 frö.

Bonapartia, se bladväxter.

Calampelis, se slingerväxter.

Calceolaria; Toffelblomster, (Scrophulariaceæ.)

2328. " *hybrida*, enfärgade, punkterade och tigrerade sorter, i praktfulla nyanser, se afbildningen — 15
 2329. " " *nana*, låga, samma sorter som föregående, blandade . — 15
 2330. " *rugosa hybrida*, buskartade i många nyanser — 20

Fröet säs helst i slutet af Aug. eller början af Sept. i flata fat eller krukor m. fin, sandbl. löfjord, hvars yta, före seningen, noga jemnas med ett der till gjort bråde. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas med ofvanu. bråde, hvarefter de besädda kärnen nedsättas uti ett vattenfylldt kärl, tilldess jorden uppsugit tillräcklig fuktighet, då de ställas tätt under glaset i en sval drifbänk. För att befördra groningen öfvertäckas frökärnen med glasskivor, som åter, borttagas när fröet börjar gro. Så snart hjerbladen utbildat sig, omskolas plantorna i andra kärl, i något kraftigare, men likväl lätt, lös jord, på omkring 1 tumns afstånd fr. hvarandra. Kärnen ställas derpå åter under glas i drifb., yttas försigtigt och skyddas mot solen tilldess pl. blifvit så försigkomna att de beqvämt kunna fattas med fingrarna, då de ompl., hvar för sig, först i små och sedermera i allt större och större krukor. De fordra om vintern en ljus, sval plats nära glaset och frisk luft så ofta vädret är mildt. En jenn, fastän ej öfverflödlig fuktighet är absolut nödvändig för dess

å Port. Rmt Rd ö.

trefnad. Bladlös adägsnas genast genom tobaksrökning eller på annat sätt. Under knoppn. och blomm. är svag gödselvattning 2 à 3 ggr i veckan att rekommendera. De buskartade toffelblommorna anv. helst på grupper i det fria och förkas under vintern och våren genom sticklingar.



Calceolaria hybrida.

Calla, (Aroideæ.)

2331. " *atiopica* (*Richardia africana*) . — 10

Bekant och omtyckt kammarväxt.

Callistachys; Praktax, (Papilionaceæ.)

2332. " *lanceolata*, mörkgul — 15

Trädartad, vacker; pl. i sandblandad torfljung och löfjord, yttas sparsamt och öfvervintras vid + 5 à 10° C.

Callistemon, se *Metrosideros*.

Calothamus; Praktbuske, (Myrtaceæ.)

2333. " *quadrifida*, blommorna röda. . — 40

Buskartad, vacker; behandlas som föreg.

Calythrix; Härkalk, (Myrtaceæ.)

2334. " *scabra* — 15

Vacker buske eller träd, behandl. som föreg.

Camellia, (Theaceæ eller Camelliæ.)

2335. " *japonica*, blandade sorter . . . — 55

Fröet samlat af de bästa, dubbla sorterna. se bladväxter.

Carica; Melonträd, (Cucurbitaceæ.)

2336. " *papaya* — 45

Intressant träd med ätbara, melonlika frukter. Planteras i stora krukor, i fet, lucker jord; öfvervintras vid + 10 à 15° C.

Cassia; Kassiaträd, (Papilionaceæ.)

2337. " *corymbosa*, pr ort 40 öre — 8

2338. " *floribunda*, pr ort 60 öre — 8

Träd med vackra, gula blommor. Beskåres årligen. Fordrar löfjord och + 10 à 15° C.

Casuarina; Kasuarträd, (Coniferaæ.)

2339. " *levigata*, pr ort 30 öre — 5

2340. " *leptoclada* — 30

2341. " *muricata* — 25

å Port. Rmt Rd ö.

Egendomliga, bladlösa träd med trädfröna grenar. Planteras i löf- och ljungjord; öfvervintras vid + 5 à 10° C.

Ceanothus, (Rhamneæ.)

2342. " africanus, hvit, pr ort 75 öre. — 10
2343. " azureus grandiflorus, blå . . . — 15
2344. " integerrimus, hvit . . . — 30
2345. " intermedius, hvit . . . — 15
Prydliga småbuskar m. talrika blmr. Pl. i löfjord; öfvervintras vid + 2 à 5° C.

Cereus, se Cactus

Cestrum; Hammarbuske, (Solanaceæ.)

2346. " aurantiacum, orangefärgad . . — 15
2347. " diurnum, hvit. — 30
Vackra träd eller buskar för fönsterodling, ha väluktande blommor. Fordra kraftig löfjord och + 10 à 15° C.

Chamapense, se bladväxter.

Chironia, (Gentianeæ.)

2348. " baccifera — 25
Särdeles vackert; planteras i med grof sand blandad ljung- och löfjord. Öfvervintras ljöst och luftigt vid + 5 à 10° C.

Chorizema, (Papilionaceæ.)

2349. " cordatum — 15
2350. " spectabile — 20
2351. " varium — 15
Småträd och buskar m. vackra röda blmr under våren och sommaren. Fordra sandblandad ljung- och löfjord, måttlig vattning och + 5 à 6° C.

Crysanthemum; Prestkrage, (Senecionideæ.)

2352. " frutescens (Argyranthem. frut.) — 20
2353. " indicum grandifl., bland. dubbla — 20
2354. " " pomponicum, småblommiga, blandade, dubbla — 25
2355. " japonicum, storbl., egendomlig — 35
Den förstn. har hvita blmr och är en värdefull gruppväxt. C. frut. bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd hvita blmr. De öfriga blomma i Okt., Nov. och Dec. och äro bland de tacksammaste höstblommor.

Cineraria; Askört, (Senecionideæ.)

2356. " hybrida, 1ma, blandade i alla färger, pr ort 5 rdr — 20
2357. " " atrocoerulea, mörkblå, utm. — 20
2358. " " coerulea, rent mörkblå, extra — 35
2359. " " carminea splendens, lysande, karminröd — 20
2360. " " kermesina, rent karmosinröd, extra — 20
2361. " " " alba, karmosinröd med hvitt centrum, utmärkt . — 40
2362. " " rubro violacea, rödviolett, ren, vacker färg — 30
2363. " " nana cupreata, mörkt kopparfärgad, skön — 35
2364. " " " kermesina alba, karmosinröd med hvitt centrum, utmärkt vackert — 35
2365. " " " miniata, lysande mönjeröd, präktig — 35
2366. " " " punicea, lysande koppar-karmosinröd — 35

å Port. Rmt Rd ö.

2367. Cineraria hybrida nana purpurea, purpurkarmosinröd, utmärkt . . — 40
2368. " hybrida nana rubro-violacea, rödviolett, ren, vacker färg . . — 35
2369. " " höga sorter, blandade . . — 25
2370. " " låga sorter, blandade . . — 25
2371. " Webbi (Pericallis) i flera färger — 30
Dessa utm. praktf. blmr behandlas så, som vi anm. om Calceolaria och blomma i så fall samtidigt med dem. För att få rätt stora blad- och blomrika ex., bör man, så snart rötterna nått krukans väggar, ompl. ex. i allt större krukor. Böra om vintern ej stå varmt, högst + 5° C. Den sistn. är mycket stor, ofta 3 à 4 fot hög. Öfriga sorter, se bladväxter.

Cissus, (Viniferæ.)

2372. " antarctica — 30
Rätt vacker rankväxt för boningsrum.

Citrus; Citron, Orange och Pomerans, (Aurantiaceæ.)

2373. " Aurantium, Apelsin, pr ort 60 ö. — 8
2374. " Bigaradia, Orange, pr ort 85 ö. — 10
2375. " Limonium, Limon, pr ort 60 ö. — 8
2376. " medica, Citron — 50
2377. " nobilis, Mandarinorange . . . — 20
Alla kunna lätt odlas i boningsrum.

Clematis, se slingerväxter.

Clerodendron, (Verbenaceæ.)

2378. " splendens, lysande röd — 10
Praktväxt med sköna blommor. Fordrar god löfjord och + 15° C.

Clanthus; Praktvioka, (Papilionaceæ.)

- " Dampierii, se ettåriga
2379. " puniceus, mörkröd. — 35
Omtyckt praktväxt. Fordrar under vintern en ljus plats, lagom vattning och + 15° C.

Clitoria, (Papilionaceæ.)

2380. " Ternatea — 10
Utmärkt vackra, blå eller hvita blmr. Odla under sommaren i varm drivbänk. Omplanteras i god löfjord så snart rötterna nå krukans väggar. Öfverv. vid + 15° C.

Cobaea, se slingerväxter.

Coccinea, se slingerväxter.

Coffea; Kaffeeträd, (Rubiaceæ.)

2381. " arabica, äkta, 5 frö — 50
Odlas i varmt hus vid + 15 à 20° C. Fordrar god, sandbl. löfjord, om vintern sparsam, men om sommaren ymnigare vattning, skydd mot solen och besprutning 2 à 3 gånger dagligen.

Commelina, se ettåriga blomsterväxter.

Convolvulus; Vinda, (Convolvulaceæ.)

2382. " mauritanicus, blå blommor . . — 25
Vacker, krypande växt med talrika blmr. Passar till amplar och plantering på fritt land. Öfvervintras vid + 5° C.

Cordyline, (Asphodoleæ.)

2383. " australis, (Dracena) — 50
2384. " indivisa aureo lineata (Dracena) — 30
Stätlig dekorationsväxt för tempererade växthus och boningsrum. Öfvervintras vid + 8, 10 à 15° C.

Correa, (Rutaceæ.)

2385. " alba, hvit — 30
2386. " speciosa, röd — 30

- à Port. Rmt Rd ö.
- Småbuskar eller träd med vackra, hängande blommor. Planteras i ljung- & löfjord och öfvervintras vid ± 5 à 10° C.
- Cosmophyllum**, (Ferdinanda) se bladväxter.
- Crassula**, (Crassulaceæ.)
2387. " *coccinea*, skarlakanröd — 15
 $1\frac{1}{2}$ à 2 fot hög med präktiga, vålluktande blommor. Fordrar ljung- och drifbänkjord, öfvervintras vid ± 5 à 6° C. Utplanteras om sommaren på grupper.
- Crotalaria**; *Skallerskida*, (Papilionaceæ.)
2388. " *arborescens* — 15
 2389. " *laburnifolia* — 15
 Vackra, trädlika växter med gula blommor. Planteras i ljung- & löfjord; öfvervintras vid ± 5 à 10° C.
- Cuphea**, (Lythriaceæ.)
2390. " *eminens* — 20
 2391. " *platycentra* (*ignea*) — 10
 2392. " *strigulosa* — 10
 2393. " *zimapanii*, pr ort 60 öre — 10
 Vackra, talrika rödgula blommor, kunna om sommaren utplanteras i det fria. Öfvervintras vid ± 5 à 10° C.
- Cyclamen**; *Jordbröd*, (Primulaceæ.)
2394. " *europæum* — 35
 2395. " *macrophyllum* — 35
 2396. " *persicum* — 35
 Små, låga, utmärkt prydliga, till en del om hösten framkomm. röda eller hvita blmr.
- Cystisus**; *Ärtbröd*, (Papilionaceæ.)
2397. " *Attleyanus* — 15
 2398. " *chrysobotris* — 30
 2399. " *floribundus* — 30
 2400. " *glabratus* — 20
 2401. " *racemosus* — 10
 Buskar eller smätträdd med hela året framkommande, gula vållukt. blmr. Planteras i löfjord och vattnas måttligt om vintern.
- Datura**; *Spikkubba*, (Solanaceæ.)
2402. " *arborea*, (Brugmansia suaveol.) — 15
 2403. " *Knightsii*, (Brugmansia) dubbel — 30
 Bekanta praktv. med stora, hvita trumpetform. vållukt. blmr. Trifvas mycket bra i boningsrum. Planteras i god, kraftig löf- och drifbänkjord. Behöfva ej ljus eller vatten om vintern.
- Daubentonia**, (Papilionaceæ.)
2404. " *magnifica* — 10
 2405. " *Tripetiana* (*punica*; *Pisceidea punicea*; *Aeschynomene miniata*) — 10
 Särdeles vackra. Om fröet säs tid, blomma de första året, men blifva större och starkare om de öfvervintras vid ± 5 à 10° C. Fordra god löf- och ljungjord samt måttlig vattning.
- Daviesia**, (Papilionaceæ.)
2406. " *acicularis* — 20
 2407. " *latifolia superba*. — 25
 Låga, vackra, nyholl. om våren med gulaktiga blommor prydda småbuskar. Planteras i sandblandad ljungjord och öfvervintras vid ± 5 à 10° C.
- Desmodium**, (Leguminosæ-Hedysanææ.)
2408. " *gyrans*, rörlig, 5 frö — 60
 Småbladen på denna märkvärdiga, 3 à 4 fot höga växt äro så känsliga för ljuset, att, då de träffas deraf, de röra sig taktmessigt upp och ned, så att det nästan
- à Port. Rmt Rd ö.
- ser ut som hade växten animaliskt lif. Fordrar god ljung- & löfjord, väl dränerade krukor, om somm. riklig vattning & luft samt om vintern en ljus plats och $\pm 15^{\circ}$ C.
- Didymocarpus**; *Dubbelfrukt*, (Gesneriaceæ.)
2409. " *Rexii* (Streptocarpus) — 10
 2410. " *polyanthos* — 10
 Örtartade; blommorna vackra, blå. Fordra löfjord och $\pm 15^{\circ}$ C.
- Dillwynia**, (Papilionaceæ.)
2411. " *cinerascens* — 15
 2412. " *floribunda* — 15
 Små, fina buskar med guldgula och eldröda blommor. Fordra sandblandad ljungjord, väl dränerade kärl, ljus och luft i mängd och ± 5 à 10° C.
- Diosma**, (Rutaceæ.)
2413. " *alba* — 20
 2414. " *capitata* — 20
 Fina, vålluktande buskar med hvita eller rödletta blommor. Behandlas som föreg.
- Dipteracanthus**, (Acanthaceæ.)
2415. " *paniculata*, 10 frö — 40
 2416. " *spectabilis*, 10 frö — 20
 Prydliga buskar med blå eller blåfärgade blommor. Fordra löfjord och $\pm 15^{\circ}$ C.
- Disemma**, (Passifloreæ.)
2417. " *coccinea*, (Passiflora coccinea) — 20
 2418. " *Herbertii* — 40
 Rankväxter med skarlakanröda blommor. Fordra löfjord och ± 10 à 15° C.
- Dracæna**; *Drakblodbröd*, (Asparagineæ.)
2419. " *Draco*, äkta — 25
 andra sorter, se Cordylina.
 Utmärkt ståtlig dekorationsväxt. Behöfver kraftig löfjord och $\pm 15^{\circ}$ C. Trifves förträffligt i boningsrum.
- Eccremocarpus** (*Calampelis*), se slingerv.
- Echinocactus**; *Igelkaktus*, (Cactææ.)
2420. " *candicans*, (Echinocereus) — 30
 2421. " *Ehrenbergii* (Echinocereus) — 30
- Echinopsis**; *Igelkaktus*, (Cactææ.)
2422. " *Decaisneana* — 30
 2423. " *multiplex* — 30
 2424. " *oxygona* — 30
 2425. " *tubiflora* — 30
 2426. " *turbinata* — 30
 Ofvanstående 9 sorter, 5 korn af hvarje, rdr 2,40.
 Egendomliga. Behandlas som Cactus.
- Edwardisia**, (Papilionaceæ.)
2427. " *chilensis*, 3 frö — 60
 2428. " *Mac Nabiana* — 30
 2429. " *microphylla* — 20
 Höga, praktfulla träd med fint löfverk och sköna, gula blmr. Planteras i löf- & ljungjord; öfvervintras vid ± 5 à 6° C.
- Entelea**, se bladväxter.
- Epacris**; *Epacris*, (Epacridææ.)
2430. " *hybrida*, flera sorter, blandade — 30
 Känd praktväxt. Planteras i sandblandad ljungjord; öfvervintras vid ± 5 à 8° C.
- Erica**; *Ljung*, (Ericaceæ.)
2431. " *arborea*, pr ort 1 rdr — 10
 2432. " *cinclina* — 20

å Port. Rmt Rd ö.

2433. *Erica multiflora* — 20
 2434. " *pyroliflora* — 20
 2435. " 52 olika species, blandade — 20
 Fröet utsås i fin, sandbl. ljunghjord; betäckes blott m. en glasskiva och hålles vid jemn fuktighet. Plant. i god luffjord, i väl dränerade kärl. Öfvervintnas framförallt ljust, torrt och luftigt vid + 3 å 5° C.

Erythrina; Korallbräd, (Papilionaceæ.)

2436. " *caffra* — 30
 2437. " *coraliodendron*, 2 frö — 50
 2438. " *crista galli*, pr ort 80 öre — 10
 2439. " *Hendersonii*, 2 frö — 50
 2440. " *laurifolia* — 15
 2441. " *viarum* — 25

Dessa utm. praktf. växter äro väl förtjenta af blomsterodlars uppmärksamhet. En del sorter, som *crista galli*, *laurifol.* m. fl., fälla om vintern sina blad, kunna då ställas afides och behöfva ej vatten. Om våren börja de åter visa tecken till lif, och böra då ompl. i väl dränerade kärl, i god, kraftig, sandbl. löfjord. Efter pl. böra de ställas något varmare. Under sommaren kan man använda dem ute eller i öppna växthus och boningsrum. De sorter som äro i jemn vegetation fordra om vintern + 15° C. och något fuktigt luft.

Eucalyptus, se bladväxter.

Eucemis; Puncttblja, (Asphodelæ.)

2442. " *punctatus* — 25
 Hålles torr om vintern; omplanteras om våren vid + 5 å 6° C.

Eugenia; (Myrtaceæ.)

2443. " *apiculata* — 25
 2444. " *Ugnii* — 20
 Prydliga, myrtenlika träd, med hvita, väl-luktande blmr. Fordra ljungh- och löfjord och + 5 å 10° C.

Fabricia; (Myrtaceæ.)

2445. " *kevigata* — 25
 Träd med vackert, blågrönt bladverk; fordrar ljungh- och löfjord och + 5° C.

Ferdinanda, se bladväxter.

Foueroya, se bladväxter.

Fuchsia; Bloddroppe, (Onagrarieæ.)

2446. " *arborescens*, trädlik — 15
 2447. " *coccinea* — 15
 2448. " *corymbiflora* — 15
 2449. " *alba* — 15
 2450. " *hybrida*, enkla & dubbla, bland. — 45

Att uppdraga fuchsier af frö är både tack-samt och intressant, enär man derigenom erhåller mycket kraftiga exemplar och ej sällan nya, vackra sorter.

Genista; Gråstuske, (Papilionaceæ.)

2451. " *canariensis*, (*Spartium albicans*) — 10
 2452. " *canicans*, (*Cytisus*) pr ort 40 öre — 8
 Busk- eller trädformiga växter, ständigt prydda med gula väl-luktande blommor. Planteras i löfjord; öfverv. vid + 5° C.

Gesneria, (Gesnerieæ.)

2453. " *cardinalis* — 30
 2454. " *splendens* — 30
 2455. " *zebrina* — 30

Praktf. varmbusväxter med sköna, skar-lakanröda blmr och vackra, sammetslika blad. Fröet bör ej betäckas med jord. Rotknölarne ligga torra om vintern och

å Port. Rmt Rd ö.

- ompl. om våren i god ljungh-, torf- och löf-jord, hvarefter de hållas varmt och fuktigt.

Gloxinia, (Gesnerieæ.)

2456. " *hybrida*, nyare sorter, blandade — 15
 2457. " " *erecta*, blandade sorter — 15
 2458. " " *grandiflora*, storblommig — 25
 2459. " " *pendula grandifl.*, häng. bl. — 30
 2460. " " *horizontalis grandiflora*, bl. — 15
 Utm. praktväxter, hvares blmr variera i alla nyanser af hvitt, blått, violett och rött o. s. v. De fordra en någorlunda jemn värme af + 15 å 20° C., fuktig luft, skugga, god, halfrutten löf- eller skogsgjord och väl dränerade krukor. Fröet bör ej betäckas med jord.

Goodia, (Papilionaceæ.)

2461. " *lotifolia* — 15
 Träd med talrika, gulbruna blmr. Fordrar löf- och ljunghjord och + 5 å 6° C.

Greigia, (Bromeliææ.)

2462. " *sphacelata* — 40
 Ananaslik, skön dekorationsväxt för tempererade växthus eller boningsrum.

Grevillea, (Proteaceæ.)

2463. " *robusta* — 30
 Vackert träd. Fordrar god löf- och ljunghjord, måttlig vattning och + 6 å 10° C.

Habrothamnus, (Solanaceæ.)

2464. " *elegans* — 15
 2465. " *Warszewiczii* — 20
 Prydliga med vackra blmr. Planteras i sandbl. löfjord; öfverv. vid + 5 å 10° C.

Hakea, (Proteaceæ.)

2466. " *acicularis* — 20
 2467. " *brachyryncha* — 20
 2468. " *saligna* — 20
 Särdeles vackra träd för tempererade hus. Planteras i sandblandad löf- & ljunghjord.

Hardenbergia, (Papilionaceæ.)

2469. " *Comptoniana* — 25
 2470. " *lucida* — 25
 2471. " *monophylla* — 20
 2472. " *ovata* — 20

Trädartade, något slingrande växter med mycket prydliga röda eller violetta blmr. Pl. i löf- och ljunghjord, vattnas måttligt och öfverv. vid + 5 å 10° C. Växa och blomma bättre om de planteras på fri grund i växthuset.

Hedychium; Kransblomster, (Scitamineæ.)

2473. " *Gardnerianum* — 10
 Stätlig dekorationsv. med vackra orange-färgade, starkt väl-luktande blommor i rika klasar. Planteras i kraftig löf- och drif-bänkjord. Öfvervintnas vid + 15° C.

Helichrysum; Strålblomster, eller Evgihetsblomster, (Senecionideæ.)

2474. " *Errera* — 20
 2475. " *fulgidum* — 25
 2476. " *speciosissimum* — 20
 Praktf. immorteller med röda, gula eller hvita blmr. Planteras i sandbl. ljungh- och löfjord. Öfverv. vid + 5 å 10° C.

Heliotropium; Heliotrop, (Verbenaceæ.)

2477. " *peruvianum*, blandade — 15
 Bekanta och för sin vaniljlika väl-lukt omtyckta blmr. Kunna lätt odlas i boningsrum. Präktiga till utplamt. på grupper.

å Port. Rmt Rd ö.

Hibiscus; Ibisblomster, (Malvaceæ.)

2478. " *coccineus* (*speciosus*) — 12
 2479. " *heterophyllus* (*grandiflorus*) — 40
 2480. " *liliiflorus* — 25
 2481. " *Manihot* — 10
 2482. " *Moscheutos* — 10
 2483. " *mutabilis* — 20
 2484. " *rosa sinensis* — 40
 2485. " " *Parkerii* — 50
 2486. " " *rubrus* — 50
 2487. " *syriacus* — 15

Alla 10 sorterna rdr 2,45.

Af dessa utm. praktf. växter äro alla med undantag af *H. coccineus* och *Moscheutos*, busk- eller trädartade. De nyssn. sorterna hafva fleråriga rötter, som böra ompl. om våren i god, kraftig löfjord och nägorlunda vida krukor. Alla sorterna utmärka sig för vackra blad och sköna, liljelika, röda, hvita eller gulaktiga blmr. De flesta kunna äfven odlas i boningsrum. *H. Moscheutos*, *rosa rubrus* och *syriacus* öfverv. vid + 5°, *H. coccineus* och heteroph. vid + 8 à 10° och de öfriga vid + 15° C.

Humea, (Senecionideæ.)

2488. " *elegans* (*Calomeria amaranthoides*) — 25
 Tvåårig vacker växt. Öfverv. nära glasat vid + 5 à 6 C. Ompl. om våren i större kärl, eller utplanteras på solrika platser i det fria. Är i förening med andra växter vacker till grupper.

Indigofera; Indigobuske, (Papilionaceæ.)

2489. " *australis*, rosenröd — 10
 2490. " *coccinea*, mörkröd — 35
 2491. " *Dosua* (*doina*) lilafärgad — 10
 2492. " *sylvatica*, rosenröd — 25
 2493. " *tinctoria*, *Äkta Indigo* — 15

Mycket prydliga och blomrika småbuskar. Plant. i sandbl. löf- och drifbänkjord, i lej alltför stora, väl dränerade krukor. Öfverv. vid + 3 à 5° C. Äro ömtåliga för mycken väta hvarföre det är bäst att under kalla eller väta somrar behålla den underglas. Kunna äfven odlas i boningsrum.

Kennedyia, (Papilionaceæ.)

2494. " *Baumannii* — 25
 2495. " *prostrata* — 20
 2496. " *rubicunda* — 10
 Slingerväxter med talrika röda eller violetta blommor. Planteras i löf- och ljungjord. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.

Lagerstromia, (Lythariæ.)

2497. " *indica* — 25
 2498. " *Reginæ* — 25
 Dessa, om de väl behandlas, utm. prydl. träd, förtjena en plats i hvarje växtsamling. Plant. i kraftig löfjord. Öfverv. vid + 8 à 10° C. Måste om våren skarpt tillbakaskäras och ställas varmt, då några år gamla plantor villigt utveckla sina i långa ax sittande, präktiga, röda blommor.

Lantana, (Verbenaceæ.)

2499. " *hybrida*, blandade i många sorter — 8
 pr ort 60 öre.
 Bland de bästa och praktf. växter för grupper. Öfvervintnas vid + 8 à 10° C. Fortplantas höst och vår genom sticklingar.
Lapageria, se slingerväxter.

Laurus; Lager, (Laurineæ.)

å Port. Rmt Rd ö.

2500. *Laurus Benzoin; Benzointräd* — 15
 2501. " *nobilis, Lagerbärträd*, pr ort 10 ö. — 5
 Fordra löf- och drifbänkjord; + 3 à 5° C.

Lavatera, se bladväxter.

Leptospermum; Söderhafsmyrten, (Myrtaceæ.)

2502. " *baccatum* — 30
 2503. " *flavescens* — 35
 2504. " *lanigerum* — 35
 2505. " *scoparium* — 35
 Vackra träd med fina blad och talrika, hvita eller rödletta blmr. Planteras i löf- och ljungjord. Öfverv. vid + 3 à 5° C.

Lilium; Lilja, (Liliaceæ.)

2506. " *auratum* — 60
 2507. " *giganteum* — 50
 Utmärkta. Fröet grov långsamt och uppkommer ofta först följande år.

Linum; Lån eller Hör, (Lineæ.)

2508. " *arboresum*, trädartad, gul — 30
 2509. " *flavum*, gul — 15
 Utmärkt vackra med nägorlunda stora blmr. Pl. i god löfjord; öfverv. vid + 5 à 8° C.

Lisianthus; (Gentianeæ.)

2510. " *Rusellianus* — 20
 Fröet af denna sköna växt, likasom af alla gentianeæ grov långsamt och öjmnt. Det utsås om våren och betäckes ej med jord. En glasskiva lägges öfver krukan, som sedan ställs i en ljum drifbänk och hålles lagom fuktig. De små plantorna omskolas först och planteras sedan, hvar för sig, i allt större och större krukor. Fordra under sommaren en luftig, sval och skuggig plats samt rikligt vatten. Blommorna äro stora, utmärkt sköna, violetta.

Lobelia. (Lobeliaceæ.)

2511. " *fulgens* — 25
 2512. " *Queen Victoria* — 25
 2 à 3 fot höga med lysande skarlakaröda blmr i långa ax. Praktfulla till grupper på fritt land. Fortplantas genom delning. Öfvervintnas vid + 3 à 5° C.

Lophospermum, se slingerväxter.

Lotus; Giggelsärter, (Papilionaceæ.)

2513. " *australis* — 30
 2514. " *Jacobæus* — 25
 Prydliga småbuskar med mörkröda blmr Pl. i löfjord. Öfverv. vid + 5 à 8° C.

Mahonia, (Berberideæ.)

2515. " *aquifolia* pr ort 20 öre — 8
 2516. " *repens* pr ort 20 öre — 5
 Vackra buskar med styfva, glänsande blad och guldgula blmr i stora klasar. Kunna under betäckning odlas på kalljord.

Malva; Kattost, (Malvaceæ.)

2517. " *californica* pr ort 50 öre — 8
 2518. " *lateritia* — 25
 Träd med talrika röda blmr. Plant. i löfjord. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C. Kunna äfven odlas i boningsrum.

Mandevilla, (Apocynæ.)

2519. " *suaveolens* (*Echites*) — 12
 Vacker slingerväxt med väluktande blmr. Pl. i löfjord. Öfverv. vid + 8 à 10° C.

Medeola, (Asparagineæ.)

2520. " *asparagoides* — 40
 Vacker till amplar. Fordrar löfjord och + 1 à 5° C.

å Port. Rmt Rd ö.

Melaleuca; Cajuputräd, (Myrtaceæ.)

2521. „ deussata (pumila; tetragona) — 30
eller parviflora) — 30
2522. „ ericefolia (nodosa) — 30
2523. „ erubescens (ericifolia) — 30
2524. „ hypericifolia — 30
2525. „ linarifolia (Metrosideros hysopif.) — 30
Mycket prydliga träd- och buskar, med fina blad och röda, violetta eller gulgröna blmr. Planteras i löf- och ljungjord; beskåras ärligen. Öfverv. vid + 5 à 10° C. Lemna utmärkt buketträd.

Melanthus, se bladväxter.

Mesembryanthemum; Isplanta, (Ficoideæ.)

2526. „ acinaciforme — 15
2527. „ coccineum — 15
2528. „ cruciatum — 15
2529. „ edule — 15
2530. „ grandiflorum — 15
Utmärka sig för egendomliga former och vackra blmr. Tacksamma för odling i boningsrum.

Metrosideros, (Myrtaceæ.)

2531. „ coccinea — 30
2532. „ lanceolata — 30
2533. „ pendula — 30
2534. „ rigida — 20
2535. „ robusta — 30
2536. „ semperflorens — 15
2537. „ viridiflora — 25

Alla 7 sorterna rdr 1,50.

Praktträd för boningsrum och kalla växtlms. Blommorna lysande, skarlahan- eller ljusröda, gul- eller grönaktiga. Planteras i löf- och ljungjord.

Mimosa, se ettåriga växter.

Musa; Pisang eller Bananas, (Musaceæ.)

2538. „ speciosa — 35
Tropisk praktväxt med stora blad. Öfvervintnas vid + 15° C.

Muschia, (Campanulaceæ.)

2539. „ Wollastonii — 15
Stätlig växt med stora, vackra blad och gulgröna blmr, sittande i nära 2 fot höga vippor. Fordrar kraftig jord och stora krukor. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.

Mutisia, (Compositæ.)

2540. „ retrorsa — 25
Skarlahanröda blommor; utplanteras om sommaren på kalljord.

Myoporium; Musnat, (Myoporineæ.)

2541. „ ellipticum (Pogonia glabra) — 25
2542. „ floribundum — 25
Prydliga träd äfven för boningsrum. Planteras i ljung-, torf- och löfjord. Öfverv. vid + 5 à 10° C.

Myrtus; Myrten, (Myrtaceæ.)

2543. „ communis, vanlig, pr ort 20 öre — 5
2544. „ „ boëtica, . . . pr ort 50 öre — 8
2545. „ „ italica fructo nigro — 10
2546. „ „ tarantina — 10
Trifvas väl i ej för varma boningsrum.

Nerium; Oleanderbuske, (Apocynææ.)

2547. „ Oleander, blandade, pr ort 70 ö. — 10
2548. „ „ atropurpureum, mörkröd . . . — 15

å Port. Rmt Rd ö.

2549. Nerium Oleander fl. albo, hvit, pr ort 75 öre — 10
Kända och omtyckta kammarväxter.

Nierembergia, (Solanaceæ.)

2550. „ frutescens — 30
2551. „ gracilis — 10
Utmärkt prydliga småbuskar med vackra blåhvita blommor. Planteras i lätt löfjord. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.

Opuntia; Fikonkaktus, (Cactææ.)

2552. „ ficus indica, ätbar frukt — 40
2553. „ „ fr. albis, hvit frukt — 50
2554. „ „ atropurpureis, mörkr. fr. — 50
2555. „ „ luteus, gul frukt — 50
Högst egendoml. formade. Fordra samma behandl. som kaktus; trifvas i boningsrum.

Panax; Kraftrot, (Araliææ.)

2556. „ angustifolium — 25
2557. „ dendroides — 25
2558. „ Murrayii — 25
Pryktiga dekorationsväxter. Planteras i löfjord. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.

Panicum, se dekorationsgäs.

Passiflora; Passionsblomster, (Passiflorææ.)

2559. „ alba (Granadilla), hvit — 20
2560. „ coerulea, blå — 15
2561. „ „ grandiflora, storblomm., blå — 15
2562. „ edulis (Granadilla), ätbar frukt — 20
2563. „ gracilis — 20
2564. „ rubro-coerulea, violett — 20

Alla 6 sorterna 90 öre.

Slingerv. med utmärkt vackra, egendoml. blmr. Förträffliga till beklädnad af pelare, murar, o. s. v. i varma eller temp. växtlms; kunna äfven fördelaktigt odlas i boningsrum. Plant. i god löfjord och fortplantas genom sticklingar.

Pelargonium, (Geraniææ.)

2565. „ hybridum, storblommiga, Engelska sorter, blandade — 40
2566. „ „ diadematum — 40
2567. „ „ Odiér (Pel. à cinq. macules) — 30
2568. „ „ Fancy, Fantasi-pelargonium — 30
2569. „ „ scarlet, blandade sorter — 20
2570. „ „ Tom Thumb, låga — 20

Kända, omtyckta kammar- och grupp. Efter frösådd får man ofta nya och intressanta sorter.

Persea; Avgatoträd eller Maderalager, (Laurineæ.)

2571. „ indica (Laurus) pr ort 50 öre — 10
Träd med prydliga väluktande blad, men oansenliga blmr. Behandl. som vanlig lager.

Pericallis, se Cineraria.

Petunia, se modeblommor.

Phormium; Ny-Zelandslin, (Asphodoleæ.)

2572. „ tenax — 20
Pryktig dekorationsväxt. Frötet groor långsamt. Öfvervintnas vid + 1 à 5° C.

Poinciana, (Leguminosææ-Cæsalpineæ.)

2573. „ Gilliesii (Cæsalp.), pr ort 30 öre — 5
2574. „ pulcherrima (Cæsalpinia) — 15
2575. „ Regia (Cæsalpinia) — 50
Träd med fint, vackert löfverk och praktfulla blmr. Planteras i löf- och ljungjord. Öfverv. vid + 10 à 15° C. Blifva större

å Port. Rmt Rd ö.

och vackrare om de planteras i växthusets fria grund.

Primula; Majnyckel, (Primulaceae.)

2576. " sinensis albo, hvit — 30
 2577. " " albo pl., hvit, dubbel — 60
 2578. " " cupreata, kopparröd — 20
 2579. " " erecta superba, kopparcarminröd — 30
 2580. " " " alba, hvit — 40
 2581. " " " fimbriata alba, fransad, hvit — 20
 2582. " " " alba globosa, ny utmärkt — 40
 2583. " " " rubra globosa, ny, utm. — 40
 2584. " " " Kermesina splendens, lysande carminröd — 35
 2585. " " " lilacina alba marginata, ny, utmärkt — 50
 2586. " " " purpurea, purpurröd — 30
 2587. " " " rubra, röd, extra — 20
 2588. " " " striata, hvit med rödt — 30
 2589. " " " macrophylla (lilicifolia) alba, hvit, storbladig — 20
 2590. " " " rubra, röd — 30
 2591. " " " striata, strimmig — 30
 2592. " " " rubra, vanlig, röd — 10
 2593. " " " striata, vanlig strimmig — 15
 2594. " " " blandade sorter — 20

Alla 19 sorterna rdr 4,50.

12 vackra sorter . 3,50.

Dessa utm. prydl. och tacksamma växter blomna nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blom saknas. Fröet säas om våren, helst i god, lätt sandbl. lög- och ljungjord och betäckes föga. De besådda kärnen ställas i en lagom varm drifbänk, hvarest de få kvarstå till dess plant. fått 3 à 4 blad, då de ompl. 2 tum ifrån hvarandra, i andra käril. När plant. fått tillräcklig styrka ompl. de, hvar för sig i 3 à 4 tumskrukor och ställas antingen i en kall drifbänk eller i växthus och vattnas rikligt. Öfverv. nära glaset vid + 5 à 6° C. De dubbla sorterna fortplantas om våren genom sticklingar.

Protea; Silfverträd, (Proteaceae.)

2595. " mellifera — 20
 2596. " strobilina — 40
 Plant. i ljungjord; öfverv. vid + 5 à 6 C.

Psidium; Guajavaträd, (Myrtaceae.)

2597. " Cattleyanum — 20
 2598. " pomiferum — 15
 2599. " pyriferum (Guajava pyriforme) — 15
 Sköna träd med ätbara, utm. välsmakande frukter. Plant. i kraftig lög- & drifbänksjord. Fordra om sommaren rikligt vatten och luft, om vintern + 10 à 15° C. De bära frukt redan som helt unga exemplar.

Punica; Granaträd, (Granateae.)

2600. " Granatum, Granatäpple — 10
 2601. " nana, Dverggranat — 15
 Prydnadsräd, som fälla bladen om vintern och därför under denna tid hålla tillgodo med hvarje frostfri plats. Planteras i god lög- och drifbänksjord.

Rhodochiton; Rosenlädning, (Scrophulariaceae.)

2602. " volubile (Lophosperm. Rhodoch.) — 20
 Praktfull slingerväxt för tempererade växt-

å Port. Rmt Rd ö.

hus. Ömtällig för öfverlödig väta. Har talrika egendomliga, purpurfärgade blommor.

Rhododendron; Alpros, (Ericaceae-Rhododaceae.)

2603. " arboreum hybr., blandade sorter — 30
 2604. " Catawbiense hybr., många sorter — 30
 2605. " hybridum, många sorter — 30
 2606. " ponticum, blandade sorter — 10
 Fröet säas i ljungjord och betäckes mycket tunnt, men hålles jämt fuktigt. De unga plantorna odlas de första åren under glas.

Rivinia, (Phytolaceae.)

2607. " brasiliensis — 20
 2608. " humilis — 20
 Dessa småbuskar odlas för sina vackra, röda frukter. Planteras i lögjord. Öfverv. intras vid + 15° C.

Roelia; Daggört, (Campanulaceae.)

2609. " ciliata (reticulata). — 50
 Praktfulla med stora, klockformiga, hvita och blå blmr. Planteras i lätt, sandblandad ljungjord och väl dränerade krukor. Öfverv. intras vid + 5 à 8° C.

Salvia; Salvia, (Labiatae.)

2610. " albo-coerulea — 50
 2611. " candelabrum — 50
 2612. " patens, 5 frö — 75
 Dessa praktv. plant. i god lögjord. Omplanteras om våren. Öfverv. intras vid + 5 à 8° C. Fortplantas genom sticklingar.

Schizostylus, (Trideae.)

2613. " coccinea — 40
 Skön; blommor om vintern med stora, skarlakaröda blommor. Planteras i lögjord. Öfverv. intras vid + 5 à 10° C.

Sempervivum; Tuldök, (Crassulaceae.)

2614. " aureum (calyciforme) — 30
 2615. " tabulaforme — 30
 Odlas för sina vackra, besynnerliga former.

Solanum; Trollbär, (Solanaceae.)

6616. " capsicastrum . . . pr ort 50 öre — 8
 6617. " Pseudocapsicum . . . pr ort 40 öre — 5
 öfriga arter, se bladväxter.
 Utmärkt för sina vackra, orange frukter. Plant. i lögjord; öfverv. vid + 5 à 6° C.

Sparmannia, (Tiliaceae.)

2618. " africana — 35
 Störväxt träd med stora, ljusgröna blad och blommor. Fordrar lög- och drifbänksjord och + 4 à 5° C.

Statice; Ormrot, (Plumbagineae.)

2619. " arborea — 30
 2620. " grandiflora — 30
 2621. " macrophylla — 20
 Utmärkt vackra växter, hvars blmr kunna förvaras afskurna och användas i vinterbuketter. Planteras i lögjord; öfverv. intras vid + 4 à 5° C.

Streptocarpus, se Didymocarpus.

Sutherlandia, (Papilionaceae.)

2622. " frutescens pr ort 50 öre — 8
 2623. " " speatabilis floribunda — 10
 Vackra, något buskartade med talrika röda blmr. Öfverv. så nära glaset som möjligt vid + 5 à 8° C. och vattnas sparsamt. Om våren utplanteras de på passande ställen à rikt land, då de utbildas sig till yfviga, riktblommande buskar.

å Port. Rmt Rd ö.

Swainsonia, (Papilionaceæ.)

2624. " coronillaefolia — 30
2625. " Grayana — 20
2626. " Osburnii — 25
2627. " purpurea grandiflora — 30
Verkliga prydnadsväxter. Kunna behandl.
som föregående, hvilka de mycket likna.

Tacsonia, (Passifloreæ.)

2628. " ignea — 40
2629. " splendens — 45
Präktiga slingerväxter för temp. växthus
och boningsrum. Plant. i lbf- & ljungjord.

**Tamarindus; Tamarind, (Leguminosæ-
Cæsalpinææ.)**

2630. " indicus, 2 frö — 50
Högt träd med prydl. löfverk. Frukten
erhålls på apoteken under namn af ta-
marinder. Plant. i lbf- och drifbänksjord.
Öfvervintras vid + 15 å 20° C.

Teucrium; Gamander, (Labiatae.)

2631. " Marum (Marum verum) Kattört — 30
Utm. för sin starka, men behagliga lukt.
Bör aktas för kattor, som tycka om lukten.
Thunbergia, se slingerväxter.

**Trachelium; Plymbomster, (Campanu-
laceæ.)**

2632. " coeruleum, blå . . . pr ort 1 rdr — 10
2633. " album, hvit — 10
Tvåårig; öfvervintras vid + 4 å 6° C.
och utplanteras om våren på grupper,
hvar till den är utmärkt vacker.

Tritomanthe, (Asphodoleæ.)

2634. " Uvaria grandiflora (Tritoma
Uvaria; Veltheimia speciosa;
Alestris Uvar; Kniphofia Uvar) — 25
Stättlig prydnadsv. med talrika cylindert,
brandgula blmr, som knippevis nedhånga
från toppen af den 2 å 3 fot höga stängeln.
Pl. i god, kraftig lbf- och drifb.-jord; utpl.
om sommaren. Öfverv. vid + 4 å 6° C.

Tydaea (Gesneriaceæ.)

2635. " nya sorter, blandade — 25
Dessa med Gesneria, Achimenes & Glox-
inia nära befrämdade prydnadsblmr äro ut-
märkt vackra och tacksamma. Rötterna,
som under vintern ligga aldeles torra,
omplanteras om våren i halfrutten skogs-
eller löfjord, hvarest de ställas varmt
och hållas lagom fuktiga. Behandlas eljest
som Achimenes.

Verbena; Jernört, (Verbenaceæ.)

2636. " hybrida, i praktf. sort, p. ort 1 rdr — 25
2637. " storblomm., aldrr bästa sorter — 25
2638. " striata, nya italienska . . . — 35

å Port. Rmt Rd ö.

2639. Verbena hybrida coccinea, skar-
lakanröd — 35
2640. " hybrida coerulea, blå — 25
2641. " " alba pura, rent hvit — 35
2642. " teucrioides, hvit, vålluktande — 8
pr ort 60 öre.

Alla 7 sorterna rdr 1,75.

Verkliga praktväxter såväl för grupper,
som för krukor.

Veronica; Årenpris, (Scrophulariaceæ.)

2643. " Andersonii — 20
2644. " Lindleyana — 20
2645. " många sorter, blandade — 20

Träd- eller buskartade, utmärkt vackra
och tacksamma växter för temp. växthus
och boningsrum. Om de i Juni utpl. på
fritt land i god jord blifva de stora och
lummiga samt utveckla under hösten, vin-
tern och våren talrika blmr. Fortpl. lätt
genom sticklingar, hvilka, tagna om våren,
följande höst blomma.

Viburnum; Snöboll, (Caprifoliaceæ.)

2646. " rugosum (rigid.; strictum; latifol.) — 15
2647. " Tinus (Laurus Tin.) p. ort. 20 ö. — 5
Träd eller buskar med glatta, lagerlika
blad och hvita blmr. Plant. i lbf- och
drifbänkjord. Öfverv. vid + 1 å 5° C.

Vinca. (Apocynææ.)

2648. " rosea — 10
2649. " " fl. alba — 10

Dessa prydliga växter plant. i kraftig löf-
jord och öfverv. vid + 12 å 15° C. Odlas
under sommaren bäst i en lagom varm
kast. Användes under blomningstiden till
dekorerung. Blmrna framkomma i mängd
och äro stora, ljusröda eller rent hvita.

Wigandia, se bladväxter.

Yucca; Palmolja, (Liliaceæ.)

2650. " aloefolia pr ort 60 öre — 8
2651. " " fol. var. — 15
2652. " " rosea — 30
2653. " " rubra — 30
2654. " " Draconis — 40
2655. " " gloriosa — 20

Alla 6 sorterna rdr 1,10.

Stättliga dekorationsväxter med praktfulla
hvita eller hvitgula, vålluktande blommor.
Fodra kraftig jord och + 5 å 10° C.

- Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:
100 sorter krukväxter rdr 15 —
50 " krukväxter " 8 —
25 " utmärkta krukväxter " 4,50
12 " " krukväxter " 2,50

D. Frö till Ormbunkar.

(Filices.)

Groddkornen (sporer) af ormbunkarne motsvara fröet af de phanerogama växterna och kunna sås när som helst. De sås i vanliga, flata fröfat eller i brist på sådana i vanliga krukor, på hvars bottnar man lägger ett starkt lager af sönderstötta tegelbitar eller träkol, hvarpå lägges god, half-
rutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för en så stark hetta, att alla i densamma förut be-
fruktliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jemnad på ytan, utsås grodd-
kornen och nedtryckas lindrigt med en passande, stålglad träbit, hvarest krukorna öfvertäckas
med glasskivor, på det att inga främmande frö eller sporer af andra ormbunkar må kunna blanda

sig med det sådda. För att yttermera förhindra detta, äfvensom för att ej bortskölja eller rubba de sådda sporerne, vattnas krukningarna nedifrån genom att nedsänkas uti andra, vattenfyllda kärl. Hufvudvikoren för ett godt resultat äro: jemn värme, fuktighet och slugga. När plantorna uppnått såpass storlek att de kunna fattas med fingrarne, ompl. de, först i små, sedan i större och större krukor. Under första året är vanl. 2 å 3 ompl. nödvändiga, men sedan exempl. uppnått sin naturliga storlek behöfva en del sorter blott ompl. en gång årligen, andra deremot en gång hvarvannat, tredje, fjerde eller femte år, allt efter de olika sorternas beskaffenhet. De med C märkta sorterna fordra om vintern + 10 å 15°, de med T + 5 å 8° C. De öfriga sorterna tåla vintern på kall jord.

å Port. Rmt Rd ö.

2656.	Adiantum Capillus Veneris, T.	— 10
2657.	„ concinnum, T.	— 20
2658.	„ Cunninghamii, C.	— 25
2659.	„ Chilense, T.	— 25
2660.	„ concinnum latum, C. T.	— 25
2661.	„ decorum, T.	— 20
2662.	„ formosum, T.	— 25
2663.	„ lunatum, T.	— 30
2664.	„ pubescens, T.	— 15
2665.	„ sp. st. Catharina, C.	— 25
	Alla 10 sorterna rdr 1,25.	
2666.	Allosurus atropurpureus, T.	— 20
2667.	Alsophila australis, T.	— 15
	Stor, trädartad, utmärkt vacker.	
2668.	Aspidium caripence, T.	— 20
2669.	„ glabellum	— 25
2670.	„ serra, C.	— 25
2671.	„ trifoliatum, C.	— 25
2672.	„ violascens, C.	— 10
	Alla 5 sorterna 95 öre.	
2673.	Asplenium Belangeri, C.	— 25
2674.	„ bulbiferum, T.	— 10
2675.	„ erectum, C.	— 10
2676.	„ glaberrimum, C. T.	— 25
2677.	„ marinum, T.	— 15
2678.	„ Nidus, C.	— 50
2679.	„ præmorsum, C.	— 25
2680.	„ tovarense, T.	— 15
	Alla 8 sorterna rdr 1,60.	
2681.	Athyrium (Aspidium) Filix fœm. multiceps	— 25
2682.	„ (Aspid) Filix fœm. purpureum	— 20
2683.	„ „ Filix fœm. laciniatum dissectum	— 25
2684.	„ „ „ fœm. thysanotum	— 20
2685.	„ „ „ „ diffusum	— 20
2686.	„ „ „ „ multifurcatum	— 25
2687.	„ „ „ „ defusso-multifidum	— 25
2688.	„ „ „ „ flexuosa	— 25
	Alla 8 sorterna rdr 1,70.	
2689.	Blechnum boreale	— 20
2690.	„ brasiliense, trädartad, C.	— 15
2691.	„ fraxineum, C.	— 15
2692.	„ glandulosum, C.	— 15
2693.	„ occidentale, C.	— 20
2694.	„ Patersonii, C.	— 20
	Alla 6 sorterna 90 öre.	
2695.	Cenopteris japonicus, C.	— 10
2696.	Cibotium Schideii, C.	— 25
	Utmärkt; bladen ofta 8 å 10 fot långa.	
2697.	Cyrtomium atratum, T.	— 20
2698.	„ falcatum, T.	— 20
2699.	„ fortunei, T.	— 20

å Port. Rmt Rd ö.

2700.	Cystopteris fragilis var. obtusa	— 20
2701.	Didymochlæna lunulata, C.	— 25
	Stor, praktfull ormbunke.	
2702.	Doodia aspera, C. T.	— 10
2703.	„ caudata, T.	— 10
2704.	„ lunulata, T.	— 10
2705.	Doryopteris palmata, C.	— 25
2706.	Gymnogramma davallioides, C.	— 25
2707.	„ elegantissima, C.	— 30
2708.	„ hybrida, C.	— 15
2709.	„ Laucheana gigantea, C.	— 30
2710.	„ l'Herminieri, C.	— 25
2711.	„ Martensii	— 15
2712.	„ tatarea	— 10
	Alla 7 sorterna rdr 1,30.	
2713.	Lastrea augescens, C.	— 10
2714.	„ æmula	— 20
2715.	„ dilatata	— 15
2716.	„ „ angustispinula	— 20
2717.	„ Filix mas.	— 15
2718.	„ „ mas. cristata angulata	— 20
2719.	„ „ furcans	— 20
2720.	„ „ spinulosa	— 20
2721.	„ mollis, C.	— 10
2722.	„ Opaca	— 15
2723.	„ pindare	— 15
	Alla 11 sorterna rdr 1,60.	
2724.	Lomaria gibba, C., praktfull	— 20
2725.	Nephrolepis exaltata, C.	— 25
2726.	„ tuberosa, C.	— 25
2727.	Phegopteris interruptum, T.	— 25
2728.	„ spectabilis, C., trädartad	— 25
2729.	Polybotrya quercifolia, C.	— 30
2730.	Polypodium aureum, C.	— 20
2731.	„ cæspitosum, C.	— 20
2732.	„ glaucum, C.	— 20
2733.	„ leirhizon, C.	— 20
2734.	„ metamorphum, C.	— 20
2735.	„ paradise, C.	— 15
2736.	„ tæniosum, C.	— 20
2737.	„ vulgare	— 5
2738.	„ auritum	— 15
	Alla 9 sorterna rdr 1,40.	
2739.	Polystichum angulosum	— 10
2740.	„ cristatum	— 10
2741.	„ gracile	— 10
2742.	„ latipes	— 10
2743.	„ lobatum, C.	— 10
2744.	„ proliferum	— 20
2745.	„ Pungens	— 10
	Alla 7 sorterna 65 öre.	
2746.	Pteris argyrea, C.	— 25
2747.	„ cretica fol. var., C. T.	— 10

	å Port.	Rmt Rd ö.
2748. <i>Pteris geraniifolia</i> , C.	—	25
2749. " <i>glaucovirens</i> , C.	—	25
2750. " <i>longifolia</i> , C.	—	10
2751. " <i>semipinnata</i> , C.	—	25
2752. " <i>serrulata</i> , C. T.	—	10
2753. " " <i>cristata</i> , C. T.	—	10
2754. " " <i>variegata</i> , C. T.	—	10
Alla 9 sorterna rdr 1,35.		
2755. <i>Scolopendrium crenatum</i>	—	20
2756. " <i>digitatum</i>	—	20
2757. " <i>glomeratum</i>	—	20
2758. " <i>laciniatum</i>	—	20

	å Port.	Rmt Rd ö.
2759. <i>Scolopendrium muricatum</i>	—	20
2760. " <i>officinatum digitatum</i>	—	20
2761. " " <i>variabile</i>	—	20
2762. " <i>ramo-marginatum</i>	—	20
2763. " <i>transersolobatum</i>	—	20
2764. " <i>variabile</i>	—	20
Alla 10 sorterna rdr 1,75.		
2765. <i>Strupthiopteris germanica</i>	—	10
Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:		
50 sorter Ormbunkar	rdr	7—
25 " Ormbunkar för växthus	"	4,25
12 " " för fritt land	"	2—

E. Frö till Barrväxter.

(Coniferæ.)

Fröet till många sorter utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter t. ex. *Juniperus*, *Taxus m. fl.* ett år och deröfver — i jorden innan det gror och det händer derföre stundom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket tillstånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då åter upplockas och sås i ny, frisk jord. För att påskynda groningen plägar man låta fröet ligga någon tid, innan det sås, i ljumt vatten, hvarigenom det kärnan omgifvande skalet uppmjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jordblandn. för dessa växter är: lika delar grästorfjord, löf- och ljungjord, blandad med grofsand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamma från trakter, der medeltemperaturen är $+8$ à 10° C., hvarföre de hos oss ej tåla vintern på kalljord; men planterade i baljor eller krukor och öfvervintrade vid $+1$ à 5° C. utveckla sig de flesta sorterna till praktfulla exemplar. Många barrträd hålla under vintern tillgodo med ganska anspråkslösa platser, bakom ställagen i kalla växthus, i oöftrade boningsrum eller torra och någorlunda ljusa källare. De äro särdeles användbara till dekorationer, om sommaren i det fria och om vintern i växthus och boningsrum. De med ett T utmärkta sorterna öfvervintras så, som ofvan är nämnt; de med B planteras på kalljord och betäckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute på fritt land.

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Abies; Gran, (Abietinæ.)		
2766. " <i>acutissima</i>	—	10 — 60
2767. " <i>alba</i> (A. <i>glauca</i> ; <i>Picea alba</i> ; <i>Pinus alba</i>)	—	10 — 60
2768. " <i>canadensis</i> (<i>Picea</i> ; <i>Tsuga canadensis</i>)	—	5 — 30
2769. " <i>oxelsa</i> (<i>Pinus Abies</i>) <i>Vanlig Gran</i> , pr $\text{t}.$ rdr 1,50 — 5 — 5 pr 100 $\text{t}.$ 145 rdr.	—	5 — 5
2770. " <i>nigra</i> (A. <i>Mariana</i> ; <i>Pinus nigra</i> ; <i>Pin. marylandica</i>) — 8 — 50	—	—
2771. " <i>orientalis</i> , utmärkt vacker — 25 — —	—	—
2772. " <i>rubra</i> (A. <i>nigra rubra</i> ; A. <i>arctica</i> ; <i>Picea rubra</i> ; <i>Pinus americana</i>) <i>Amerikansk Rödgran</i>	—	10 — 75
Callitris, (Cupressinæ.)		
2773. " <i>australis</i> (<i>Cupressus</i>) T.	—	15 — —
2774. " <i>cupressiformis</i> , T.	—	30 — —
Casuarina, se krukväxter.		
Cedrus; Ceder, (Abietinæ.)		
2775. " <i>atlantica</i> , <i>Heitceder</i> , T.	—	25 — —
2776. " <i>Libani</i> (<i>Pinus Cedrus</i>) <i>Libanonsceder</i> , T.	—	25 — —
Chamaecyparis, (Cupressinæ.)		
2777. " <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupressinæ thyoides</i>) T. B.	—	20 — —

	å Port.	Ort.
	Rmt Rd ö.	Rd ö.
Cryptomeria, (Cupressinæ.)		
2778. " <i>japonica</i> , T.	—	5 — 30
2779. " " <i>Lobbi</i> , T.	—	12 — —
Cunninghamia, (Abietinæ.)		
2780. " <i>sinensis</i> , T.	—	12 — —
2781. " <i>glauca</i> , T.	—	25 — —
Cupressus; Cypress, (Cupressinæ.)		
2782. " <i>elegans</i> , T.	—	15 1—
2783. " <i>funeris</i> (<i>pendula</i>) T.	—	10 — 75
2784. <i>Goveniana</i> , T.	—	15 1—
2785. " <i>glauca pendula vera</i> , T.	—	15 1—
2786. " <i>Lawsoniana</i>	—	20 — —
2787. " <i>macrocarpa</i>	—	30 — —
2788. " <i>majestica</i>	—	20 — —
2789. " <i>sempervirens</i> (<i>fastigiata</i> ; <i>pyramidalis</i> ; <i>stricta</i>) <i>Älta Cypress</i> , T.	—	5 — 15
2790. " " <i>horizontalis</i> (<i>expansa</i> ; <i>fastigiata horizont.</i>) T.	—	5 — 15
2791. " " <i>pendula</i> , T.	—	8 — 50
2792. " <i>thurifera</i> (<i>Benthamii</i>) T.	—	20 — —
2793. " <i>torulosa</i> , T.	—	12 — —
2794. " <i>torulosa elegans</i> , T.	—	12 — —
2795. " " <i>Tournefortii</i> , T.	—	20 — —
Cupr. <i>Lawsoniana</i> är ett af de vackraste prydnadsräd för kalljord; behöfver blott i ungdomen skydd mot stränga vintrar.		

	à Port.	Ort.		à Port.	Ort.
	Rmt	Rd ö.	Rd ö.	Rmt	Rd ö.
Frenela, (Cupressineæ)					
2796. " australis, T.	—	20	—		
2797. " pyramidalis, T.	—	25	—		
Ginkgo. (Taxineæ.)					
2798. " biloba (Salisburia adiantifol.)	—	50	—		
Juniperus; En, (Juniperineæ.)					
2799. " Bermudiana	—	5	—	20	
2800. " communis, Vanlig En	—	5	—	5	
2801. " " pyramidalis	—	5	—	20	
2802. " " suesica	—	5	—	20	
2803. " exelsa (foetida exelsa; foetidissima) T.	—	5	—	30	
2804. " Lysia (davurica; phoenicia; Pseudo-Sabina) T.	—	5	—	10	
2805. " Oxycedrus (Monspelienis; Oxycedrus phoenicia) B.	—	5	—	10	
2806. " prostrata (alpina; Hudsonica; Sabina humilis)	—	5	—	20	
2807. " Sabina, Vanlig Sjöfenbom	—	5	—	10	
2808. " sabinoïdes (Sab. gracilis)	—	15	—		
2809. " virginiana, Blyertsceder	—	5	—	10	
2810. " " glauca pendula	—	15	—	1	
Larix; Lärkträd, (Abietineæ.)					
2811. " americana	—	12	—		
2812. " " pendula	—	20	—		
2813. " europea (Pinus Larix) Vanligt Lärkträd, pr <i>tt.</i> 2 rdr	—	5	—	5	
Picea; Tall, (Abietineæ.)					
2814. " balsamea (Abies, Pinus balsamea) Balsantall	—	8	—	50	
2815. " cephalonica (Pinus Abies Apollinis; cephalonica)	—	8	—	50	
2816. " Fraserii (Abies, Pinus Fr.; Pinus balsamea Fraserii)	—	15	—		
2817. " Nordmanniana Ab., Pinus Nordmanniana	—	8	—	50	
2818. " pectinata (Pin Picea; pectinata; Abies pectin. alba; taxifol.; vulg.) Silfvergran	—	8	—		
2819. " Pichta (Ab., Pinus Pichta; sibirica) Becktall	—	15	—		
2820. " Pinsapo (Ab., Pin. Pins.)	—	10	—	60	
Pinus; Fur, (Abietineæ.)					
2821. " austriaca (nigra; nigresens) Österrisk Fur, pr <i>tt.</i> 3 rdr	—	5	—	6	
2822. " Cembra, Cembrafur, Zerbelnötter, m. ätbara nötter pr <i>tt.</i> rdr 1,50	—	5	—	5	
2823. " halepensis, Aleppo fur, T.	—	5	—	15	
2824. " inops (variabilis; virginiana), New-Jersy fur	—	8	—	50	
2825. " Lambertiana, Lambert fur	—	12	—	80	
2826. " Laricio (corsicana; altissima; maritima) Strand fur, B.	—	5	—	15	
2827. " montana, Berg fur	—	5	—	15	
2828. " Mugbo (Mughus; unicata) Dverg fur	—	5	—	30	
2829. " Peuce, Grekisk Lynceos fur	—	10	—	75	
2830. Pinus Pinea, Italiensk Pinie, T.	—	5	—	8	
pr <i>tt.</i> 4 rdr					
2831. " Pinaster (chinensis; japonica; maritima; Mossoniana; nepalensis; Nova Hollandica; Nova Zealandica) Stjern fur, pr <i>tt.</i> 2 rdr	—	5	—	5	
2832. " pyrenaica, (Halepensis major; hispanica; Laricio pyrenaica; Lar. monspeliensis; Pinaster hispanica; Pseudo-Halepensis; Salzmannii) Pyrené fur, utm.	—	12	—	90	
2833. " rigida (canad. trifol.; Tæda rigida; Pinus Loddigesii) Amerikansk Becktall	—	15	—		
2834. " strobis, Weihmuthstall	—	5	—	25	
2835. " sylvestris, Vanlig nordisk Fur . . . pr <i>tt.</i> 3 rdr	—	5	—	6	
2836. " " argentea	—	15	—		
2837. " " rigensis, Rigafur, berömd för sin varaktiga ved	—	5	—	15	
2838. " Tæda (virginiana tennifol.)	—	20	—		
2839. " taurica (Pallasiana; Laricio Pallasiana)	—	5	—	20	
Sequoia; (Cupressineæ.)					
2840. " sempervirens, T.	—	20	—		
Taxodium, (Cupressineæ.)					
2841. " distichum, (Cupr. dist.) B.	—	10	—		
Taxus; Idegran, (Taxineæ.)					
2842. " baecata, vanlig, pr <i>tt.</i> 8 rdr	—	5	—	15	
2843. " canadensis	—	5	—	25	
2844. " fastigiata (hybernica)	—	15	—		
2845. " tardiva (adpressa)	—	10	—	60	
Thuja; Lifsträd, (Cupressineæ.)					
2846. " articulata (Callistria quadrivalvis)	—	8	—	50	
2847. " compacta, T.	—	8	—	50	
2848. " gigantea (Libocedrus decurrens) utmärkt, B.	—	50	—		
2849. " hybrida, vacker, T. B.	—	20	—		
2850. " Lobbi, skön, B.	—	20	—		
2851. " Meldensis (Biota Meldens.)	—	20	—		
2852. " occidentalis	—	5	—	20	
2853. " intermedia	—	8	—	50	
2854. " orientalis, B.	—	5	—	20	
2855. " " argentea, T. B.	—	25	—		
2856. " " aurea, T. B.	—	30	—		
2857. " " fastigiata, T. B.	—	10	—	60	
2858. " " gracilis (nepalens.) T. B.	—	15	—		
2859. " " pyramidalis, T. B.	—	8	—	40	
2860. " plicata (occid. pl.; robusta)	—	20	—		
2861. " stricta, B.	—	10	—	75	
2862. " tatarica (australis; orientalis tatarica) T. B.	—	8	—	40	
Wellingtonia, (Cupressineæ.)					
2863. " gigantea, (Sequoia gig.) B.	—	40	—		
Detta trädslag är obestriddigen en af de vackraste barrväxter.					

Andra Afdelningen,

Prisförteckning å växter:

(Uppställd i den ordning, som finnes angifven uti innehållsförteckningen, på prisuppgiftens första, och öfverst på hvarje sida.)

I. Fruktträd, Bärbuskar m. m.

☛ Då större partier af fruktträd, d. v. s. 250 å 1,000 st., tagas och urvalet af sorterna oinskränkt eller till större delen öfverlemnas åt oss, lemnas **betydlig rabatt** och kan i så fall priset bestämmas efter särskild öfvenskommelse.

	Pr st. Rmt Rd ö.	Pr st. Rmt Rd ö.	
Äppleträd; <i>Pyrus Malus</i>, (Pomaceæ.)		Vindrufvor, Duc de Magenta, svart.	
” halfstammiga med namn	1,25	” Frankenthaler, svart.	
” ” 2:da med namn, starka	— 50	” allongée, svart.	
” ” m. namn, 50 st., vårt val, 50 rdr.		” Grosse perle, hvit.	
” ” ” 25 st., vårt val, 30 ”		” La Bruxelloise, svart.	
” ” ” 50 ” 2:da ” 20 ”		” Lacrima Christi, svart.	
” ” ” 25 ” ” ” 12 ”		” Muscat, d’Alexander, hvit.	
” pyramidform., fransyska sort. m. namn 4 —		” ” de Hambourg, svart.	
” spalterformiga med namn	1,50 å 3 —	” ” Ingrams Hardy prolificæ, svart.	
Päronträd; <i>Pyrus communis</i>, (Pomaceæ.)		” Jesus, hvit.	
” halfstammiga med namn	1,25	” ” Noir d’Espagne, svart.	
” ” m. namn, 50 st., vårt val, 50 rdr.		” ” de Madera, svart.	
” ” ” 25 st., vårt val, 30 ”		” ” Tokai, hvit.	
” pyramidform., fransyska sort. m. namn 4 —		” Prince Albert, svart.	
” spalterformiga med namn	1,50 å 3 —	” Royal Vineyard, hvit.	
” ” större, utmärkt vackra	4 —	” 12 sorter efter vårt val 16 rdr.	
Plommon; <i>Prunus domestica</i> (Amygdalææ.)		Kastanier; <i>Castanea vesca</i>, (Amentacæ)	
” halfstammiga med namn	1,50	” äkta, unga exemplar	— 25
” ” m. namn, 50 st., vårt val, 70 rdr.		Krusbär; <i>Ribes Grossularia</i> & <i>Uva crispæ</i>, (Ribesiaceæ.)	
” ” ” 25 st., vårt val, 36 ”		” engelska, utmärkta sorter med namn — 30	
” pyramidform., fransyska sort. m. namn 3 —		” pr 100 st., 22 rdr; 12 st., 3 rdr.	
” spalterformiga med namn	4 —	” i rummel, goda sorter utan namn	— 20
Körsbärträd; <i>Prunus Cerasus</i> & <i>Avisium</i>, (Amygdalææ) Bigereau, Klarbär, Majkörsbär, Glaskörsbär, Skuggmoreller o. s. v.		” pr 100 st., 15 rdr; 12 st., 2 rdr.	
” halfstammiga med namn	1,50	Vinbär; <i>Ribes rubra</i> & <i>nigra</i>, (Ribesiaceæ.)	
” ” 2:da med namn, starka	— 50	” röda, holländska, stor och god sort	— 20
” ” m. namn, 50 st., vårt val, 70 rdr.		” pr 100 st., 16 rdr; 12 st., 2 rdr.	
” ” ” 25 st., vårt val, 36 ”		” ” körsbärs- utm., pr 12 st., 3 rdr — 30	
” ” ” 50 ” 2:da ” 20 ”		” ” Prince Albert, stora utmärkta	— 30
” ” ” 25 ” ” ” 12 ”		” pr 12 st., 3 rdr.	
” pyramidformiga med namn	2 —	” ” stora, högröda, pr 12 st., 4 rdr — 40	
” spalterformiga med namn	1,50 å 3 —	” ” Knights largered	— 50
Äprioser; <i>Prunus Armeniaca</i>, (Amygdalææ.)		” ” ” early red	— 50
” spalterformiga, unga, rdr 2,50; äldre 6 —		” ” Gondouin rouge	— 50
Persicor; <i>Amygdalus Persica</i>, (Amygdalææ.)		” ” Imperial rouge	— 50
” spalterformiga, unga, rdr 2,50; äldre 6 —		” hvita, holländska, utm., pr 12 st., 3 rdr — 30	
Vindrufvor; <i>Vitis Vinifera</i>, (Viniiferæ.)		” ” Gondouin blanc	— 50
” nedanst. sorter, unga, friska exemplar 1,50		” ” Imperial blanc	— 50
” Blac Hambourg de Frogmore, svart		” ” Transparent white	— 50
” Bucklands Sweet water, hvit.		” ” White Dutch	— 50
” Champion vine, purpur.		” svarta, vanliga, stor och god sort	— 20
” Chasselas de Fontainebleau, hvit.		” pr 100 st., 16 rdr; 12 st., 2 rdr.	
” ” musque, hvit.		” ” Black Bangup	— 50
” ” rose, röd.		” ” Grape Current	— 50
” ” de Negroponte, röd.		” ” Naples	— 50
” Dorée de Stockwood, hvit.		” ” Ogdens pr 12 st., rdr 3,50 — 35	
		” ” Queen Victoria, pr 12 st., 3 rdr — 30	

	Pr st. Rmt Rd ö.
Hallon; <i>Rubus Ideus</i>, (Rosacæ.)	
” röda, st. antwerpner-, pr 100 st., 6 rdr	— 10
” pr 12 st., 1 rdr.	
” gula, st. antwerpner-, pr 100 st., 12 rdr	— 20
” pr 12 st., 2 rdr.	
” belles de Fonteney, pr 12 st., rdr 2,50	— 25
En starkt växande, utmärkt sort med stora, mörkröda frukter.	
” merveilles des quatre saisons, röda .	— 25
” pr 12 st., rdr 2,50.	
” ” des quatre saisons, gula	— 25
” pr 12 st., rdr 2,50.	
” Fastolf, stora röda, pr 12 st., rdr 2,50	— 25
” nyare sorter af utmärkt beskaffenhet	— 50
Hasselnot; <i>Corylus Avellana</i>, (Amentacæ.)	
” vanliga	— 25
” Lambertska, riktbarande, stora	— 1
” Zeller-, Gunslebener	— 1

	Pr st. Rmt Rd ö.
Hasselnot, Zeller-, tidiga, långa	— 1
” Zeller-, med röda kärnor	— 1
” Waterloo	1,25
Smultron; <i>Fragaria vesca</i> m. fl. (Rosacæ.)	
” flera olika sorter, pr 100 st., 3 rdr	—
” ” goda sorter, bland., pr 100 st., 2 rdr	—
Sparris; <i>Asparagus officinalis</i>, (Asparagineæ.)	
” Darmstädter-, 2-åriga, pr 100 st., 2 rdr	—
” jätte-, åkta, 2-åriga, pr 100 st., rdr 2,50	—
” Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårdsväxter, rubriken: Sparrisväxter.	
Matrhobarber, <i>Rheum</i>, (Polygoneæ.)	
” Queen Victoria . . pr 12 st., 3 rdr	— 30
” vanlig, pr 100 st., 12 rdr; 12 st., rdr 1,50	— 15
” Behandling, se fröförteckningen, Köksträdgårdsväxter, rubriken: Sparrisväxter.	
Gräslök; <i>Allium Schoenoprasum</i>, (Asphodoleæ.)	
” pr torfva 25 öre.	

II. Träd och Buskar

till Allée-, Park- och Trädgårdsanläggningar:

B. betyder: att de växter, vid hvars namn det står, böra under vintern betäckas; Ö.: att de böra frostfritt öfvervintras och S. G. betyder: ständigt grön. Då dessa tecken stå vid släktenamnen, gälla de öfven för alla arterna. Växternas familjnamn och hemland finnes öfven angifvet. Då det är fråga om större partier 1,000 å 10,000 st. träd och buskar af nedannämnde sorter och urvalet öfverlemnas åt oss, så lemnas betydlig rabatt och kan i så fall särskild öfverenskommelse om priset träffas. Priset för mindre partier finnes angifvet vid slutet af de under ofvanstående rubrik anförde växter.

Abies; <i>Gran</i>, (Abietineæ.) S. G.	
” alba, (Pinus alba; glauca; laxa; te- tragona) Norra Amerika	— 1
” exelsa (Pinus Abies) vanlig, Europa; flera gånger omplant. exemplar .	— 50
” pr 100 st., 45 rdr.	
” ” var. norvegica, vackra exemplar.	2,50
” nigra (mariana; Pinus marylandica; Pinus nigra) N. Amerika	— 1
” nobilis, Californien	— 5
” orientalis, Orienten; praktf. unga ex.	2,50
” Menziesii (Pinus, Picea Sitchensis) Nordv. Amerika; starka exemplar .	— 3
Acer; <i>Lönn</i>, (Acerineæ.)	
” campestre, Näfverlönn, Södra Sverige	— 25
” dasyarpum, Silfverlönn, N. Amerika	— 50
” Negundo (N. aceroides; fraxinif.) N. Am.	— 50
” ” fol arg. var., utmärkt, B.	— 2
Ett bland de vackraste kända träd med brokiga blad; bör planteras på ett torrt och skyddadt ställe.	
” Opalus (opulifol.; italicus) S. Europa	— 1
” platanoides; vanlig, Sverige; starka 5 å 6 fot höga, pr 100 st., 85 rdr	— 1
” ” mindre pr 100 st., 45 rdr	— 50
” fol. var. med brokiga blad	1,50
” dissectum	2,50
” Pseudoplatanus, Sykomorlönn Europa	— 40
” buskar till bersåer, p. 12 st., 5 rdr	— 50
” fol. atropurpureis, m. mörkbr. blad	— 75

Acer Pseudoplatanus foliis variegatis, med brokiga blad	— 2
” Pseudoplatanus Leopoldii, med brokiga blad, utmärkt vacker	— 2
” rubrum (carolinian.; virgin) N. Am.	— 1
” saccharinum, Sockerlönn, N. Amerika	— 1
Aesculus; <i>Hästkastanje</i>, (Hippocastaneæ.)	
” Hippocastaneum, vanl., starka exempl.	— 1
” pr 100 st., 90 rdr.	
” ” 2 fot höga, ompl., pr 100 st., 15 rdr	— 20
” ” fol. laciniatum, unga exemplar .	2,50
” ” ” var. med brokiga blad	— 2
” Pavia (Pavia flava; lutea) N. Amer.	— 1
” rubicunda, m. vackra, röda blmr, N. Am.	— 1,50
Alnus; <i>Al</i>, (Amentaceæ.)	
” cordata, Norra Europa	— 1,50
” glutinosa, Klubb, Europa	— 25
” ” aurea, gula blad	— 2
” ” imperialis, djupt inskurna blad, utmärkt vacker	— 2
” incana, Gråal, Europa	— 25
Amelanchior; <i>Bärmispel</i>, (Pomacæ.)	
” Botryapium (Pyrus Amel.) Europa	— 25
” pr 12 st., rdr 2,50.	
Vacker, härdig buske med talrika, hvita blommar tidigt om våren.	
Amorpha; <i>Falsk Indigo</i>, (Papilionaceæ.)	
” fruticosa, N. Amerika	— 50
” ” Levisii	— 50

- Pr st. Rmt Rd ö.*
- Amorpha glabra** (caroliniana) **Carolina** . — 50
Utm. sig hufvudsakligen för sitt vackra löfverk.
Något känsliga för vintern i mellersta Sverige.
- Ampelopsis**; *Jungfruvin*; *Vildvin*, (**Viniferæ**.)
„ hederacea, pr 100 st., 16 rdr, 12 st., 2,25 — 20
En af de bästa och starkaste rankväxter till beklädnad af murar, verandar och dylikt.
- Amygdalus**; *Mandel*, (**Amygdalææ**.)
„ communis, vanlig, **Södra Europa** . . . 1,25
„ nana, *Dvergmandel*, **Ö. Europa**; **Asien** — 50
„ var. campestris (Amygd. campestr.) — 50
„ persica fl. pl. med dubbla blmt. B. 2 —
„ pumila fl. pl. (Prun japon.) **Japan**, B. 2 —
- Aralia**; *Bergangelika*, (**Araliacææ**.)
„ spinosa, **N. Amerika** 1,50
Utmärkt för sina vackra blad.
- Araucaria**; (**Abietinææ**.) **S. G. Ö.**
„ imbricata, **Chili**, yngre exemplar . . . 2 —
Verkliga praktexemplar af detta besynnerliga träd, finnas till 30, 40 å 50 rdr pr st. Se vidare praktexemplar af krukväxter.
- Aristolochia**; *Piplomster*, (**Aristolochiææ**.)
„ Siphon, **N. Am.**, sling. v. fordr. varmt läge . 2,50
- Aucuba**; *Guldträd*, (**Cornææ**.) **S. G. Ö.**
„ himalaica, **Himalaja** 2,50
„ japonica, **Japan**; unga exemplar . . . 1,25
„ alba maculata 2,50
„ bicolor 2,50
„ grandidentata 2,50
„ hermaphrodita 3 —
„ latimaculata 2 —
„ macrocarpa 3 —
„ viridis 2,50
Härdiga buskar med gulfläckiga eller rent gröna blad. Användbar till dekorationer på fritt land, i boningsrum och kalla växthus. Planteras i löf- och grästorfjord.
- Azalea**; *Fjellros*, (**Rhodoracææ**.) **Ö.**
„ pontica, **Mindre Asien**, flera sorter . 1,25
Behandling, se fröförteckningen.
- Berberis**; *Surtörne*, (**Berberidææ**.)
„ aquifolia (Mahonia) **N. Amer.**, **S. G.** — 25
pr 12 st., rdr 2,50.
„ canadensis, **N. Amerika** 1 —
„ vulgaris, vanlig, **Europa**; **Mell. Asien**, starka buskar, pr 12 st., rdr 2,50 — 25
„ 3-åriga, pr 100 st., 3 rdr —
„ fol. atropurpureis med röda blad utmärkt vacker prydnadsväxt . . . — 60
- Betula**; *Björk*, (**Amentacææ**.)
„ alba, vanlig, **Eur.**, **Asien**; 5 å 6 fot höga, ompl., pr 100 st., 40 rdr. — 45
„ laciniata, *Örnåsbjörk*, unga ex. . . 1,50
„ nigra pendula, hängande 3 —
- Bignonia**; *Trumpetblomster*, (**Bignoniææ**.)
„ radicans (Tecoma) **N. Amerika**, B. 1 —
Utmärkt slingerväxt, tål vintern på fritt land i södra Sverige.
- Biota**, se Thuja.
- Buxus**; *Buxbom*, (**Euphorbiacææ**.) **S. G.**
„ sempervirens, den bästa infattnings växt, pr 100 st., starka ex., 8 rdr — 10
„ arborescens, 7 fot höga, pyramidf. ex., planterade i baljor, B. Ö. 25 —
„ „ 4 f. h., pyramidf. i baljor, B. Ö. 10 —

- Pr st. Rmt Rd ö.*
- Buxus sempervirens** salicifolia, finbladig — 25
„ sempervirens salicifolia fol. arg. var., unga plantor 1 —
„ balearica, **Balear. öarne**, unga i kr., **Ö.** 1 —
- Calycanthus**; *Kryddträd*, (**Calycanthææ**.)
„ floridus, **Carolina** 1,50
„ præcox, **Japan** 1,50
Utm. för sin starkt aromatiskt luktande ved; äro i mellersta Sverige ömtåliga för kolden.
- Caprifolium**; (**Caprifoliacææ**.)
„ brachypoda aurea reticulata, **Japan**, B. — 40
pr 12 st., 4 rdr.
„ hortense (Lonizera capr.) **S. Europa** — 25
„ „ atropurpureum 1 —
„ „ italicum rubrum 50
„ „ album 50
„ „ pallidum 75
„ Periclymenum, vanl., pr 12 st., 2 rdr — 20
„ proliferum, **Europa** 1 —
„ sempervirens (Brownii), **S. Europa** . 1 —
Den förstn. har små blad med guldgula ådror, är en prydlig ampelväxt och förtr. till beklädnad af mindre äspalier, flätverk o. d. Allesammans förträffliga slingerväxter.
- Caragana**; *Ärtträd*, (**Papilionacææ**.)
„ arborescens (Robinia Carag.) **Sibirien** — 50
„ „ yngre pr 100 st., 18 rdr — 25
„ „ pendula 3 —
„ Chamlagu, **Norra Kina** 1,50
„ „ pendula 2 —
„ gracilis (pendula) 1,50
- Carpinus**; *Afvenbok*, (**Amentacææ**.)
„ Betulus, vanl., **Europa**; 4 fot höga ex. — 40
pr 100 st., 35 rdr.
- Cedrus**; *Ceder*, (**Abietinææ**.) **S. G. Ö.**
„ atlanticus (argent.) *Heiteeder* eller *Atlasceder*, **Afrika** . . pr 12 st., 10 rdr 1 —
„ Deodora (Abies; Pinus Deodora) *Deodora*- eller *Himalayaceder*, starka ex. 5 —
„ „ mycket större, starka ex. . . 10 å 20 —
„ Libani (Pinus Cedrus) *Libanonsceder* 1 —
„ „ mycket stora, i baljor . . . 10 å 20 —
Planteras i kraftig löf- och grästorfjord.
- Celastrus**; *Celastrer*, (**Celastrinææ**.)
„ scandens, slingrande, **N. Amerika** . . 1 —
- Clematis**; *Skogsrefva*, (**Ranunculææ**.)
„ angustifolia 1 —
„ cirrhosa, **Medelhafskusten**, B. 50
„ Flammula, **Södra Europa**, B. 50
„ Hendersonii (cylindrica) **N. Amerika** 1 —
„ Jackmannii 2 —
„ lanuginosa, **Kina**, B. 2 —
„ patens Amalia 1,50
„ „ azurea grandiflora 1,50
„ „ Helena 1,75
„ „ Louise 1,50
„ „ Sophia 1,75
„ „ fl. pl. 1,75
„ virginiana, **N. Amerika** 50
„ Vitalba, **Tyskland**, etc. 50
„ Ytlicella, **Italien** 50
Länge och rikt blommande slingerväxter.
- Colutea**; *Blåsträd*, (**Papilionacææ**.)
„ arborescens, **S. & mell. Eur.**, **Orienten** — 25

Pr st. Rmt Rd ö.

Colutea creuata, S. & mell. Eur., Orienten — 30

Corchorus; Keria; Ramunkelbuske, (Rosaceæ.)

" japonicus — 50

" " fol. arg. var. med brokiga blad — 50

Den första, som har dubbla, gula blommor passas till drifning om vintern. Den senare har enkla, gula blommor. Planteras i Lofjord.

Cornus; Hornbuske, (Corneæ.)

" alba (stolonifera) . . pr 12 st., 2 rdr — 20

" " fol. var., har ej alltid brokiga blad — 50

" alternifolia, N. Amerika — 50

" circinata, N. Amerika — 75

" fastigiata (paniculata) N. Amerika — 50

" florida, N. Amerika — 1 —

" mas (mascula) Korneller, Europa — 25

" " fol. arg. var. med brokiga blad . 1,50

" stricta, N. Amerika — 25

" asperifolia — 40

Coronilla; Koronill, (Papilionaceæ.)

" Emerus, Öland & Gottland — 50

" glauca, Södra Europa, Ö. — 50

Vackra, men ömtåliga under vintern.

Corylus; Hassel, (Amentaceæ.)

" Avellana, vanlig, Europa & Asien — 25

" " fol. atropurpureis — 1 —

" " laciniatis — 1 —

" andra sorter, se fruktträd & bärb.; nötter.

Cotoneaster; Oxbär, (Pomaceæ.)

" affinis, Neapel — 40

Crataegus; Hagtorn, (Pomaceæ.)

" æstivalis (elliptica) N. Amerika — 75

" coccinea, N. Amerika — 50

" " corallina — 75

" " pruinosa — 75

" Crus galli, N. Amerika — 50

" galli splendens — 75

" glandulosa, N. Amerika — 75

" Layii (californica) — 75

" maerantha — 75

" monogyna, vanlig, Europa — 25

" " fol. var. med brokiga blad — 75

" " pendula, hängande — 1 —

" nigra, Ungern — 75

" oxyacanta, vanlig, Europa — 25

" " 2-åriga, pr 1,000 st., 16 rdr,
pr 100 st., 2 rdr.

" " 3-åriga, pr 1,000 st., 22 rdr,
pr 100 st., rdr 2,75.

" " fl. albo pl., hvit, dubbel — 1 —

" " " rubro pl., röd, dubbel — 1 —

" " " simplex, röd, enkel — 75

" " scarlet superb — 1 —

" " fol. var. med brokiga blad — 75

" " pendula, hängande — 2 —

" punctata (Azarolus) N. Amerika — 1 —

" sanguinea, N. Asien — 75

" tanacetifolia — 75

Cryptomeria, (Cupressineæ.) S. G. Ö.

" elegans, Japan — 3 —

" japonica, Japan, små exemplar — 50

" " Lobbi (viridis) starka exemplar . 5 —

Vackra barrträd till dekorationer i växthus och på fritt land. Planteras i grästorfjord.

Pr st. Rmt Rd ö.

Cupressus; Cypress, (Cupressineæ.) S. G.

" Lawsoniana, N. Am., 4 à 5 f., praktf. 10 —

" " 3 à 4 f. h., 5 rdr; mindre, starka pl. 1 —

" " unga plantor — 50

" " glauca, 3 à 5 fot, praktex. 5 à 10 —

" " unga, starka plantor — 1 —

Cydonia; Qvitten, (Pomaceæ.)

" japonica, Japan — 75

Cytisus; Gullbregn; Bönträd, (Papilionaceæ.)

" alpinum, S. & mellersta Europa — 25

pr 100 st., 18 rdr.

" austriacus, Österrike, Ryssland — 40

" capitatus, Österrike, Italien, m. fl. — 25

" caucasicus, Kaukasus — 40

" elongatus; S. & mellersta Europa — 20

pr 100 st., 15 rdr.

" hirsutus, S. Europa — 25

" Laburnum, S. Europa — 25

" nigricans, S. & mellersta Europa — 75

" " stamformig — 2 —

" purpureus, Södra Europa — 75

" " stamformig — 2 —

" " albiflorus, stamformig — 2 —

" " pendulus — 2 —

" sessilifolius, S. Europa — 30

" supinus, Mellersta Europa, Sibirien — 20

" uralensis, Ural — 45

Daphne; Källarhalsbuske, (Thymeleæ.)

" eueorum, utmärkt vackert och välluktande, öfvervintras i kallhus 1,50

" Mezereum, vanl., Mell. Eur., n. Asien — 75

Deutzia; Deutzia, (Philadelphææ.)

" crenata, Japan — 50

" " fl. pl., utm. till drifn. om vintern 1 —

" gracilis, Japan, pr 12 st., rdr 2,50 — 25

" " starka, utm. till drifn. om vintern 1 —

pr 12 st., 10 rdr.

" scabra, Japan, starka — 50

Elaeagnus; Silfverbuske, (Elaeagnææ.)

" angustifol. (hortensis, arg.) S. Europa — 50

Evoonymus; Bened; Spindelträd, (Rhamneæ.)

" atropurpureus, N. Amerika — 1 —

" " pendulus — 2 —

" europæus, Europa — 20

" " fol. var. med brokiga blad — 75

" nanus (angustifolius) Kaukasus — 50

Fagus; Bok, (Amentaceæ.)

" sylvatica, vanlig, 2 fot höga plantor — 25

pr 12 st., rdr 2,50.

" " atropurpurea, Blodbok 1,50

" " pendula, hängande — 3 —

Fraxinus; Ask, (Fraxineæ.)

" americana (discolor) N. Amerika — 50

" aucubefolia, vackert, gulsfäckig — 1 —

" coarita (varietet) — 50

" exelsior, Europa, Asien, vanl.; 10 à 12 fot höga alléträd pr 12 st., 5 rdr — 50

" aurea, med gula grenar och blad — 50

" argentea var. med hvitbrokiga blad — 75

" " pendula, Hängask, pr 12 st., 20 rdr — 2 —

" " spectabilis — 75

" heterophyllus, N. Amerika? — 50

- Fr st. Rmt Rd ö.*
- Fraxinus Ornus, Södra Europa* — 75
 " *Ornus florifera* 1 —
 " *sambucifolia, Virginia* — 50
 " *var. crispata, Kälask* 1 —
Fenistä; Ginstbuske, (Papilionaceæ.)
 " *ætnensis, Italien* — 40
 " *anglica, England, Tyskland m. fl.* — 40
 " *florida, Spanien* — 40
 " *lusitanica, Portugal* — 40
 " *tinetoria, Europa* — 25
Ginkgoträd; Ginkgoträd, (Taxineæ.)
 " *biloba (Salisburia adiantif.) Japan* 1 —
Gleditschia; Christustörne, (Leguminosæ-Cas-siæceæ.)
 " *caspiæca, Trakt kring Kasp. hafvet* 1,50
 " *horrida, Kina* 1,25
 " *triacanthos (latisiliqua) N. Amerika* — 75
Glycine, (Papilionaceæ.)
 " *chinensis (Wistaria chinensis) Kina* 1,50
Malimodendron; Saltbuske, (Papilionaceæ.)
 " *argenteum, Sibirien* 1,50
Hedera; Murgröna, (Araliææ.) Ö.
 " *algiensis* 2,50
 " *aurea marg.* 2,50
 " *chrysocarpa* 1,50
 " *arboorea* 2,50
 " *colchica (Roegneriana) Kaukasus* 1 —
 " *densa aurea* 2,50
 " *elegans var.* 2,50
 " *Helix, vanlig, Europa & Orienten* — 20
 pr 12 st., 2 rdr.
 " *digitata* — 50
 " *hybernica, Irländsk murgröna* — 75
 " *macrophylla, storbladig* — 50
 " *rhomboidea fol. var., m. brokiga blad* 1 —
Hippohai; Sandtörne, Hafstörne eller Finn-bär, (Elaegneæ.)
 " *rhamnoides, Europa* — 30
Hydrangea; Hortensia, (Saxifrageæ.) B. Ö.
 " *hortensis, Japan, pr 12 st., 5 rdr* — 50
 " *japonica, Japan, pr 12 st., 5 rdr* — 50
 " *fol. var., hvitbl., pr 12 st., 5 rdr* — 50
 " *rosalba, ny vacker* 1,25
 " *Otakas, ny, praktfull* 1,25
 Kända, tacksamma växter för fritt land, växt-lus och boningsrum. Den sistnämnda blommar lättast och är vackrast i boningsrum. Planteras i ljung-, torf- och löfjord.
Hex; Jernek, (Ilicineæ.) S. G. B.
 " *aquifolium var., med brokiga blad, utmärkt vackra varieteter* . . . 6 à 10 —
 " *pyramidalis* 3 —
 " *ferax fol. var.* 2,50
 Kunna under god betäckning öfvervintras ute.
Juniperus; En, (Juniperineæ.)
 " *communis var. suesica, Sverige; vackra plantor af 1 à 2 fots höjd* 1,50
 " *chinensis, Kina, starka exemplar* 5 —
 " *unga plantor* 1 —
 " *Sabina, Sjöfrenbom, S. Europa, starka* 1 —
 " *squamata, Himalaya* 1,50
 " *virginica; Virginaceder, eller Blyerts-träd, utmärkt vackra, 2 à 3 fot hög* 1,50
- Fr st. Rmt Rd ö.*
- Juniperus virginica, mindre exemplar* — 75
Kalmia, (Rhodorceæ.) S. G. B.
 " *latifolia, N. Amerika* 3 —
 Fordrar ljungjord, skydd, skugga och god betäckning om vintern.
Ligustrum; Liguster, (Oleaceæ.)
 " *vulgare, Europa* — 10
 " *2-årig* pr 100 st., 2 rdr — —
 " *3-årig* pr 100 st., 4 rdr — —
 " *fol. var.* — 50
 " *pendulum* 2 —
 " *japonicum, Japan, B. Ö.* — 50
 Den sistnämnda har vackra hvita blommor. Kan odlas uti kruka i ljungjord.
Lonicera; Try, (Caprifoliaceæ.)
 " *ælpigena, mellersta Europa* — 50
 " *altaica, Altai* — 50
 " *ciliata, N. Amerika* — 75
 " *coerulea, Europa* — 25
 " *Diervilla, N. Amer., pr 12 st., 2 rdr* — 20
 " *discolor, Ostindien, B.* — 75
 " *iberica, Södra Ryssland* — 50
 " *Ledebourii, Nya Kalifornien* — 50
 " *orientalis, Mindre Asien* — 50
 " *pyrenaica, Pyrenéerna, Sibirien* — 30
 " *tatarica, Rosentry, Tatar, Sibirien* — 35
 " *mindre exemplar* — 20
 pr 100 st., 15 rdr.
 " *Xylosteum, Europa, pr 100 st., 15 rdr* — 20
Lycium; Bachtörne, (Solanaceæ.)
 " *europæum, Europa, pr 12 st., 2 rdr* — 20
Magnolia, (Magnoliaceæ.) Ö.
 " *grandiflora, Florida etc., starka* 8 —
 " *purpurea, Japan, starka* 5 —
 " *tripetala, Pensylvanien, starka* 5 —
Mahonia, (Berberideæ.) S. G.
 " *aquifolia, N. Amer., pr 12 st., 10 rdr* 1 —
 " *repens, N.-v. Amer., pr 12 st., 10 rdr* 1 —
Mespilus; Mispel, (Pomaceæ.)
 " *germanica, Europa, Orienten* 2 —
Paonia; Pion, (Ranunculaceæ.)
 " *arboorea, Moutanpion, Kina, Japan; utmärkta sorter, starka exemplar* 3 —
Philadelphus; Schersmin, (Philadelphææ.)
 " *coronarius, S. Eur., Orienten, Japan* — 25
 " *fl. pl.* — 50
 " *nanus* — 25
 " *floribundus, N. Amerika* — 40
 " *Gordonianus, N. Amerika* — 40
 " *hirsutus (gracilis) N. Amerika* — 50
 " *speciosus, N. Amerika* — 50
Phillyrea; Stenlind, (Oleaceæ.) S. G.
 " *angustifolia, S. Europa, Ö.* — 50
Picea; Tall, (Abietineæ.)
 " *balsamea, Balsamtall, N. Amerika* 1 —
 " *cephalonica, Grekland; unga exempl.* — 25
 " *nobilis, Nord-Kalifornien, 1 fot hög* 2,50
 " *Nordmanniana, Kaukasus* 2,50
 " *pectinata, Sjöfvergran, Mell. Europa* — 50
Pinus; Fur, (Abietineæ.) S. G.
 " *austriaca, Österrike etc., starka, om-skolade exemplar, pr 12 st., 5 rdr* — 50

- Pr st. Rmt Rd ö.
- Pinus Cembra, Cembrafur, Sibir., S. Eur.* . . . 1 —
 pr 12 st., 10 rdr.
- ” *Cembra, mindre exempl.*, pr 12 st., 5 rdr — 50
- ” *inops, New-Jerseyfur, starka exempl.* — 50
- ” *Laricio, Korsikansk fur, Strandfur* . . . — 75
- ” *Larix, Lärkträd*, pr 100 st., 15 rdr — 20
- ” *mindre* . . . pr 100 st., 10 rdr — 15
- ” *Pumilio, Dvergfur, Alperna* . . . — 50
 pr 12 st., 5 rdr.
- ” *Strobus, Weikmuthstall, N. Amerika* — 25
- ” *sylvestris, Vanlig nordisk fur* . . . — 25
- Se äfven krukväxter.
- Populus; Poppel, (Amentaceæ.)**
- ” *alba (argentea vera) Silfverpoppel, Mell. Europa* — 50
- ” *angulata, Carolinapoppel, unga ex.* — 50
- ” *balsamifera, Balsampoppel, N. Amerika* — 50
 pr 100 st., 40 rdr.
- ” *viminialis (laurifolia)* — 50
- ” *betulaefolia, N. Amerika* — 50
- ” *canadensis, (monellifera) Kanadapoppel* — 50
 pr 100 st., 40 rdr.
- ” *fol. aur. var., med gulfläck. blad* 1 —
- ” *dilatata, Pyramidpoppel, S. Europa* — 50
 pr 100 st., 40 rdr.
- ” *græca, Grekland* 1 —
- ” *pendula* 4 —
- ” *grandidentata, N. Amerika* — 50
- ” *nigra, Svartpoppel, Europa* — 50
- ” *ontariensis, Ontariopoppel, N. Amer.* — 50
 pr 100 st., 40 rdr.
- ” *tremula pendula, Hängpoppel* 4 —
- Potentilla; Fingerört, (Rosaceæ.)**
- ” *fruticosa, N. Europa* — 25
- ” *floribunda, N. & mellersta Europa* — 25
- Prunus; Plomman; Korskär, (Amygdaleæ.)**
- ” *Avium fl. pl., dubbelblommig* 1,50
- ” *pendulum, hängande* 1,50
- ” *chinensis fl. pl., Kina, Japan, Ö.* 1 —
- ” *Lauro ceracus, S. Europa, S. G. Ö.* — 50
- ” *Mahaleb, Weichsel, S. Europa* 1 —
- ” *Padus, Hägg, Europa* — 25
- ” *aucubaefolia* — 75
- ” *triloba, Kina, dubbel, utmärkt.* 2 —
- Ptelea; Läderträd, (Pteleaceæ.)**
- ” *trifoliata, N. Amerika* — 25
- Pyrus; Apple och Päron, (Pomaceæ.)**
- ” *Amelanchior, Bäräpple, Sibirien* — 50
- ” *communis fl. pl., Päron med dubbla bl.* — 75
- ” *floribundus, Japan* — 75
- ” *kaido, Japan* 1 —
- ” *Malus fol. var.* 1,50
- ” *nivalis, Snöpäron, Mellersta Europa* — 50
- ” *prunifolia, Sibirien* — 30
- ” *fructo coccineo* — 75
- ” *luteo* — 75
- ” *nigro* — 75
- ” *transparent* — 75
- ” *pendula, hängande* 2 —
- ” *Toringo, Japan* 1 —
- Quercus; Ek, (Amentaceæ.)**
- Pr st. Rmt Rd ö.
- Quercus Banisterii, N. Amerika* 1 —
- ” *Robur, vanlig* — 50
- ” *fastigiata, pyramidformig* 3 —
- Retinospora, (Cupresineæ.)**
- ” *ericoides, Japan* 1,50
- ” *leptoclada, Japan* 1,50
- ” *pisifera, Japan* 1,50
- ” *filifera* 2 —
- ” *plumosa, Japan* 1,50
- ” *fol. aur. var.* 2,50
- ” *squarrosa* 1,50
- Rhamnus; Vägtörne, (Rhamneæ.)**
- ” *catharticus, Europa* — 20
- ” *unga ex. till häckar* — 10
 pr 100 st., 5 rdr.
- ” *tinctorius, Österrike* — 35
- ” *Vicheli* — 40
- Rhododendron; Alpros, (Rhodorceæ.) S. G.**
- ” *hybridum, Ö; praktfulla exemplar, 3 å 10* —
- ” *ponticum, Mindre Asien, Ö.* 1,50
- ” *Alla Rhododendron utmärka sig för praktfulla blommor. Planteras i lungjord.*
- Rhus; Sumak; Perukträd, (Therebinthaceæ.)**
- ” *glabra, N. Amerika* — 75
- ” *elegans* — 75
- ” *radicans, N. Amer., pr 12 st., rdr 2,50* — 25
- Ribes; Vinbär och Krusbär, (Ribesiaceæ.)**
- ” *acerifolium* — 25
- ” *alpinum, Europa, Sibirien* — 15
 pr 12 st., rdr 1,50.
- ” *laciniatum* — 50
- ” *atropurpureum (petraeum) Mongoliet* — 50
- ” *aureum, N. Amer., pr 12 st., 2 rdr* — 20
- ” *caucasicum (Bieberst., ciliatum) Kauk.* — 25
- ” *floridum (amer.; glandul.) N. Amer.* — 25
- ” *Gordonianum (Beatonii)* — 25
- ” *multiflorum (spicatum; vitifol.) Kroat.* — 25
- ” *nigrum fol. var. med brokiga blad.* — 30
- ” *aconitifolium* — 25
- ” *sanguineum, N. Amerika* — 35
- ” *fl. pl., dubbelblommande* 1 —
- ” *tenuifolium, N. Amerika* — 25
- Robinia; Falsk Akasia, (Papilionaceæ.)**
- ” *Pseudoacacia, N. Amerika* — 50
- ” *Bessoniana* 2 —
- ” *viscosa, Florida* 1,50
- Rosa; Törnros, (Rosaceæ.)**
- ” *cinnamomea majalis, Bukettros* — 25
 pr 12 st., rdr 2,50.
- ” *lutea, S. Europa, gul, enkel* — 50
- ” *Manetti* — 50
- ” *canina, mollissima och andra, till nästan ogenomträngliga häckar passande sorter* pr 12 st., rdr 2,50 — 25
- Rubus; Hallon, (Rosaceæ.)**
- ” *odoratus, N. Amerika* — 15
- Salix; Pil, Vide och Sälg, (Salicineæ.)**
- ” *acutifolia (caspica; pruinosa) Sv. m. fl.* — 20
- ” *En pryddig art med hängande grenar; Kan användas som tärpil.*
- ” *acuminata, Tyskland* — 20
- ” *fol. var. med brokiga blad.* — 50
- ” *alba, Sverige* — 25

	Pr st. Rmt Rd ö.		Pr st. Rmt Rd ö.
<i>Salix alba argentea</i> , med silfverhv. blad	35	Sambucus; Höll; Fläder, (Caprifoliaceæ.)	
" <i>americana pendula</i> (Napoleona; ba-		" <i>canadensis</i> , N. Amerika	50
" <i>bylonica</i> foem.)	50	" <i>nigra</i> , vanlig, Europa, Orienten	25
" <i>pendula</i> , yngre exemplar	25	" " fol. arg. var.	30
" <i>amygdalina</i> , Sverige	20	" " " aureis var.	30
" " <i>discolor</i>	25	" " " fl. pl. dubbelblommande	40
" " <i>speciosa</i>	20	" " " pulverolenta	40
" <i>asplenifolia</i> , (hybrid)	50	" " " linearis	75
" <i>aurea</i> pr 100 st., 15 rdr	20	" " " laciniata, <i>Persiljefläder</i>	25
Utmärkt till vidjor.		" <i>racemosus</i> , <i>Drufffläder</i> , Mell. Europa	20
" <i>bicolor</i> , Sverige	20	Solanum; Trollbär, (Solanaceæ.)	
" <i>Bradfordii</i> (lik <i>S. americana pendula</i> ;		" <i>Dulcamara</i> , <i>Qvesed</i> , Sverige	15
troligen en varietet)	25	Sorbus; Rönn eller Oxel, (Pomaceæ.)	
" <i>cæsia</i> , Sverige, Tyskland, m. fl.	25	" <i>Acuparia</i> , <i>Vanlig Rönn</i> , Sverige	50
" <i>caudata</i> , Europa	20	" " <i>pendula</i> , hängande 1,50 à 3 —	
" <i>Caprea</i> , <i>Vanlig Sälq</i> , Sverige	15	" <i>edulis</i> , Frankrike	50
" <i>pendula</i> , hängande	3 —	Spiræa; Brudspira, (Rosaceæ.)	
" <i>conifera</i> , Nordamerika	25	" <i>acutifolia</i> (<i>hypericifolia</i>) Sibirien	50
" <i>cuspidata</i> , Tyskland	25	" <i>alpina</i> , Asien	25
" <i>daphnoides</i> , Sverige	25	" <i>Billardii</i> (Bastard)	25
" " <i>jaspidea</i>	25	" <i>callosa</i> (japon; <i>Fortunei</i>) Japan	20
Vacker, snabbväxande sort.		" <i>cana</i> (<i>nana</i>) Kroatien	25
" <i>daseyclados</i> , Schles., pr 12 st., rdr 2,50	20	" <i>chamædrifolia</i> (<i>inceisa</i>) Sibirien	20
Utmärkt vacker; lemnar långa, starka		" <i>Douglasii</i> (<i>tomentosa</i>) N. Amerika	25
vidjor; kan anses som en af de aldra bäs-		" <i>eximea</i> , (Bastard)	75
sta korgpillarerna.		" <i>Foxii</i> , (Bastard?)	75
" <i>fragilis</i> , Sverige	20	" <i>Hookerii</i> , Himalaya	40
" <i>grandifolia</i> , Sverige	25	" <i>hypericifolia</i> , N. Amerika	30
" <i>hastata</i> , Alperna m. fl. fjell	15	" <i>media</i> , Böhmen	50
" <i>holocericea</i> , Sverige	20	" <i>Nobleana</i> (Bastard)	35
" <i>lanceolata</i> , Sverige	20	" <i>opulifolia</i> , Kanada	25
" <i>laurina</i> , England	25	" <i>palmata</i> , en af de allra vackraste	1,75
Utm. vacker i buskpartier och anlägg.		" <i>prunifolia</i> , Japan	50
" <i>lucida</i> , (<i>pentandra latifolia</i>)	20	" " fl. pl., dubbelblommande	1 —
En vacker sort med stora, glänsande, mörk-		" <i>salicifolia</i> , Europa, N. Asien	10
gröna blad; särdeles anv. i anläggningar.		" <i>sorbifolia</i> , Sibirien	25
" <i>mollissima</i> Sverige, Tyskland m. fl.	20	" " <i>dahurica</i>	40
" <i>nigra pendula</i>	3 —	" <i>thalictroides</i> (<i>aquilegifol.</i> ; <i>hypericif.</i>)	50
" <i>nigricans</i> Sverige	30	Staphylea; Pimpernöt, (Sapindaceæ.)	
" <i>borealis</i>	20	" <i>pinnata</i> , S. Europa	50
" <i>prunifolia</i>	20	Symphoria; Snöbär, (Caprifoliaceæ.)	
" <i>phyllicifolia</i> , Europas fjell & alper	20	" <i>racemosa</i> , vanlig, pr 100 st., 10 rdr	45
" <i>Pontedereana</i> , S. Tyskland	20	" <i>vulgaris</i>	25
" <i>purpurascens</i> , Europa	20	" " fol. aureis marginatis	1 —
" <i>purpurea</i> , Sverige, Tyskland, m. fl.	15	Syringa; Syren, (Oleaceæ.)	
" <i>var.</i>	25	" <i>chinensis</i> (Bastard) buskformig	60
Uppdragen i högstammig form lemnar		" " <i>stamformiga</i> exemplar	1,50
denna art vackra hängträd.		" <i>Josikæa</i> , Ungern, Sibenburgen	75
" <i>rosmarinifolia</i> , Sverige	20	" <i>persica</i> , Persien	60
Låg. finbladig, fördelaktig till anlägg.		" <i>vulgaris</i> , vanlig, buskformiga	25
" <i>rubra</i> , Tyskland	25	" " <i>alba</i> , buskformiga, pr 100 st., 20 rdr	25
" <i>Ruselliana</i> , England?	25	" " <i>stamformiga</i>	1,25
" <i>salviæfolia</i> , Schweiz	25	Taxodium; (Taxineæ.) S. G. Ö.	
" <i>stipularis</i> (<i>viminalis stip.</i>) Sverige	15	" <i>sempervirens</i> , Mexiko, 10, 5, 2 rdr à —	50
" <i>viminalis</i> . <i>Korgpil</i> , pr 100 st., 10 rdr	15	Taxus; Idegran, (Taxineæ.) S. G.	
" <i>viridis</i> , Sverige	25	" <i>baccata</i> , Europa	75
Uppnår betydlig höjd och storlek.		" " <i>pyramidformiga</i> , vackra, i baljor	10 —
" <i>vitellina</i> , se <i>Salix aurea</i> .		" " <i>pyramidalis</i> , 2 fot höga	2,50
Då valet af sorterna anförtros oss, lemnas af		" " <i>fastigiata</i> , 4 à 5 fot höga	5 à 6 —
dessa och andra sorter, i äldre och yngre		Thuja; Lifsträd, (Cupressineæ.) S. G. Ö.	
exemplar:		" <i>gigantea</i> , Columbien, B., praktfulla,	
50 sorter <i>Salix</i> med namn	10 rdr.	" mindre exemplar	2,50
100 st. i 15 à 20 olika sorter	15 "		
100 st. sättqvistar, vanliga sorter	1 "		
100 " " sällsyntare arter	2 "		

	Pr st.	Rmt Rd ö.
<i>Thuja Lobbii</i> , Kalifornien, B., 50 öre à 1,50		
occidentalis, starka exemplar . . .	1	2,50
4-åriga . . . pr 100 st., 10 rdr —		—
mindre plantor, pr 12 st., 2 rdr —		20
pyramidalis	1	—
intermedia	1	—
Orientalis, Kina, Japan, starka . . .	75	—
aurea, små exemplar	50	—
starka plantor	3	—
starka praktexemplar	10 à 15	—
elegantissima	5	—
expansa, praktexemplar	10	—
nepalensis	1	—
tatarica	1	—
plicata, N. Amerika	1	—
tatarica, Mell. Asien	1	—
Warreana, utmärkt sköna exemplar .	3	—



Thuja orientalis aurea.

Thujopsis , (Cupressineæ.) S. G.		
borealis, N. Amerika, starka, yfvinga praktexemplar	2, 5 à 10	—
fol. var.	2,50	—
Tillhör, liksom <i>Oprensus Lawsonii</i> , de vackraste barrväxter för fritt land. Den har härstädes odlats under loppet af flere år och ännu aldrig lidit af vintern. Våra exemplar äro uppdagna på fritt land och, liksom alla här odlade Coniferæ, försedda med stora rotknippen, så att de kunna omplanteras snart sagdt hvilken årstid som helst.		

Pr st. Rmt Rd ö.

Tilia ; <i>Lind</i> , (Tiliaceæ.)		
alba argentea, Ungern etc.	2,50	—
americana, N. Amerika, starka . . .	1,50	—
corallina (Bastard)	1,50	—
grandifolia (europ. var.) Europa; starka, utmärka exemplar	2,50	—
asplenifolia, egendomlig	1	—
parvifolia, Europa, vanlig	2,50 à 3	—
buskformiga, pr 100 st., 40 rdr. —	50	—
Ulmus ; <i>Alm</i> , (Ulmaceæ.)		
alata, Virginien	1	—
campestris, Europa	50	—
betulaefolia	1	—
torulosa	1	—
purpurea, med bruna blad	1	—
globosa, England	75	—
microphylla, småbladig	75	—
montana, Europa, starka alléträd . . .	75	—
pr 100 st., 65 rdr.		
5 à 7 fot h., pr 100 st., 25 rdr —	30	—
buskformiga pr 100 st., 20 rdr —	25	—
adjantifolia	50	—
crispa	75	—
Dampieri, pyramidform., vackra .	1	—
exoniensis, <i>Pyramidalm</i> , vanlig . .	75	—
pr 12 st., rdr 7,50.		
fol. arg. var. med brokiga blad . . .	2	—
superba	75	—
horizontalis	1	—
pendula, <i>Hängalm</i> ,	2	—
pumila, Mell. Europa, vackra . . .	1,50	—
suberosa, <i>Korkalm</i> , Europa	75	—
pyramidalis	1	—
pendula, hängande	1,50	—
Viburnum ; <i>Snöboll</i> , (Caprifoliaceæ.)		
Lantana, Mell. & S. Europa	25	—
fol. var. med brokiga blad	1	—
lantanoïdes, N. Amerika	30	—
Opulus sterile (roseum)	50	—
högstammiga exemplar	2	—
Weigelia ; (Caprifoliaceæ.)		
amabilis, Japan	50	—
rosea, Kina, Japan	50	—
flera andra sorter	75 öre à 1	—
Wellingtonia ; <i>Mammouthträdd</i> , (Cupressineæ.)		
gigantea, Kalifornien, unga plantor 1,50		
Härstädes uppdagna på fritt land och försedda med goda rotklippar.		

Då urvalet af sorterna anförtros åt oss, lemnas:
 100 st. Träd & buskar 100 sort. m. namn, 50 rdr.
 100 " Träd & buskar i 50 sort. m. namn, 30 "
 100 " Träd & buskar i rummel 20 "

III. Buskar till häckar och bersåer:

	Pr 100 st.	Rmt Rd ö.
Alm , buskformiga till bersåer	20	—
Bäckörne ; <i>Lycium barbarum</i>	10	—
Buxbom ; <i>Bucus sempervirens</i> , starka .	8	—

	Pr 100 st.	Rmt Rd ö.
Gran ; <i>Abies excelsa</i> , flera gånger omplanterade exemplar	45	—
Hagtorn , 2-årig pr 1000 st., 16 rdr. .	2	—

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Hagtorn, 3-årig	pr 1000 st., 22 rdr	2,75
Liguster, 2-årig	pr 1000 st., 25 rdr	3 —
„ 3-årig	pr 1000 st., 35 rdr	4 —
Lind; <i>Tilia parvifol.</i>	pr 12 st., 6 rdr,	40 —
Lifsträd; <i>Thuja occidentalis</i> , 4-årig		10 —
Lönn; <i>Acer Pseudopl.</i> , pr 12 st., 5 rdr,		40 —
Rosor; <i>Rosa pimpinellifolia</i> , pl.		25 —
„ <i>Rosa canina</i> , <i>mollissima</i> och andra till		

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

nästan ogenomträngliga häckar pas-	sande sorter	pr 12 st., rdr	2,50, 25 —
Snöbar; <i>Symphoria racemosa</i>			10 —
Surtörne; <i>Berberis vulgaris</i> , 3-åriga			3 —
Syrener; <i>Syringa vulgaris</i> , blå & hvita			8 —
„ blå & hvita, starkare exemplar			20 —
Try; <i>Lonicera tatarica</i> & <i>Xylosteum</i>			15 —
Vägtörne; <i>Rhamnus catharticus</i>			5 —
Ärtträd; <i>Caragana arborescens</i>			18 —

IV. Törneorsor för fritt land:

(Rosaceæ.)

Vår samling af törneorsor för fritt land består af öfver 500 olika sorter och torde således vara en af de mest rikhaltiga inom vårt land.

Pr st. Rmt Rd ö.

Rosa alba , Hvita Rosor; flera olika sorter med namn		— 75
„ <i>bengalensis florida</i> , slingrande		1,75
„ <i>bourbonica hermosa</i> , pr 12 st., 6 rdr		— 60
	pr 100 st., 20 rdr.	
En vacker rikblommig sort; utmärkt såväl till drifning, som till pl. på grupper.		
„ <i>Boursalii elegans</i> , slingrande		1 —
„ „ <i>rubra</i> , slingrande		1 —
„ <i>canina</i> & <i>mollissima</i> m. fl., till häckar		— 25
	pr 12 st., rdr	2,50.
„ <i>capreolata alba</i> , slingrande		1 —
„ „ <i>carnea</i> , slingrande		1 —
„ „ <i>pendula</i> , Hängros		4 —
„ „ <i>rubra</i> , slingrande		— 50
„ <i>centifolia</i> , flera sorter med namn		— 50
„ <i>cinnamomea majalis</i> , <i>Bukettrös</i>		— 25
	pr 12 st., rdr	2,50.
„ <i>damascena</i> , flera sorter med namn		— 75
„ <i>gallica</i> , (<i>provinsialis</i>) med namn		— 50
„ <i>hybrida</i> , många sorter med namn		— 75
„ „ <i>remontant</i> , många sorter m. namn		1 —
	pr 50 st. i 50 sorter,	45 rdr.

Pr st. Rmt Rd ö.

Rosa hybrida remontant stamformiga ,	många olika sorter med namn	2 —
	pr 12 st., 20 rdr.	
„ <i>lutea</i> , Gula Rosor, olika sorter m. namn		— 75
„ „ <i>Persian yellow</i>		1,75
„ „ enkla, gula	pr 12 st., 5 rdr	— 50
„ <i>Mannettii</i>	pr 12 st., 5 rdr	— 50
„ <i>muscosa</i> , <i>Mossrosor</i> , flera olika, röda sorter med namn		1 —
„ <i>pimpinellifolia</i>	pr 12 st., 3 rdr	— 30
	pr 100 st., 25 rdr.	
„ <i>rubifolia belle</i> Baltimore, slingrande		1,25
„ „ <i>belle of the prairies</i> , slingrande		1,25
„ <i>semperflorens</i>	pr 12 st., 10 rdr	1 —
„ <i>Thea</i> , <i>Térosor</i> , många olika sorter		1,25
Då urvalet anförts oss, lemnas:		
100 st. Frilandsrosor, olika m. namn		50 rdr.
25 „ „ olika sorter med namn		13 „
12 „ „ sorter med namn		7 „
100 „ „ „ utan namn, i rummel		15 „
50 „ „ „ „ namn, i rummel		8 „
25 „ „ „ „ i rummel		5 „
12 „ „ „ „ „ i rummel		3 „

V. Fröplantor till Ettåriga Blomsterväxter:

Dessa plantor expedieras blott i Maj & Juni. Behandling m. m., se fröförteckningen, pag. 14 till 43.

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Acroclonium roseum , röd och hvit		— 75
	pr 25 st., 25 öre.	
Amaranthus bicolor fol. purpureis		2 —
	pr 25 st., 60 öre.	
Antirrhinum majus , <i>Lejongap</i>		2 —
	pr 25 st., 60 öre.	
„ majus <i>nanissimus</i> , dvergformiga		2,50
	pr 25 st., 70 öre.	
Artemisia annua , i krukor, till bladgr.		16 —
	pr 12 st., 2 rdr.	
„ <i>gracilis</i> , i krukor, pr 12 st., 2 rdr.		16 —

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Aster , olika sorter, pr 25 st., 50 öre.		1,75
Brachycome iberidifolia , pr 25 st., 30 ö.		1 —
Cacalia (<i>Emilia</i>) <i>sonenifolia</i>		— 75
	pr 25 st., 25 öre.	
Cheiranthus Cheiri , <i>Gyllenlack</i>		2 —
	pr 25 st., 60 öre.	
„ Större exemplar, se krukväxter.		
Celosia cristata , <i>Tuppkam</i> , i krukor		16 —
	pr 12 st., 2 rdr.	
Chrysanthemum carinatum , olika		1 —
	pr 25 st., 30 öre.	

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Clarkia , flera sorter, pr 25 st., 30 öre. 1 —
Coreopsis , flera sorter, pr 25 st., 30 öre. 1 —
Dianthus chinensis , flera sorter . . . 1 — pr 25 st., 30 öre.
Helichrysum , fl. sorter, pr 25 st., 25 ö. — 75
Impatiens Balsamina , i krukor . . . 16 — pr 12 st., 2 rdr.
Lobelia Erinus , flera sorter i krukor. 16 — pr 12 st., 2 rdr.
Mathiola annua , <i>Sommarlöfkojor</i> . . . 2 — pr 25 st., 60 öre.
„ <i>incana</i> , <i>Vinterlöfkojor</i> , pr 25 st., 60 ö. 2 —
Mimulus , fl. sort. i krukor, pr 12 st., 2 rdr. 16 —
Mirabilis , fl. sort. i kr., pr 12 st., 50 ö. 4 —
Perilla nankinensis , med bruna blad, i krukor . . . pr 12 st., rdr 1,50. 12 —
Petunia , flera sorter, pr 25 st., 60 öre. 2 —
Phlox Drummondii , flera sorter . . . 2 — pr 25 st., 60 öre.

Pr 100 st. Rmt Rd ö.

Pyrethrum parthenifol. aur., utmärkt till infattningar. . pr 25 st., 80 öre. 3 —
Ricinus , <i>Underträd</i> , flera sort. i krukor 24 — pr 12 st., 3 rdr.
Salpiglossis , fl. sort., pr 25 st., 80 ö. 3 —
Sanvitalia procumbens fl. pl., lågväxt 1 — pr 25 st., 30 öre.
Scabiosa atropurpurea , pr 25 st., 25 ö. — 75
Senecio elegans , i fl. färg., pr 25 st., 30 ö. 1 —
Solanum , flera sorter till bladgrupper, i krukor pr 12 st., 3 rdr. 24 —
Tagetes , i flera färg., pr 25 st., 25 öre. — 75
Tropaeolum Lobbianum , flera sorter i krukor pr 12 st., 3 rdr. 24 —
Viola tricolor maxima , pr 25 st., 60 öre 2 —
Zinnia elegans . . . pr 25 st., 60 öre. 2 — „ <i>elegans</i> fl. pl. . . pr 25 st., 70 öre. 2,50
Zea , Majs i krukor, till bladgrupper . 16 — pr 12 st., 2 rdr.
„ „ föl var., i kruk., pr 12 st., 2 rdr. 16 —

VI. Två- och fleråriga Blomsterväxter:

Till grupper, rabatter och infattningar. Behandling m. m., se fröförteckningen, pag. 43 till 54.

Pr st. Rmt Rd ö.

Achillea; Rölleka , (Senecionideæ.)
„ <i>filipendula</i> (tanacetif) 2 1/2 à 3 f. h., gul — 30
„ <i>Millefolium</i> fl. roseo, 1 1/2 f. h., roseur. — 20
„ <i>nobilis</i> . 1 1/2 fot hög, hvit. — 35
Aconitum; Stormhatt, Blåskor eller Jungfru Maria sko , (Ranunculaceæ.)
flera sorter — 25
Adonis; Gossen i det gröna , (Ranunculaceæ.)
„ <i>vernalis</i> , 1 fot hög, guldgul — 30
Ajuga; Käringkruka , (Labiatae.)
„ <i>reptans</i> , pr 100 st. 4 rdr; 12 st., 50 ö. — —
„ Lågväxt, krypande infattningar, med blå blmr. Bör kanthuggas hvarje år, att den ej för mycket utbreder sig.
Alechmilla; Daggkäpa , (Rosaceæ.)
„ <i>vulgaris</i> , pr 100 st., 2 rdr; 12 st., 25 ö. — —
En hos oss allmänt förekommande, vild växt, som för sina vackert bildade blad förtjänar att användas till infattningar.
Allium; Löök , (Asphodoleæ.)
„ <i>Moly</i> , 1 fot hög, gul, pr 12 st., 50 öre — —
„ <i>Victorialis</i> , <i>Ormlök</i> , 1 f. hög, hvitaktig — 30
Alstroemeria , se krukväxter.
Athæa; Stockros , (Malvaceæ.)
„ <i>rosea</i> , förbättrade s. k. <i>Skottiska Malver</i> :
100 st. i 12 olika, särsk. färger, rdr 20 — — —
50 „ i 12 „ särskilda färger „ 12 — — —
12 „ i 12 „ „ färger . . . „ 3,50 — 35
100 „ alla färgerna blandade „ 15 — — —
25 „ „ färgerna blandade „ 4,50 — —
12 „ „ „ blandade „ 2,75 — 25
Dessa utmärkta praktväxter fördras en lös, nä- rande, djupt bearbetad jordmån; se även rubri- ken modeblommor i fröförteckningen.
Alyssum; Stenört, Gråddräda , (Cruciferae.)
„ <i>Wierbeckii</i> , 1 à 1 1/2 fot hög, gul. — 35

Pr st. Rmt Rd ö.

Amsonia , (Apocynæe.)
„ <i>salicifolia</i> , 1 1/2 fot hög, blå — 40
Anemone; Sippa; Anemon , (Ranunculaceæ.)
„ <i>alba</i> , 1 f. h., hvit storbl., pr 12 st., 2 rdr — 25
„ <i>albana</i> (Pulsatilla) — 45
„ <i>coronaria</i> , dubbla i flera färger . . . — 6 pr 100 st., 4 rdr; 12 st., 60 ö.
„ „ enkla i flera färger — 5 pr 100 st., 3 rdr; 12 st., 50 ö.
„ „ dubbla m. namn, pr 12 st., 1 rdr — 10
„ <i>japonica</i> , (Atragene) fl. roseo . . . 1 —
„ <i>Honorine Jobert</i> , hvit 1,25
„ <i>rosea</i> 1 —
„ <i>multifida</i> , 1 fot hög, rödaktig — 40
„ <i>nemorosa</i> pr 100 st., 1 rdr — —
„ <i>sylvestris</i> , 1 fot hög, hvit — 50
Vackra växter; A. jap. med variet. hafva ganska stora hvita eller ljusröda blmr. De kunna öfver- vintras i oeldadt boningsrum och på vissa ställen, under god betäckning, äfven på fritt land.
Anthericum; Sandtillja , (Asphodoleæ.)
„ <i>Liliago</i> , 1 à 2 fot hög, hvit. — 40
„ <i>ramosum</i> , 1 à 2 fot hög, hvit — 40
Antirrhinum , se föregående rubrik: fröplantor till ettåriga blomsterväxter.
Apuilegia; Akoleja , (Ranunculaceæ.)
„ många olika sorter med dubbla och enkla blommor, pr 12 st., rdr 2,50 — 25
„ <i>Vervaneana</i> , med brokiga blad . . . — 40
Aralia; Bergangelika , (Araliaceæ.)
„ <i>racemosa</i> , vacker bladväxt — 50
Aristolochia; Pipblomster , (Aristolochiæe.)
„ <i>Clematitis</i> — 20
En sällsynt, svensk växt med mycket vackra blad, men oansenliga blommor.

Pr st. Rmt Rd ö.

Armeria; Gräsneqlika eller *Sandneqlika*, (Plumbaginææ.)

- " *maritima*, Engelskt gräs, låg med ljus-röda blommor — 15
 " *pinifolia*, 1 fot hög, ljusröd — 25
 " *plantaginea* — 35

Arundo, se krukväxter.

Asarum; Hasselört, (Asaroidææ.)

- " *europæum* — 40
 En sällsynt, svensk växt; användbar till bredare infattningar.

Asclepias; Svalrot, (Asclepiadææ.)

- " *syriaca*, 4 å 5 fot hög, ljusröd — 25

Astrantia; Stjernfloka, (Umbelliferææ.)

- " *major*, 1½ å 2 fot hög, rödlett — 35

Aubrietia, Cruciferææ.)

- " *græca*, lågväxt, violett — 30

Baptisia, (Papilionaceæ.)

- " *australis*, 2 å 3 fot hög, blå — 50

- " *exaltata*, 2 å 3 fot hög, blå — 50

Bellis; Tusenskönna, (Asteroidææ.)

- " *perennis*, pr 100 st., 4 rdr; 12 st., 60 ö. — 6

- " i krukor . . . pr 12 st., 3 rdr — 35

Bryonia; Hundrosva, (Cucurbitaceæ.)

- " *alba*, känd slingerväxt, pr 12 st., 5 rdr — 50

Caltha; Kabbalök; Kaljeka, (Ranunculaceæ.)

- " *palustris* fl pl., 1 fot hög, gul. 1 —

Calystegia; Björnefva, (Convolvulaceæ.)

- " *pubescens* . . . pr 12 st., 50 öre — 5

- " *sepium* pr 12 st., 50 öre — 5

Rankväxter med vackra blommor, som dock lätt kunna urarta till besvärliga ogräs.

Campanula; Klockblomster, (Campanulaceæ.)

- " *alliarifolia* (lamifol.) 1 å 2 f. h., hvit — 50

- " *carpathica*, 1 f. h., blå, pr 12 st., 1 rdr — 10
 Vacker till infattningar.

- " fl. *alba*, 1 fot hög, hvit — 20

- " *gummifera*, 1 fot hög, blå — 35

- " *lactiflora*, 3 å 4 fot hög, blåhvit — 45

- " *latifolia*, 3 å 4 fot hög, blå — 30

- " *Medium*, 3 fot hög, blå eller hvit — 10
 pr 12 st., 1 rdr.

- " fl. pl., dubbel, pr 12 st., rdr 1,50 — 15

- " *nitida*, 2 fot hög, blå, vacker — 25

- " *persicifolia*, 1½ fot hög, blå — 20

- " fl. pl., dubbel — 50

- " *rhomboidæa*, låg, blå — 25

- " *soldanelliflora* pl., dubbel — 50

- " *rotundifolia*, 1 fot hög, blå — 20

Cedronella; Cedronell, (Labiataææ.)

- " *cana*, 1 fot hög, röd — 50

Cerastium; Caryophylleæ.)

- " *Biebersteinii*, pr 100 st., 6 rdr;

- pr 12 st., 80 öre — 8

- " *tomentosum*, pr 100 st., 6 rdr;

- pr 12 st., 80 öre. — 8

Låga, alldeles hvita, vackra växter till infattn. och ornamentala anordningar på finare gräsmattor.

Chelone; Sköldblomster, (Scrophulariaceæ.)

- " *barbata*, 4 fot hög, röd — 40

Clematis, se Träd och buskar till alléer,

park- och trädgårdsanläggningar.

Pr st. Rmt Rd ö.

Colechicum; Tidlösa eller *Nakna Jungfrun*, (Melanthaceæ.)

- " *autumnale*, violett — 30

- " fl. *albo*, hvit — 15

- " *purpurea* pl., dubbel, röd — 15

- " *variegata*, varierande — 30

Convallaria; Liljekonvalje, (Smilacineæ.)

- " *majalis*, vanlig, pr 100 st., rdr 3,50;

- pr 12 st., 50 öre — 5

- " fl. *roseo*, rödaktiga blommor — 50

- " *Polygonatum* — 25

Crocus; Saffranblomster, (Iridææ.)

- " i rummel . . pr 100 st., rdr 1,50;

- pr 12 st., 20 öre — —

- " *sativus*, pr 100 st., 3 rdr; 12 st. 40 öre — —

Expediteras blott om hösten.

Crucianella; Korsblad, (Rubiaceæ.)

- " *stylosa*, låg, röd — 25

Cyclamen, se krukväxter.

Cynoglossum. Hundtunga, (Boraginææ.)

- " *coelestinum*, 1 å 2 fot hög, blå — 40

- " *glochidiatum*, 2 å 3 fot hög, blå — 40

Dahlia, se Georgina

Delphinium; Riddarsporre, (Ranunculaceæ.)

- " *chinense*, 1 fot hög, blå eller hvit — 25

- " *formosum*, 2 å 3 fot, blå, praktfull — 25

- pr 12 st., rdr 2,50.

- " *album cœruleum* — 50

- " flera andra högväxta sorter — 25

Desmodium; Bjetterskida, (Hedysarææ.)

- " *canadense*, 2 å 3 fot hög, röd — 40

Dianthus; Neglika, (Caryophylleæ.)

- " *atrorubens*, 1 å 2 fot hög, mörkröd — 40

- " *barbatus*, *Borstneglika*, p. 12 st. rdr 1,50 — 15

- " *Caryophyllus*, starka blombara plantor

- efter 1:ma sort frö, pr 100 st., 8 rdr;

- 50 st., 4,50; 25 st., 2,50; 12 st., 1,50 — 15

- " *dentosus*, 1 fot hög, ljusröd — 50

- " *deltoidæus*, *Ängsneglika*, till infattn. — 20

- " *plumarius*, *Kjäderneglika* — 15

- pr 12 st., rdr 1,50.

Dielytra; Blomsterlyra, (Fumariaceæ.)

- " *spectabilis* pr 12 st., 4 rdr — 40

Digitalis; Fingerborgsblomster, (Scrophulariaceæ.)

- " *aurea*, 2 å 3 fot hög, gul. — 35

- " *Buxbaumii*, 5 å 6 fot hög, gulhvit — 50

- " *ferruginea*, 4 å 5 fot hög, gulaktig — 40

- " *purpurea*, 2 å 3 fot, pr 12 st., 2 rdr — 20

- " *gloxiniæflora*, pr 12 st., rdr 2,50 — 25

Dodecatheon; Gudsgäfa eller *Gudsblomster*, (Primulaceæ.)

- " *Meadia*, 1 fot hög, hvit eller röd — 50

- " *integrifolia*, 1 fot hög, röd — 50

Doronicum; Gensrot, (Senecionidææ.)

- " *caucasicum*, 1 å 1½ fot hög, gul — 20

- " *pardalianches*, 2 å 3 fot hög, gul — 20

- " *plantagineum*, 1½ fot hög, gul — 20

Dracocephalum; Drakhusfvad, (Labiataææ.)

- " *argunense*, blå — 25

- " *altajense*, blå — 25

Epilobium; Mjölke, (Onagrariceæ.)

Pr st. Rmt Rd ö.

- Epilobium angustifolium*, 3 à 4 f. hög, röd — 15
 " *hirsutum*, 3 à 4 fot hög, röd — 15
 Svenska växter med vackra blmr. Kunnna lätt urarta till besv. ogräs, om man ej afskär fröstänglarne innan fröet hunnit mogna, eller om man försommår att utrota alla öfverfl. plantor.

Epemedium, (Berberideæ.)

- " *alpinum*, 1 fot hög — 50
 " *chrysanthum*, 1/2 fot hög — 50
 " *macranthum*, 1/2 fot hög — 50

Erythronium; *Hundtand*, (Liliaceæ.)

- " *dens canis*, vacker, tål vintern . . . — 25

Fritillaria, (Liliaceæ.)

- " *imperialis* Aurora, röd — 45
 " " fl. pl., dubbel, röd 1,50
 " " enkel, röd — 40
 " " enkel, gul — 80
 " " *Meleagris*, *Dampselblomster* . . . — 35

Funkia, (Liliaceæ.)

- " *cuculata* — 75
 " " *alba marg.*, med hvitrandiga blad 1 —
 " " *viridi-maculata* 1,50
 " *grandiflora* 1 —
 " " fol. var., med brokiga blad . . . 1,50
 " *lancifolia* — 50
 " " fl. albo — 50
 " " fol. marg., med brokiga blad . — 50
 " *ovata* — 50
 " " fol. var., med brokiga blad . . . 1 —
 " *subcordata* — 50
 " *undulata* — 50
 " " fol. eleg. var., med vackra blad — 75
 Präktiga rabattväxter med vackra blad och blmr. Fordra tunn betäckning mot mycket stark köld.

Galanthus; *Snödropp*, (Liliaceæ.)

- " *nivalis*, dubbla, pr 100 st., 6 rdr; pr 12 st., 80 öre. — 8
 " " enkla . . . pr 100 st., rdr 2,75; pr 12 st., 40 öre. — 5
 Expedieras endast från Sept. till och med Nov.

Galega, (Leguminosæ.)

- " *officinalis*, 2 à 5 fot h., blå eller hvit — 25
 " *orientalis*, 2 à 4 fot hög, blå . . . — 35
 " *persica*, 2 à 3 fot hög, hvit . . . — 35

Gentiana; *Höstklöcka*, (Gentianeæ.)

- " *Pseumonanthe*, 8 à 12 tum hög, blå — 50

Georgina; *Georgin*; *Dahlia*, (Asteroideæ.)

- 200 vackra sorter med namn rdr 70 — —
 100 " sorter med namn 36 — —
 25 " " med namn 9,50 — —
 12 " " namn 5 — 50
 100 " utan namn, i rummel 18 — —
 25 " " namn, i rummel 5 — —
 12 " " " i rummel 2,50 — 25
 200 sticklingspl. med namn 40 — —
 100 " vackra sorter m. namn 22 — —
 25 " " sorter med namn 5,75 — —
 12 " " med namn 3 — 30
 Sticklingsplantorna expedieras i Maj & Juni.

Geranium; *Storknäbb*, (Geraniaceæ.)

- " *macrorrhizon*, 1 fot hög, röd . . . — 40
 " *pratense*, 1 à 2 fot hög, blå . . . — 25
 Gum, se krukväxter.

Pr st. Rmt Rd ö.

Gladiolus, (Irideæ.)

- " *blandus* pr 12 st., 3 rdr — 30
 " *Brenchleyensis* . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 " *cardinalis* pr 12 st., rdr 3,50 — 35
 " *Collvillii* pr 12 st., 3 rdr — 30
 " *communis* pr 12 st., 50 öre — 5
 " *byzantinus* pr 12 st., 1 rdr — 10
 " *floribundus* pr 12 st., rdr 2,50 — 25
 " *gandavensis* . . . pr 12 st., rdr 2,50 — 25
 " " med namn . . pr 12 st., 4 rdr — 40
 " *psittacinus* pr 12 st., rdr 2,50 — 25
 Dessa växter tillhöra trädgårdens förnämsta prydnadsblmr. Pl. i April uti krukor i god, sandbl. löfjord och ställas sedan i ljum (ej varm) drifbänk samt luftas och vattnas rikl. Utpl. i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land i fet, lucker, men ej nygödslad jord. Lökarna upptagas om hösten och öfvervintra torra. Expedieras till här anförda priser blott från Okt. till i April; under den öfriga tiden expedieras de i krukor och äro då dyrare.

Globularia; *Bergskrabba*, (Globulariæ.)

- " *trichosantha*, vacker — 50
 Gynnerion, se krukväxter.

Gypsophila; *Gipsblomster*, (Caryophyllæ.)

- " *paniculata*, 3 à 4 fot hög, hvit . . . — 40
 " *Stevenii*, 3 fot hög, hvit — 40

Helleborus; *Prustrot*; *Nysrot*, (Ranunculaceæ.)

- " *viridis* — 50

Heimerocallis; *Daghlilja*, (Liliaceæ.)

- " *flava*, 2 fot hög, gul — 50
 " *fulva*, 2 fot hög, orangefärgad . . . — 50
 " " fol. var., med brokiga blad . . . — 50
 " *graminea*, 1 à 1 1/2 fot hög, gul . . . — 50
 " *Kvanso fol. var.*, med brokiga blad 1 —
 " " fl. pl. dubbel 1,50
 De tvänne sistnämnda kunna äfven odlas i krukor i god löf- och drifbänkjord. Hafva vackra blad och blmr. Uthärda vintern under god betäckning.

Hepatica; *Sippa*, (Ranunculaceæ.)

- " *triloba*, (Amemone Hep.) vanlig, blå — 25
 " " fl. alba, hvit — 35
 " " *rubra*, röd — 35

Heracleum; *Björnfloka* eller *Herkulesört*, (Umbellifereæ.)

- " *giganteum*, vack. bladv., p. 12 st., 2 rdr — 20

Hesperis; *Nattviol*, (Crucifereæ.)

- " *matronalis*, 3 fot hög, hvit eller röd — 25
 " *tristis*, 2 fot hög, grå, väluktande . — 25

Hieracium; *Hälsblomster*, (Cichoraceæ.)

- " *aurantiacum*, 1 fot hög, orangefärgad — 25

Hyacinthus; *Hyacint*, (Asphodoleæ.)

- " *orientalis*, 1:ma, pr 100 st., 17 rdr — 25
 50 st. 9 rdr, 25 st. 4,75, 12 st. rdr 2,50.
 Expedieras blott om hösten.

Hyoseyamos; *Bolnört*, (Solanaaceæ.)

- " *orientalis*, 2 fot hög, violett — 50

Iris; *Svärdslilja*, (Irideæ.)

- " *germanica*, nya, praktfulla, variet. — 50
 pr 25 st. med namn, 10 rdr.
 " *graminea* — 40
 " *hungarica* — 40
 " *pumila* — 50
 " *sibirica* — 30
 Öfriga sorter, se krukväxter.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Lathyrus; Ärtblomster, (Papilionaceæ.)**
 „ latifolius — 50
Ligularia; Bandblomster, (Senecionideæ.)
 „ macrophylla, 5 à 6 fot hög, gul . . . — 30
Lilium; Lilja, (Liliaceæ.)
 „ atrosanguineum — 50
 „ auratum, se krukväxter.
 „ bulbiferum, brandgul, pr 12 st., 2 rdr — 20
 „ aurantiacum . . . pr 12 st., 5 rdr — 50
 „ „ punctatatum — 50
 „ „ umbellatum . . . pr 12 st., 5 rdr — 50
 „ candidum, Hvit Lilja, pr 12 st., 3 rdr — 30
 „ fl. pl. — 50
 „ corceum, saffrangul, p. 12 st., rdr 2,50 — 25
 „ exelsum, gulaktig 1,25
 „ fulgens — 50
 „ „ umbellatum erectum — 50
 „ „ incomparable — 60
 „ lancifolium . . . pr 12 st., 10 rdr 1 —
 „ „ album . . . pr 12 st., 10 rdr 1 —
 „ „ punctatum 1,50
 „ „ rubrum 1 —
 „ longiflorum . . . pr 12 st., rdr 2,50 — 25
 „ Martagon . . . pr 12 st., 7 rdr — 70
 „ sibiricum — 50
 „ „ splendens — 75
 „ „ superbum 1 —
 „ tigrinum — 50
 „ venustum — 75
 Efter vårt val lemnas:
 25 sorter Liljor med namn, 12 rdr.
 12 vackra sorter med namn, 8 ”
Lupinus; Vargböna, (Leguminosæ.)
 „ grandifolius (macroph.) 3 f. h., violett — 25
 „ laxiflorus, 2 à 3 fot hög, purpurröd — 35
 „ mexicanus, 2 à 3 fot hög, violett — 40
 „ polyphullus, 2 à 3 f. h., blå, violett — 25
Lycnisis; Studentneglika eller Tjårblomster, (Caryophyllæ.)
 „ chalcædonica, 3 fot hög, högröd . . . — 25
 „ „ fl. albo, hvit — 25
 „ coronaria (Agrostemma) 1 fot h., röd — 15
 „ „ „ pr 12 st., rdr 1,50.
 „ „ alba, hvit . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 „ „ bicolor . . . pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 „ fulgens, 2 fot hög, röd — 50
 „ „ Hageana, 2 f. hög, röd eller hvit — 50
 „ „ grandifl., 2 f. hög, röd eller hvit — 50
 „ Sieboldii, 1 fot hög, hvit — 50
 „ viscaria splendens, 1 fot hög, röd . . — 15
 „ „ pr 12 st., rdr 1,50.
Lyttrum; Fackelblomster. (Lythriaceæ.)
 „ Salicaria roseum superbum, 3 à 4 fot hög, röd — 25
 „ virgatum, 3 à 4 fot hög, röd — 25
Malva; Kattost, (Malvaceæ.)
 „ Morenii, 1 à 2 fot hög, rosenröd . . . — 25
 „ moschata, 2 fot hög, röd eller hvit. — 30
Mentha; Mynta, (Labiatae.)
 „ rotundifol., fol. var., pr 12 st., 1 rdr — 10
 Starkt väluktande med brokiga blad. Sårdele passande till infattningar. Fordrar svag betäckning under barfrost.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Meum, (Umbelliferae.)**
 „ athamanticum, 1 fot hög, hvit . . . — 40
 Blommorna obetydliga; bladen mycket vackra.
Mimulus, se krukväxter.
Mulgidium, (Cichoraceæ.)
 „ floridanum, 4 à 5 fot hög, violett . — 25
Muscari; Perlyacinth, (Asphodoleæ.)
 „ botryoides alba — 65
 „ „ coerulea — 10
Myosotis; Förgät-mig-öj, (Boraginæ.)
 „ alpestris, 1 f. h., blå, pr 12 st., 50 ö. — 5
 „ „ fl. roseo, rödaktig — 15
Narcissus; Narciss, (Amaryllideæ.)
 „ poeticus, Pingsstilla, hvit 6
 „ „ „ pr 100 st., 4 rdr.
 „ „ fl. pl., dubbel, hvitt — 15
 „ „ „ pr 12 st., rdr 1,50.
 „ Pseudonarcissus, Pasklilja — 15
 „ „ „ pr 12 st., rdr 1,50.
Oenothera; Natljus. (Onagariæ.)
 „ fruticosa, 2 fot hög, höggul — 20
 „ glauca, 1 f. h., gul, pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 „ Jamesii, 2 à 3 fot hög, gul — 15
Omphalodes; Venusblomster, (Boraginæ.)
 „ verna, 1/2 f. h., blå, pr 12 st., rdr 1,50 — 15
Ornithogalum; Fågelnjolk, (Asphodoleæ.)
 „ narbonneuse, 2 fot hög, hvit — 50
Orobis; Skogsårta, (Papilionaceæ.)
 „ lathyroides, 2 à 3 fot hög, blå . . . — 40
 „ venosus, 12 à 16 tum hög, blå . . . — 40
Oxalis, se krukväxter.
Pæonia; Pion eller Bondros, (Ranunculaceæ.)
 „ chinensis & herbacea med namn . . . 1 —
 „ „ pr 12 st., utm. sort. m. namn 10 rdr.
 „ arborea, Moutanpion, utm. sorter . . 3 —
Papaver; Vallmo, (Papaveraceæ.)
 „ bracteatum, 2 fot hög, högröd . . . — 25
 „ orientale 2 fot hög, skarlahanröd . — 25
Pelargonium, se krukväxter.
Penstemon, se krukväxter.
Petasites; Pestrot, (Eupatoriaceæ.)
 „ officinalis — 25
 Bladväxter; trivas på fuktiga, skuggiga ställen.
Phalaris; Rörflen, (Graminææ.)
 „ arundinacea var coerulea, Bandgräs — 8
 „ „ pr 12 st., 75 öre.
Phlox; Höstsyren, (Polemoniaceæ.)
 „ perennis & suffruticosa med namn — 45
 25 vackra sorter med namn rdr 9 — —
 12 „ sorter med namn . . . 4,50 — —
Polemonium; Venusögn, (Polemoniæ.)
 „ coerulea, 2 fot hög, blå och hvit . . — 15
 „ „ fol. var. utmärkt vacker — 50
 Den sistnämnda, som har brokiga blad, är äfven en präktig krukväxt.
Polygonom; Bohvete, (Polygonæ.)
 „ Bistorta, 1 à 2 fot hög, ljusröd . . . — 25
 „ polymorphum ajanense, 1/2 fot hög. — 25
Potentilla; Fingerört, (Rosaceæ.)
 „ alba, 1 fot hög, hvit — 40
 „ atrosanguinea, 2 fot hög, mörkröd . — 30
 „ aurea, 1 fot hög, gul — 25
 „ formosa, 2 à 3 fot hög, ljusröd . . . — 30

- Pr st. Rmt Rd ö.
- Potentilla hybrida, flera sorter, 2 à 3 f. h. — 30
 " Mac Nabiana, 2 fot hög, mörkröd . — 40
- Prunus; Majnyckel, Gullvifva eller Oxlägga,**
 (Primulaceæ.)
 " acaulis fl. luteo, utmärkt vacker. . — 50
 " " fl. rubro, röda blommor, vacker. — 50
 " Auricula, plantor efter bästa sort frö — 15
 pr 12 st., rdr 1,50.
 " elatior pr 100 st., 6 rdr — 8
 " luteola — 50
 " mollis, mörkcarmin. — 50
 " suaveolens pr 100 st., 9 rdr — 12
 " veris, vanlig, gul, pr 100 st., 6 rdr — 8
- Ptarmica, (Senecionideæ.)**
 " Clavennæ, fl. pl., 2 fot hög, hvit . — 50
 " vulgaris fl. pl. 2 à 3 fot hög, hvit — 25
 Särdeles användbara till buketter.
- Pulmonaria; Lefverört, (Boragineæ.)**
 " officinalis, 1 fot hög, violett. . . — 25
- Pyrethrum; Batvamsört, (Senecionideæ.)**
 " carneum, 2 fot hög, ljusröd . . . — 20
 pr 12 st., 2 rdr.
 " roseum, 2 fot hög, rosenröd . . . — 20
 pr 12 st., 2 rdr.
 " hybridum i flera praktfulla färger . — 40
 pr 12 st., 4 rdr.
- De båda förstnämnda sorterna lemna det bekanta persiska insektspulvret.
- Ranunculus; Ranunkel eller Smörblomster,**
 (Bannunculaceæ.)
 " acris fl. pl., gul, dubb., pr 12 st., 2 rdr — 20
 " asiaticus fl. pl., praktfulla sorter . — —
 pr 100 st. i rummel, 3 rdr.
 " " fl. pl., pr 12 st. i 6 sort m. n. 1 rdr — 10
 " cæcius, 4 à 5 fot hög, gul . . . — 25
 " gramineus, 1 fot hög, gul. — 25
 " repens fl. pl. pr 12 st., 50 öre — 5
- Rheum; Rhabarber, (Polygoneæ.)**
 " australe (Emodii) 6 à 7 fot hög . — 50
 " undulatum, 5 à 6 fot hög. — 30
 " " Queen Victoria, 5 à 6 fot hög . — 30
- Salvia, se krukväxter.
- Saponaria; Såpört, (Caryophyllææ.)**
 " officinalis fl. pl. pr 12 st., 1 rdr — 10
- Saxifraga; Stenbräcka, (Saxifrageæ.)**
 " crassifolia, ljusröd — 75
 " muscoides — 50
- Scilla; Hafslök, (Asphodoleæ.)**
 " amoena, blå pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 " campanulata, utmärkt prydlig . . . 1 —
 " sibirica, blå pr 12 st., rdr 2,50 — 25
 Vackra, tidigt blommande växter.
- Scutellaria; Hjelmört; Getnos, (Labiataæ.)**
 " macrantha, 1 fot hög, mörkviolett . — 25
- Sedum; Fetört; Fetknoppar, (Crassulaceæ.)**
 " Aizoon, 1 fot hög, gul, gul — 25
 " hybridum, kryp., röd, pr 12 st., 1 rdr — 10
 " spurium, kryp., gul, pr 12 st., 1 rdr — 10
 " Sieboldii — 50
- Senecio; Boört, (Senecionideæ.)**
 " Doria, 7 à 8 fot hög, gul. — 50
- Silphium; (Senecionideæ.)**
 " perfoliatum, 7-à 8 fot hög, gul . . — 50

- Pr st. Rmt Rd ö.
- Solidago; Guldbris, (Asteroideæ.)**
 " canadense, 3 à 4 fot hög, gul . . . — 30
- Spiræa; Brudspira, (Rosaceæ.)**
 " Auruncus mas., 3 fot hög, hvit . . . — 50
 " " foem., 3 fot hög, hvit. — 50
 " " rosea, 3 fot hög, rödaktig . . . — 50
 " japonica, (Hoteia) 1 à 2 f. h., hvit 1,25
 " Ulmaria, 2 fot hög, hvit — 25
 " " fl. pl., 2 fot hög, dubbel — 50
 " " fol. arg. var. med brokiga blad. — 50
 " " aureis var., utmärkt 1 50
- Stevia, se krukväxter.
- Stipa; Ljådergräs, (Gramineæ.)**
 " pennata pr 12 st., rdr 2,50. — 25
- Symphytum; Searrot, (Boraginææ.)**
 " officinalis, 4 à 5 fot hög, violett. . — 25
- Teleckia, (Asteroideæ.)**
 " cordifolia, 6 à 7 fot hög, gul . . . — 25
 " speciosa, 6 à 7 fot hög, gul. — 25
- Thalictrum; Ångsruta, (Ranunculaceæ.)**
 " acutilobum, 3 à 4 fot hög — 25
 " aquilegifolium, 4 fot hög — 50
 " appendiculatum, 2 à 3 fot hög. . . — 20
 " angustifolium — 30
 " calabricum, 2 à 3 fot hög — 30
 " Chelidonii, 3 à 5 fot hög — 25
 " galioides, 2 fot hög — 35
 " laserpitifolium, 3 à 4 fot hög . . . — 25
 " lucidum, 4 à 6 fot hög. — 50
 " minus, 1½ fot hög — 50
 " sparciforum — 25
 " trigynum — 25
- Alla hafva små, men ytterst talrika, blommor, hvilka, liksom de sköna örtbladen, äro mycket användbara till buketter.
- Tradesantia; (Commelineæ.)**
 " virginica pr 12 st., 2 rdr — 20
- Trollius; Ångboll, (Ranunculaceæ.)**
 " asiaticus, 1½ fot hög, gul — 50
 " giganteus, 2 fot hög, gul. — 50
- Tulipa; Tulpan, (Liliaceæ.)**
 " dubbla i fl. färger, pr 100 st., 4 rdr — —
 " enkla i fl. färger, pr 100 st., 4 rdr — —
 " dubbla & enkla bl., pr 100 st., 4 rdr — —
 pr 12 st., 60 öre.
- Expeditas blott på hösten från Sept. till Nov.
- Valeriana; Vändelrot, (Valerianææ.)**
 " alba — 25
- Veratrum, (Melanthaceæ.)**
 " nigrum — 50
- Verbascum; Kungsljus, (Scrophulariaceæ.)**
 " Lychnitis — 25
 " phoeniceum — 15
 " Thapsus — 20
- Verbena, se krukväxter.
- Veronica; Årenpris, (Scrophulariaceæ.)**
 " Bachofenii, 1 fot hög, blå. — 30
 " gentianoides, 1½ f. h., blåhv., till inf. — —
 pr 100 st., 5 rdr; 12 st., 75 öre. — 25
 " grandis, 2 fot hög, blå — 25
 " longifolia, 2 fot hög, blå — 25
 " spicata, 1 fot hög, blå — 25

	Pr st. Rmt Rd ö.
Vinca; Vintergröna. (Apocynææ.)	
" major fol. var.	— 50
" minor, pr 100 st., 7 rdr; 12 st., 1 rdr —	10
Viola; Viol.; Stjufmorsblomster. (Violarinææ.)	
" cornuta	— 20
" tricolor, se plantor till ettåriga blomsterv.	

	Pr st. Rmt Rd ö.
Då valet af sorterna öfverlätes åt oss, lemnas:	
100 st. två- och fleråriga blomsterväxter för fritt land	rdr 20
50 " två- och flerår. v. för fritt land " 11	
25 " och flerår. v. för fritt land " 6	
12 " " flerår. v. för fritt land " 3	

VII. Krukväxter.

T. betyder: att de växter, vid hvars namn det står, fordra om vintern + 3 ä 6° Cels. och kunna under sommarmånaderna utställas på lugna, något skuggiga ställen i det fria, hvarvid krukorna till hälften nedgrävas i sand; *V.*: att de böra öfvervintras vid + 10 ä 15° C; *B.*: att växterna trifvas i boningsrum och *E.*: att de kunna under sommaren utplanteras på kalljord, i hvilket fall de åter implanteras i krukor i medio af September. Då dessa tecken äro anförda vid slägt-namnet gälla de öfven för alla arterna. Växternas familjnamn och hemland finnes öfven angifvet.

Abelia, (Caprifoliaceæ.) T. F.	
" floribunda, Mexiko	— 50
Abobra, (Cucurbitaceæ.) T. F.	
" viridiflora	— 75
Abutilon, (Malvaceæ.)	
" brasiliense, Brasilien	1 —
" striatum, Brasilien	— 75
" Thompsonii, med gulsfäckiga blad 1 —	
" vexillarium (megapotanicum) Brasil. —	30
Bekanta, tacksamt blommande prydnadsväxter.	
Acacia; Akasia, (Mimosææ.) T. C.	
" albicans, Nya Holland	— 50
" armata, Nya Holland	— 50
" undulata (paradoxa)	— 50
" Brownii (ciliata) Nya Holland	1 —
" calamifolia, Nya Holland	— 75
" coccinea, Nya Holland	— 50
" cultriformis, Nya Holland	— 50
" cuneata, Nya Holland	— 75
" cyanophylla, Nya Holland	— 50
" dealbata (affinis) Nya Holland	— 75
" dentifera, Nya Holland	— 75
" descipiens, Nya Holland	— 50
" dolabriformis, Nya Holland	— 50
" falcata, Nya Holland	— 50
" floribunda, Nya Sydwaless	1 —
" glaucescens, Nya Holland	— 50
" glomerata, Nya Holland	— 75
" graveolens, Nya Holland	— 50
" heteroclada, Nya Holland	— 70
" homomalla, Nya Holland	— 75
" lanata, Nya Holland	1 —
" la Trobeii, Nya Holland	— 75
" leprosa, Nya Holland	— 50
" leucocephala, Nya Holland	— 50
" linearis, Nya Holland	— 50
" longifolia, Nya Holland	— 50
" magnifica	— 50
" pendula	1 —
" longissima elegans, Nya Holland	— 75
" lophanta, Nya Holland	— 50
" speciosa	— 75
" lunata, Nya Holland	— 50
" mollissima, Nya Holland	1 —

Acacia mucronata, Nya Holland	— 75
" myriobotrya, Nya Holland	— 75
" mytifolia, Nya Holland	1 —
" nematophylla, Nya Holland	1 —
" Neumanniana, Nya Holland	— 50
" oleifolia, Nya Holland	— 50
" retinoides, Nya Holland	— 75
" Sophora, Nya Holland	— 50
" xylophyloides, Nya Holland	— 75
25 sorter efter värt val, 15 rdr.	
12 vackra sorter	8
Akasierna höra till de kalla växthusens förn. prydnadsträd. De pl. i sandbl. löf- och ljungjord; fordra om vintern svåla platser och spars. vattning. Utställas om sommaren i det fria. Större exemplar, se praktväxter.	

Acanthus; Björnklo, (Acanthaceæ.) T. F.

" spinosus, S. Europa	1 —
Acanthorrhiza, (Palmeæ.) V.	
" aculeata, unga exemplar	10 —
Praktfull palm.	

Achimenes, (Gesneriaceæ.) V. B.

" många praktfulla sorter (från Sept. till Maj expedieras endast torra rhizomer) 12 sorter ä 1, 2 & 3 rh., 1,50 — 15
Från Maj till Sept. exp. blom. exempl. i krukor, hvarje kruka inneh.: 10, 15 ä 20 rhizomer. 12 st., 5 rdr — 50
Nätta, tacksamma blom, som trifvas bäst i half-rutten skogsjord, blandad m. sönderhackad hvitmossa och sand. Fordra för öfrigt jemn värme, fuktighet och skugga. Kunna under blomnings-tiden inflyttas i boningsrum.

Achyranthes, (Amaranthaceæ.) V. F.

" acuminata, S. Amerika, pr 12 st. 5 rdr —	50
" bourbonica, Ostindien	— 50
" Lindenii, S. Amerika, pr 12 st., 5 rdr —	50
" Verschaffeltii pr 100 st., 12 rdr —	20
" pr 12 st., 2 rdr.	

A. Lindenii är utm. vacker och brukbar till ät-skilliga ändamål. Alla hafva blodröda blad och äro mycket användbara till dekorationer, såväl inom-, som utombus. Fortpl. lätt genom stickl.

Acrostichum, (Polypodiææ.) V.

" brevipes (Elaphoglossum callæf.) Java 1 —	
" lomarioides, Java	2 —
" melanopus (Elaphogl.) Mell. Amerika 1 —	
Egendoml. ormbunkar, breda läderartade blad.	

Pr st. Rmt Rd ö.

- Acropera**, (Amaranthaceae.) V. F.
 „ fuscata, Mexiko 10 —
 „ Loddigesii, Mexiko 10 —
 „ Egendomliga, starkt välluktande blommor.
- Adamia**, (Saxifragae.) T. B.
 „ cyanea, Nepal — 50
 „ versicolor, Nepal — 50
 „ Vackra blommor, vita med rött och blekblått;
 fordra kraftig jord och måttlig vattning,
- Adiantum**; *Venus hår*, (Polypodiaceae.)
 „ calpodes, Trop. Amerika, V. 3 —
 „ capillus Veneris, S. Europa, V. T. B. — 50
 „ concinnum (tenerum) S. Am. V. T. B. — 50
 „ „ luteum, ny, utmärkt, V. 3 —
 „ chilense, Chili, ny, V. 3 —
 „ cuneatum, Brasil; Paraguay, V. T. — 75
 „ Cunninghamii, Brasilien, V. 1,50
 „ curvatum, Brasilien, V. 2 —
 „ decorum, ny, Trop. Amerika 3 —
 „ formosum, Nya Holland, T. B. — 75
 „ fulvum, Nya Zeeland, T. V. B. — 50
 „ hispidulum (pubescens) Ostindien; Nya
 Holland, T. V. B. — 50
 „ lunatum, Trop. Amerika, V. 2 —
 „ scoparium, S. Amerika, T. V. 1 —
 „ St. Catherina, Brasilien, V. 2 —
 „ sp. Costa Rica, V. 2,50
 12 st. efter vårt val, 16 rdr.
 Utm. vackra ormbunkar, hvars blad äro särde-
 les användb. till de finaste buketter. Passa förtr.
 till odl. i s. k. terrarier. För boningsr. äro A.
 capill. Vener., concinnum, formos., fulvum och
 hispidulum, bäst passande. Fordra jemn, lagom
 fuktighet och skydd mot solen. Planteras i half-
 ruten skogsjord.
- Aechmea**, (Bromeliaceae.) V.
 „ fulgens, Trop. Amerika 1 —
 „ miniata discolor, Trop. Amerika 2 —
 „ Weibachii (Lamprococcus Laurentianus)
 Trop. Amerika 1 —
 Ananasl. växter m. praktf. blm. och blomskär-
 mar. Pl. i halfmulnad jord och underhållas i
 varmt och fuktigt växthus. Kanna äfven fästas
 i mossor på träklossar med skroffig bark, hvilka
 upphängas i varmhuset och hållas jemnt fuktiga.
- Acerides**; *Luftblomster*, (Orchideae.) V.
 „ odorata, Kochinkina 10 —
 „ Praktfulla med starkt välluktande blm. Plan-
 teras i mossor, eller fastbindas vid en träkloss
 och hålles jemnt fuktig.
- Agapanthus**; *Flocklilja*, (Hemerocallidæe.)
 „ umbellatus, Godahoppssudden, T. B. F. 2,25
 Utmärkt för boningsrum. Planteras i närande
 jord, vattnas måttligt. Bör ej omplanteras förr
 än krukningarna äro fullkomligt genomrotade och
 då utan att rötterna skadas.
- Agathæa**, (Asteroideae.) T. B. F.
 „ coelestis fol var., Godahoppssudden — 30
 pr 12 st., 3 rdr.
 Vackra, himmelsblå blommor. Vacker till grup-
 per och garneringar kring högre växter.
- Agathosma**, (Biosmeae.)
 „ imbricata, Godahoppssudden — 50
 „ purpurea, Godahoppssudden — 50
 „ Snåbuskar med fint, aromatiskt luktdande blad
 och violetta blommor. Planteras i ljungjord.
- Agave**; *Hundraårs-alc.*, (Liliaceae.) T. F.
 „ americana, unga fröplantor — 50

Pr st. Rmt Rd ö.

- Agave aplanata, Mexiko, unga ex. 2,50
 „ lurida, Mexiko, unga ex. —
 „ Verschaffeltii, Mexiko, unga ex. 1 —
 „ Dessa jättelika växter, passa förträffligt till de-
 korat. i det fria om sommaren. De tåla sol och
 stark bläst. Hålla om vintern tillgodo med an-
 språkslösa platser i temp. växthus, boningsrum
 eller torra, luftiga källare. A. filifera uppnår ej
 samma kolossala storlek, som de öfriga. Dess
 styfva blad, från hvars kanter nedhänga talrika
 hvita trådar, bilda en vacker bukett. Se för
 öfrigt praktikexemplar af krukväxter.
- Alocasia**, (Aroidæe.) V.
 „ gigantea, ny, unga plantor 5 —
 „ Jenningii, ny 3 —
 „ macrorrhiza 1 —
 „ metallica; unga exemplar 5 —
 „ zebrina 2 å 10 —
 „ Hårtamma från tropiska länder, Borneo, Java,
 Ost- & Vestindien etc. och fordra, för att trivas
 väl, fuktiga, varma växthus. Pl. i löfjord. A.
 Jenningii har smaragdgröna, svartl. blad; ma-
 corrh. har vackra, hyttarmorerade blad och
 zebrina utmärker sig genom praktfulla marmo-
 rerade bladskärf. Utmärkta dekorationsväxter.
- Alpina**, (Scittamineae.) V.
 „ Cardamommum, Malabar 1 —
 „ Hvilas om vintern; bör då ej vattnas. Omplan-
 teras om våren.
- Alsophila**, (Polypodiaceae.)
 „ australis, Nya Holland, V. T., starka,
 vackra exemplar 2, 10 å 15 —
 „ radens, Brasilien, V. 5 —
 „ Bland dessa stäl., trädartade ormbunkar utm.
 sig synnerligast den förstn., hvars stam blifver
 ganska hög och tjock och hvars blad uppnå en
 längd af 6 å 8 fot och deröfver. Den trives i
 växthus v. + 8 å 10° C., men kan äfven odlas i
 varmare lokaler. Tål ej drag eller torr atmosfär.
- Astrocermeria**, (Amaryllidæe.) T. F.
 „ chilensis, Peru, Chili . 12 st., 5 rdr — 50
 „ psittacinus, Peru, Chili, 12 st., 5 rdr — 50
 „ Öfverv. torr och vid så låg temperatur, som
 möjligt. I Febr. ompl. de och ställas nära glasiet
 i ett temp. rum. Mot slutet af Maj nedgrävas
 krukningarna på grupper å frit land. Blommorna
 äro utmärkt vackra och skifta i otaliga färger.
- Althernanthera**, (Amärantaceae.) V.
 „ amabilis fol. majoribus, S. Amerika — 20
 pr 12 st., 2 rdr.
 „ floicida versicolor, S. Am., 12 st., 2 rdr — 20
 „ sessilis amoena, S. Am., 12 st., rdr 2,50 — 25
 „ spatulata, S. Amer., 12 st., rdr 2,50 — 25
 „ Dessa växters blad vexla i rött, gult och grönt.
 De blifva blott några tum höga och grenas sig
 starkt. Utmärkt användbara till dekorationer
 inom- och utomhus. Fortl. lätt genom stickl.
- Amaryllis**, (Amaryllidæe.)
 „ alba lineata, V. 1 —
 „ Belladonna, Vestindien, V., unga lökar 1,50
 „ formosissima, S. Amerika, T. B. — 30
 pr 12 st., 3 rdr.
 „ Johnsonii (Bastard) V. B. 1,50 å 3,50
 „ vittata, Godah.-udd., Vestind. V. B., 50 å 3,50
 „ Fordra under vegetationsstiden + 15 å 20 C. och
 rikligt vattnas. Under vintern, då lökarna hvilat,
 böra de stå aldeles torra. Ompl. om våren i
 kraftig jord. A. formosiss. kan om vintern drif-
 vas derigenom att man lägger dem på ett torrt,
 varmt ställe. Då blomkopparne framkomma
 inplanteras lökarna i krukor och vattnas.

Pr st. Rmt Rd ö.

Pr st. Rmt Rd ö.

Amomum; Ingefära, (Scitamineæ.) V.

" Zingiber, vanlig, Ostindien 1,50
 " Hvilar om hösten; vattnas då sparsamt; omplanteras om våren.

Amorphophallus, (Aroidæe.)

" bulbiferus, V. 2,50
 " campanulatus, T. 2 —
 " Märkvärdiga växter, hvars rotknölar ligga torra om vintern; omplanteras om våren.

Ancimia, (Osmundaceæ.)

" Phyllitis, Södra Amerika 1 —
 " Anemone, se två- & fleråriga blomsterväxter.

Anguloa, (Orchidæe.) V.

" Clovesii, Columbien 10 —
 " Besynnerliga, stora, gula, starkt väluktande blommor. Planteras i mossor.

Anthurium, (Aroidæe.) V.

" membranuliferum, Trop. Amerika 3 —
 " magnificum, Brasilien 6 —
 " miquelianum, Trop. Amerika 5 —
 " Scherzerianum, Guatemala, stark 10 —
 " signatum, Trop. Amerika 3 —
 " Utmärka sig dels för vackra blad och dels för vackra blmr. A. Scherzian. har zinnoberädda blmr, hvilka hålla sig friska flera månader. Alla fordra varm, fuktigt luft.

Aphelandra; (Acanthaceæ.) V.

" Leopoldii, Rio Janerio 1 —
 " Vackra, hviträndiga blad och högröda blommor.

Aralia; Berganlika, (Araliaceæ.)

" japonica (Faltzia) Japan, T. F. B. 5 —
 " papyrifera, Kina, T. F. B. 75 —
 " Båda utm. för sina blad. A. papyrif. lemnar materialet till det bekanta kinesiska sidenpapperet.

Araucaria, (Abietineæ.) T.

" Cunninghamii, N. Holland, 1½ f. h. 10 —
 " imbricata, Chili, yngre exemplar 2 —
 " Araucarierna anses vara de vackraste af alla barrträd. Planteras i god, närande löfjord; behöfva om vintern blott + 5 à 6° C.; utställas om sommaren i det fria. Se praktväxter.

Areca; Betelpalm, (Palmeæ.) V. B.

" aurea (Hyophorbe ind.) Ön Bourbon 10 —
 " lutescens, Trop. Amerika, unga ex. 10 —
 " rubra, Maskarerna, unga 2 —
 " Kunna odlas i boningar. Båra ofta besprutas med vatten och ej utsätts för kalla luftdrag. Större exemplar, se praktväxter.

Arenga; Sackerpalm, (Palmeæ.)

" saccharifera, Sundaöarne, starka 15 —
 " Uppnår betydlig storlek, en af de ståt. palmer.

Arisæma, (Aroidæe.) T. B.

" ringens, Japan 45 —
 " præc x, Japan 1 —
 " Vackra blad och egendoml. blmr. Rotknölarne hvilas om vintern, båra då ej vattn. Ompl. om våren.

Aristea, (Iridæe.) T.

" cyanea (Ixia afric.) Godahoppsudden — 50

Aristolochia; Pipblomster, (Aristolochiæe.)

" fimbriata, Trop. Amerika 1,50
 " grandiflora, Jamaica 2,50
 " Singerv. för fukt, växth.; ej vattn. om vintern.

Armeria, Sandnejlika, (Plumbagineæ.)

" formosa, S. Europa, T. 50

Artemisia, Gråbo, Malört, (Senecionidæe.)

" argentea, Madeira, T. F., 12 st., 4 rdr — 40
 " stora exemplar, pr 12 st., 10 rdr 1 —
 " Hafva fändelta, rent silfverhvita blad; användas

fördelaktigt i såväl blad, som blomstergrupper. Fortplantas genom sticklingar.

Arundo; Rör, (Gramineæ.)

" Donax, Jätterör, S. Europa, T. F. 2 —
 " fol. alb. var., praktfull, T. F. 2,50
 " Gigantiska grässlug. Planterade i växthusens fria grund uppnå de ofta 12 à 15 fots höjd.

Aspidistra; Ståndblomster, (Smilacineæ.)

" lurida, Kina, V. B. 1 —
 " punctata, Kina, V. B. 1 —
 " Bladen breda, olikformigt tecknade med hvita strimmor. Planteras i löf- och drifbänkfjord.

Aspidium; Taggbräken, (Folypodiæe.)

" Bertuchianum, T. F. 1 —
 " erythrorum, S. Amerika, T. V. 1 —
 " fraxinifolium, Brasilien, V. 1 —
 " glabellum, Nya Zeeland, T. F. 1 —
 " macrophyllum, Antillerna, V. 1,50
 " molle, Tropikerna, V. 72 —
 " Pica, Ön Bourbon, V. 2 —
 " trifoliatum, Sandvichsöarne, V. 1,50
 " quadrangulare, Nya Zeeland, T. F. 1,50
 " uliginosum, Java, V. 50 —
 " violascens, Brasilien, V. 50 —
 " Tropiska ormbunkar, som för sina vackra blad förtjena mycken uppmärksamhet. Planteras i halftruten skogsjord.

Asplenium. (Polopodiæe.)

" alternifolium, Java, V. 2 —
 " bulbiferum, N. Holl., T. B., 50 öre à 5 —
 " Belangerii, Java, V., vacker 1 à 5 —
 " canariense, Canariöarne, T. 50 —
 " caudatum, Trop. Amerika, V. 2 —
 " decussatum, Ostindien, V. 1 —
 " erectum, Trop. Amerika, V. 1,50
 " foeniculaceum, Venezuela, V. 1,50
 " firmum, Venezuela, V. 1,50
 " Filix foem., Sverge, T. F. 1,50
 " foem. coronatum 1 —
 " " diffusum 1,25
 " " multifidum 2 —
 " " Fieldii 2 —
 " " flexuosum 1,50
 " " fureans 1,50
 " " laciniatum dissectum 1,50
 " " multiceps 2 —
 " " purpurea 2 —
 " marinum, S. Europa, N. Afrika, T. — 75
 " præmorsum, Trop. Amerika, V. 1,50
 " Trichomanes, Sverge, T. F. 50 —
 " viviparum, Mauritius, V. 1 —
 " viride, Mell. Eur., N. Indien, T. F. 1 —
 " Vackra ormbunkar. Pl. i halftruten skogsjord. De med T. F. betecknade, hvartil höra alla A. Filix foem., kunna om sommaren utpl. på kalljord.

Athyrium, (Polypodiæe.) T.

" Goringianum pictum 1 —

Attalea, (Palmeæ.) V.

" maracaiensis, Maracaiberna, 10 —
 " Aucuba, se träd- & buskar till anläggningar.

Azalea; Kjellbrös, (Rhodoraceæ.) T. B.

" indica, nya vackra varieteter 1,50
 " pr 12 st., 15 rdr. —
 " gamla ex. med stora kronor 15 —
 " Azaleerna tillhöra de kalla växthusens förmästa

- Pr. st. Rmt Rd ö.
- prydnav. Blmarna variera i alla nyanser från vitt till mörkröd, och utbilda sig i April & Maj; men om man tidigt inställer ex. i varma lokaler, så blomma de redan i Jan., Febr. och Mars. Pl. i ljung- och löfjord; böra ej för starkt torka.
- Balanium, (Polypodiæ.) T.**
- " **antarcticum, Australien** 2,50
Praktfull ormbunke. Uppnår en betydlig storlek. Stora exemplar, se praktväxter.
- Bambusa; Bambu, (Graminæ.) T. F.**
- " **Fortunei fol. alb. vitt.** — 50
Vackert hvitrandigt gräs; passar till infattningar och dekorationer.
- Beaufortia, (Myrtacæ.) T.**
- " **decussata, Nya Holland** — 50
Blifver 4 å 6 fot hög med skarlakaröda blommor. Planteras i löf- och ljungjord.
- Begonia, (Begoniæ.) V. B.**
- " **argentea** 1,50
" **splendens** 1,50
" **boliviensis, Bolivia, T.** 1 —
" **Digswelliana** — 50
" **discolor, Kina, T.** — 50
" **erecta multiflora** 2,50
" **grandis** — 50
" **gracilis** — 50
" **incarnata, Brasilien, pr 12 st., 5 rdr** — 50
" **imperialis, Mexiko** 1 —
" **smaragdina** 1 —
" **Madame Camille Decandolle** 1 —
" **Wagner** — 75
" **marginata** — 75
" **nobilis** 1 —
" **Pearceii, Mexiko** 1 —
" **Professeur Lemaire, silfverhvita blad** — 50
" **quadricolor** 1 —
" **Queen Victoria** 1 —
" **Rex, Japan** — 50
" **magnifia** — 75
" **ricinifolia, Mexiko** — 75
" **robusta** — 50
" **Santa Maria.** — 75
" **splendens etrosanguinea** 1,50
" **Knerkii** 1 —
12 st efter vårt val, 10 rdr.
De sorter, hvars hemländer ej finnas uppgifna äro inom trädgårdar uppdagna hybrider och varieteter. Några sorter hafva vackra blmr, men de flesta odlas för de vackra, metallglänsande bladen. B. boliviensis, som har skarlakar. blmr, kan med fördel pl. på fritt land på lugna, skyddade platser. B. Digsw. blmar hela året, men rikast i Okt. och Nov. B. discolor är en länge känd sort med vackra, på baksidan röda blad och ljusröda blmr. B. Pearceii utm. sig genom smaragdgröna, svartarm. blad och vackra gula blmr.
- Berberis; Surtörne, (Berberidæ.) T.**
- " **Beali, Nepal** 1 —
" **Darwynii, Chili** 1 —
" Hafva om våren vackra, gula blommor i rika klasar. Planteras i löfjord.
- Bignonia; Trumpetblomster, (Bignoniæ.)**
- " **jasminifolia, Orinoko, T. V.** 1 —
Prydliga rankväxter med vackra, ljusröda blommor. Planteras i löfjord.
- Billardiera, (Pittosporæ.) T.**
- " **scandens, Nya Holland** 1 —
Planteras i sandblandad, lätt ljungjord.

- Pr. st. Rmt Rd ö.
- Billbergia, (Bromeliæ.) V.**
- " **alba, S. Amerika** — 50
" **amoena, Vestindien** — 75
" **aurantiaca rosea, S. Amerika** 1 —
" **coelestis, S. Amerika** 1 —
" **Liboniana, Brasilien** — 75
" **nutans, S. Amerika** 2 —
" **pyramidalis, S. Amerika** — 50
" **quadricolor, S. Amerika** — 75
" **splendida, S. Amerika** 1,50
Ananaslika med praktfulla blmr. Pl. i halfruten skogsjord, blandad med hackad vitmossa, eller fästas med messingstråd vid obarkade träklossar med mossor kring rötterna. Fordra värme och fuktighet.
- Blechnum, (Polypodiæ.)**
- " **boreale, Europa, T. F.** — 50
" **lanaiifolium** 1,50
" **ramosum** 1,50
" **brasiliense, Brasilien, V.** 5 —
" **corcovadense, Brasilien V.** 5 —
" **fraxineum, Columbien, V.** — 50
" **gracile, Brasilien, V.** 1,50
" **latifolium, Caracas, V.** 1 —
" **occidentale, Vestindien, V.** — 50
" **Patersonii, Nya Holland, T.** 2 —
Ormbunke. B. brasil. får stam; de öfriga äro låga, passande till odling i s. k. terrarier. Se vidare: Praktväxter.
- Bletia, (Orchidæ.) V.**
- " **hyacinthina, Kina** 3 —
" **verecunda, Vestindien** 3 —
Planteras i halfruten skogsjord, blandad med hackad vitmossa.
- Bocconia, (Papaveræ.) T. F.**
- " **japonica, Kina, Japan** — 50
Odlas hufvudsakligen för bladen. Användbar till bladgr. på kalljord. Den utårdar vintern i det fria på en del ställen i södra och mellersta Sverige.
- Boehmeria, (Urticæ.) V. B.**
- " **argentea, Mexiko** 1 —
" **gigantea, Mexiko** — 50
" **macrophylla, Nepal** — 50
Bladväxter. Planteras i närande, lös jord.
- Bonapartia, (Asphodoleæ.) T.**
- " **juncea (Agave geminiflora) Peru** 5 —
Utmärkt praktfull dekorationsväxt. Planteras i kraftig löfjord. Se praktväxter.
- Brassia, (Orchidæ.) V.**
- " **maculata, Jamaica** 5 —
" **verruosa, Guatemala** 5 —
Egendomliga, vackra blommor. Planteras i hackad vitmossa eller fastbindas på träklossar med rötterna omklädda med mossor. Fordra fuktig och varm atmosfär.
- Brexia, (Brexidæ.) V.**
- " **chrysophylla** 1,50
- Brugmansia, (Solanacæ.) T. B.**
- " **Knightii, S. Amerika** 1 —
" **suaveolens (Datura arborea) Mexiko** — 75
Länge kända växter med långa, hvita, trumpetformiga, väluktande blmr. Planteras i närande jord och vattnas sparsamt om vintern.
- Brunia, (Bruniacæ.) T. B.**
- " **lanuginosa (Berzelia) Godah. udden.** — 50
Odlas för sin ovanligt fina grönska. Planteras i lätt löf- och ljungjord; vattnas måttligt.

	Pr st.	Rmt	Rd	ö.
Ceanopteris, (Polypodiæe.) T.				
japonicus, Japan				— 50
Caladium, (Aroidæe.) V.				
bicolor				1 —
" picturatum				1 —
Chantinii				2,50
cupreatum				2 —
Enkeanum				2,50
Haageanum				2 —
hastatum				1 —
Houletii				1,50
marmoratum				1 —
mirabile				2 —
Neumannii				2 —
mymphefolium				— 50
pictum				1 —
rubricaulæ				2 —
rubrovenium				1 50
Wallisii				2 —
Whigtii				1 —
6 sorter efter vårt val, 6 rdr.				
Härstamma från tropiska Amerika, synnerligen från trakterna kring Amazonfloden. Rotknälarne ligga torra om vintern och ompl. i Mars eller i April i kraftig löfjord. Fordra under växttiden värme, fuktig luft, rikl. vattn. o. skydd mot solen. Utm. sig för sina underb. färgade vackra blad.				
Calathea, se Macrantha.				
Calceolaria; Toffelblomster, (Scrophulariaceæ.) T. B. F.				
hybrida	pr 12 st.,			5 rdr — 50
Expedieras blott under April och Maj.				
floribunda, gula	pr 12 st.,			4 rdr — 40
Prince Albert, bruna, pr 12 st., 4 rdr — 40				
salicifolia, Peru, gula, pr 12 st., 4 rdr — 40				
De trenne sistn. sorterna tillhöra de vackraste gruppväxter. Trifvas bäst på grupper, som äro skyddade röt den starkaste solen. Fortplantas lätt genom sticklingar.				
Calla, (Aroidæe.) T. B.				
setiopia (Richardia africana) Afrika 1 —				
" mindre exemplar				— 50
Bekant prydnadsv. Svaga ex. kunna om sommaren pl. på fritt land, då de merändels mot hösten blifva kraftiga och blombara. Inplanteras i slutet af September. Fordra kraftig jord och mycket vatten.				
Callistemon; Praktmossa, (Myrtaceæ.) T.				
lanceolata, Nya Holland				— 50
" semperflorens (Metrosideros)				— 50
linearifolium, Nya Holland				— 50
rigidus, Nyn Holland				1 —
Pryll. träd eller buskar för kalla växthus, blma under som. Pl. i ljung- & löfjord; vattn. måttligt.				
Callitris, (Cupresineæ.) T.				
australis, Nya Holland				— 50
cupressiformis (Frenela triquetra) Nya Holland				1 —
quadrivalvis, (Thuja articul. N. Afr. — 50				
Vackra träd. Pl. i ljung- & löfjord; vattn. måttl.				
Camellia; (Theaceæ.) T. B.				
japonica, Japan, Kina, utm. sorter i vackra exemplar med knoppar, 3 å 5 —				
Campyloneuron, (Polypodiæe.)				
Phyllitidis, Trop. Amerika				1 —
caespitosum, Trop. Amerika				1 —


	Pr st.	Rmt	Rd	ö.
Campyloneuron lapatifolium, Trop. Amer. 1 —				
" nitidum, Trop. Amerika				1,50
Vackra, egendomliga ormbunkar.				
Canna; Blomsterrör, (Cannaceæ.) V. F. B.				
25 sorter m. namn, efter vårt val rdr 12 — —				
12 " med namn, efter vårt val " 7 — —				
6 " namn, efter vart val " 4 — —				
100 st. div. sort. utan n. t. bladgr. " 15 — —				
50 " " sorter utan namn till gr. " 10 — —				
25 " " utan namn till grupp. " 5 — —				
12 " " namn till bladgr. " 3 — —				
Cannaarterna förtjena i hög grad blomsterodlares uppmärks. Användb. såväl till vackra bladgrupper på fritt land, som till dekorat. i växthus, boningsrum och på blomsterbord. Fordra under växttiden rikligt vatten. Om hösten upptagas de på fritt land stående ex. och öfverv. på samma sätt som Dahlier. Större delen af de nyare sorterna utn. sig både för vackra blad och blmr.				
Caraguata; (Bromeliaceæ.) V.				
ligulata, Jamaica				1,50
Behandlas som Billbergia.				
Carludovica, (Cyclantheæ.) V.				
atrovirens, Nya Granada				1,50
humilis, Peru				5 —
rotundifolia, Trop Amerika				10 —
Dekorativa bladväxter för varma växthus.				
Caryota; Brännpalme, (Palmeæ.) V.				
urens, Ostindien, starka ex.				10 —
Castanea; Kastanje, (Amentaceæ.) T.				
chrysophylla, Kalifornien				1 —
Blifver ett af kallhusens prydligaste träd.				
Casuarina; Kasuarträd, (Conifere.) T.				
equisetifolia, Öarne i Stilla hafvet				2 —
muricata, Australien				— 50
quadrivalvis, Van Diemens Land				1,50
Egendomliga, bladlösa träd med härfina grenar. Pl. i löf- och ljungjord; vattnas måttligt.				
Catananche; Rasselblomster, (Cichoraceæ.) **				
cœrulea, blå, S. Europa, N. Afrika. — 50				
Cattleya, (Orchidæe.) V.				
crispa (Lælia) Brasilien				10 —
Mossieæ, La Guayra				15 —
Tropiska Orchidéer med praktfulla blmr. Odlas i fuktiga varmhus. Pl. i moss, eller fastbindas vid träklossar med rötterna inlindade i moss.				
Cedrus, se träd och buskar till anläggningar.				
Cereus, (Cactæe.) V. B.				
Bomplandii, S. Amerika				1 —
eriphorus, Cuba				1 —
Euriesii, S. Amerika				1 —
flagelliformis, S. Amerika				1,50
grandiflorus, S. Amerika				2,50
grandis, S. Amerika				1,50
Jamaicarii, S. Amerika				2,50
Massonii, S. Amerika				1,50
peruvianus monstrosus, S. Amerika				2 —
ravidus, S. Amerika				1 —
serpentinus, S. Amerika				1,50
speciosus, S. Amerika				1 —
subrepandus Karaberna				1 —
tetragonus, S. Amerika				1,50
tortuosus, Buenos Ayres				1 —
virens, S. Amerika				1,50
12 sorter efter vårt val, 14 rdr.				

Pr st. Rmt Rd ö.

- Chanestea**, (*Solanaceae*.) V. T.
 „ lanceolata, Nya Canada 1 —
Chamaecyparis, se *Thuopsis*.
Chamedorea, (*Palmeae*.) V. B.
 „ Ahrenbergii, Guatemala 5 —
 „ Corallina, S. Amerika 10 —
 „ Deckeriana, Guatemala 5 —
 „ desmoneoides, Guatemala 5 —
 „ elatior, Xalappa 5 —
 „ elegans, Mexiko, unga vackra 10 —
 „ Ernesti-Augusti, Guatemala 5 —
 „ genomäforme, S. Amerika 5 —
 „ glaucifolia, Guatemala 10 —
 „ graminifolia, Guatemala 10 —
 „ lunata, S. Amerika 5 —
 „ Wendlandii, Guatemala 5 —
 Nätta palmer, som kunna odlas i boningsrum.
 Planteras i löf- och drifbänkjord; vattnas rikligt
 särdeles under sommaren.
Chamerops; *Dvergpalme*, (*Palmeae*.) V. B.
 „ Fortuneii (exelsa) Kina, unga plant. 5 —
 „ humilis, S. Europa, Afrika 3 —
 „ Palmetto, Carolina, Florida 20 —
 Praktfulla palmer med solfjäderlika blad. Passa
 till odling i boningsrum. Se afbildningen.
Charlwodia, se *Cordylinae* & *Dracena*.
Cheilanthes, (*Polypodieae*.) V.
 „ argentea, S. Amerika 75 —
 „ microphylla, Westindien 75 —
 „ odorata, S. Europa 1 —
 „ tomentosa, Mexiko 1 —
 Smånätta Ormbunkar.
Cheiranthus; *Gyllenlack*, (*Cruciferae*.) T. B.
 „ Cheiri, Engl., Frankr., Spanien etc. — 40
 pr 12 st., 4 rdr.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Starka, buskiga plantor, efter bästa sort frö;
 expedieras från Oktober till i April.
Chlorophytum, (*Asphodeleae*.) V. B.
 „ Sternbergianum, Godahoppssudden 50
 Intressant ampelväxt. Planteras i löfjord.
Chrysanthemum; *Prestkrage*, (*Senecioni-*
deae.) T. B.
 „ indicum, Kina, Japan, pr 12 st., 4 rdr — 40
 „ „ Sensation, m. vackra, hvitbr. blad — 50
Cineraria; *Ashkört*, (*Senecionideae*.) T. B. F.
 „ candidissima pr 12 st., 4 rdr — 40
 „ hybrida pr 12 st., 4 rdr — 40
 „ maritima pr 12 st., rdr 1,50 — 15
 Fröplantor efter bästa sort frö. Expedieras blott
 från April till i Juni. Praktiga till blad- och
 blomstergupper. Den först- och sistnämnda
 hafva silfverhvita, vackra blad.
Cissus, (*Ampellideae*.)
 „ antarcticus, Nya Holland, T. 1 —
 „ elegans, T. 50 —
 Rankväxter. Pl. i sandbl. löfjord; vattn. måttl.
Citrus, (*Aurantiaceae*.)
 „ chinensis, Kina 1 —
Clematis; *Skogsrefva*, (*Ranunculaceae*.) T.
 „ aristata, Nya Sydwalet 1 —
 „ microphylla, Nya Holland 1 —
 Rankväxter med vackra blmr. Planteras i löf-
 jord. Se vidare: Träd och buskar till anläggna.
Clerodendron; *Prestträd*, (*Verbenaceae*.)
 „ fragrans (Valkomeria jap.) Japan, V. B. 1 —
Clethra, (*Ericaceae-Andromedeae*.) T.
 „ arborea, Madeira 1, 2 å 10 —
 „ fol. var., med brokiga blad 2 —
 Vackra träd med konvaljlika, välluktande blmr.
 Pl. i ljungjord; vattnas måttligt om vintern.



Chamerops Fortuneii (exelsa.)

Pr st. Rmt Rd ö.

- Clanthus; Præktvicka, (Papilionaceæ.)**
 „ puniceus, Nya Zeeland — 50
 „ magnificus, Nya Caledonien — 75
 Bekanta præktrvaxter med sköna skarlakaröda blmr i rika klasar. Plant. i löf- och ljungjord.
- Clivia, (Amaryllidææ.) V. B.**
 „ nobilis, Columbien 1,50
 Præktfulla liljelika, röda blommor. Planteras i närande, sandblandad jord.
- Cobæa; (Bignoniaceæ) T.**
 „ scandens — 75
 En bekant slingerväxt. Planteras i löfjord.
- Cocos; Kokospalm, (Palmeæ) V.**
 „ botryophora (Syagrus) Trop. Amerika 15 —
 Stätlig, skön palm.
- Coclia, (Orchidææ) V.**
 „ Baueriana, Jamaica, planteras i mossa 3 —
- Coleus, (Labiææ) V. B.**
 „ 12 s rter med namn, 5 rdr — 50
 De nyare varieteterna af detta växtslägte utm. sig för bladens praktf. färger, varierande i alla nyanser från svartbrunt till högrödt, gult, violett o. s. v. De äro mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas särdeles väl i boningsrum. Om de på våren pl. i större krukor i god, kraftig jord, uppnå de under som. en betyd. storl. Fordra sol.
- Colocasia, (Aroidææ) V.**
 „ antiquorum (Arum) Egypten 1 —
 „ cuprea, Trop. Amer., kopparf. blad 1,50
 „ macrorrhiza, hvit med vackra blad 1 —
 „ nymphæfolia, Ostindien — 75
 „ odora, stora exemplar 10 —
 Dekorativa växter med antikf. formade blad. Planteras i kraftig vegetabilisk jord. Fordra om sommaren riklig vattning.
- Coniogramma, (Polypodiææ) V.**
 „ javanica (Gymnogramma) Java 2 —
 Egendoml. ombunkar. Pl. i halfrutten skogsjord.
- Cordyline, (Dracæna) (Asphodelææ.)**
 „ angusta, Hemland? 2 —
 „ angustifolia (Drac. paniculata) T. B. — 50
 „ australis, Nya Zeeland, T. B., 1 å 15 —
 „ canariæfolia, Nya Holland, T. B., 10 å 15 —
 „ congesta (Charlvodia) Nya Holl., T. B. — 50
 „ Cooperii, Kina, V. B., röda blad 1,50
 „ ferrea, Kina, V. B., blodröda blad 1,50
 „ grandis (Drac.) V. B., starka 1 —
 „ Guillfoleyii, ny, praktfull, V. B. 10 —
 „ Haageana, V. B. 2,50
 „ Knerkii, V. B. 2,50
 „ latifolia, Moluckerna, V. B. 1,50
 „ limbata, V. B. 1,50
 „ marginata latifolia, V. B. 2,50
 „ nigra, V. B. 2,50
 „ nigricans, V. B. 3 —
 „ nutans, Australien, T. B. 5 —
 „ pulchra, V. B. 2,50
 „ punctata, V. B. 5 —
 „ Regina, unga plantor, V. B. 10 —
 „ robusta, V. B. 1,50
 „ rubra, Australien, V. B. 1 —
 „ siamensis, V. B., vackra exemplar 1 —
 „ terminalis, Moluckerna, V. B. 1,50
 „ Veitchii (aurea lineata) T. B., prydl. 5 —
 Höra till växthusens förnämsta dekorationsväx. Pl. i kraftig jordmån och vattnas måttligt

Pr st. Rmt Rd ö.

- vintern. De rödblommiga sorterna äro ömtåliga för dropp. De med T. B. betecknade kunna om sommaren utställas på lugna platser i det fria. De öfriga odlas bäst i varm drifkast.
- Coronilla; Koronilla, (Papilionaceæ) T.**
 „ glauca, S. Europa — 50
 „ fol. var. med brokiga blad — 75
 „ Gula blommor. Planteras i löfjord.
- Correa, (Rutaceæ) T.**
 „ alba, Nya Holland — 50
 Har hvita, cylinderformiga blm. Pl. i ljungjord.
- Corypha; Solfjäderpalm, (Palmeæ) V. B.**
 „ australis, Nya Holland 5 —
 Låter med lätthet odla sig i boningsrum; har vackra, solfjäderlika blad. Planteras i kraftig, ej för lätt jord. Fordrar riklig men ej öfverflödigt fuktighet. Se præktrvaxter.
- Crassula; (Crassulææ) T. B.**
 „ coccinea Godah.-udden, p. 12 st., 5 rdr — 50
 „ falcata (Rochea) Godahoppsudden 1,50
 Planteras i god löfjord i ej för stora krukor. Vattnas sparsamt synnerligen om vintern.
- Crinum, (Amaryllidææ) V. B.**
 „ americanum, S. Amerika 3 —
 „ australe, Port Jackson 2,50 å 25 —
 „ capense (Amarill. longif.) Godah.-udd. 3 —
 Nära beslägtade med Amaryllis; utm. sig för sina hvita, väluktande blmr och uppnå betyd. dimensioner. Planteras i kraftig löf- och drifbänkjord; vattnas sparsamt under hvilotiden.
- Croton; Kräftbuske, (Euphorbiææ) V.**
 „ irregulare, Ostindien? 3 —
 Utmärkt för sina vackra, gulffäckiga blad. Planteras i sandblandad löfjord.
- Cryptomeria, se Träd och buskar till anlägg.**
- Cupressus; Cypress, (Cupressinææ) T. R.**
 „ fastigiata (semperviv.) Grekl., Asien;
 2 fot höga exempl., pr 12 st., 10 rdr, 1 —
 „ strictus elegans — 75
 „ glauca pendula, Ostindien — 75
 „ horizontalis (Tournifortii) Creta, Persien; 2 fot höga ex., pr 12 st., 10 rdr 1 —
 „ majestica, unga plantor 1 —
 „ torulosa, Nepal 1 —
 „ Lawsonii, se Träd och buskar till anlägg.
 Alla dessa cypresser höra till kallhusens förnämsta dekorationsväxter. Se præktrvaxter.
- Curculigo; Snabellilja, (Hypoxidææ) V. B.**
 „ recurvata, Java 60 öre, 1 å 2 —
 Præktig dekorationsväxt med långa, breda, vackert veckade blad. Planteras i löfjord.
- Curcuma; (Scitamineæ) V.**
 „ Roseceana, Ostindien 2 —
 Vackra blad; egendomliga praktfulla blommor. Plant. i löfjord; bör under hvilotiden ej vattnas.
- Cyathea, (Polypodiææ.)**
 „ medularis, Nya Holland, T. 10 —
 Denna praktfulla ornbunke, som med tiden bildar hög stam, uppnår en anseelig höjd och storlek.
- Cycas; Sagopalm, (Cycadææ) V. B.**
 „ circinalis, Ostindien 25 —
 „ revoluta, Ostindien 5 —
 Præktrvaxter.
- Cyclamen; Jordbröd, (Primulææ) T. B.**
 „ Coum, Södra Europa, Taurien 1 —
 „ europæum, Södra Europa — 75
 „ macrophyllum, S. Europa, N. Afrika 1 —
 „ persicum, Persien, Grekl. Cypern — 75
 Särdeles nätta, röda eller hvita blmr. Pl. i löfjord

Pr st. Rmt Rd ö.

- Cyperus**; *Cypergräs*, *Pappersväxt* eller *Pappersgräs*, (Cyperaceæ) V.
 " *alternifolius*, Madagascar — 50
 " *Papyrus* (Papyr. antiquor.) *Egypten* 2,50
 Dekorativa halvgräs. Planteras i löfjord; fordra riktig vattning, synnerligen om sommaren.
Cypripedium; *Venussko*, (Orchideæ) V.
 " *barbatum*, Malacka 3 —
 " *insigne*, Nepal, vackra 3 å 10 —
 " *venustum*, Nepal 3 —
 " *Intressanta blmr. Pl. i mossa och god torfjord.*
Cyrtanthus, (Amaryllidææ)
 " *Mac Kennii*, *Godahoppssudden* 1 —
Cyrtomium, (Polypodiææ) V. T.
 " *atratum*, Japan 1,50
 " *falcatum*, Japan, Kina 2 —
 " *Fortunei*, Japan 1 —
 " *Utmärkta praktfulla ormbunkar. Kunna om sommaren utplanteras på skuggiga platser å kalljord.*
Cystopteris, (Polypodiææ) T.
 " *fragilis* var. *obtusa*, Europa 1,50
 " *obtusa*, 1 —
 " *Ormbunkar, som om sommaren utplanteras.*
Cytisus; *Gullregn* eller *Bönträd*, (Papilionaceæ) T. B.
 " *attleyanus*, *Hemland?* — 50
 " *candicans*, *Candia?* 1 —
 " *racemosus*, *Hemland?* — 50
 " *Fint, vackert löfverk, prydl., gula, väluktande blmr under större delen af året. Planteras i löf- och lungjord, vattnas måttligt.*
Demonorrops, (Palmeæ) V.
 " *melanochaetes microcarpus*, Java 15 —
 " *Vacker och sällsynt palm.*
Datura, se *Brugmansia*.
Davallia, (Polypodiææ)
 " *alpina*, *Hemland?* T. F. 1 —
 " *canariensis*, *Canariöarne* 1 —
 " *hemiptera*, *Borneo*, V. 15 —
 " *tenuifolia* var. *cristata*, *Vestindien*, V. 3 —
 " *stricta* 1,50
 " *nova zelandica*, *Australien* 2 —
 " *Vackra, sällsynta ormbunkar.*
Dendrobium, (Orchideæ) V.
 " *speciosum*, *Nya Holland*, *starka* 10 —
 " *Gula blommor i rika klasar. Planteras i mossa.*
Desmoncus; *Bandpalm*, (Palmeæ) V.
 " *major*, *Trop. Amerika* 10 —
 " *Sällsynt och, såsom utbildad, vacker palm.*
Deutzia, se *Träd och buskar till anläggningar.*
Didymochlæna, (Polypodiææ) V.
 " *lunulata*, *Trop. Amerika*, *starka* 15 —
 " *Ståtlig, storräxt, sällsynt ormbunke.*
Diffenbachia, (Aroideæ) V.
 " *Baraquinii*, *Trop. Amerika* 1 —
 " *conspureata*, *Trop. Amerika*, *ny* 5 —
 " *grandis*, *Trop. Amerika* 1 —
 " *Seguina*, *Vestindien* — 50
 " *Utmärka sig endast för vackra blad. Planteras i närande löfjord; hållas varmt och fuktigt.*
Dion, (Cycadææ) V. T.
 " *edule*, *Mexiko* 10 —
 " *Utmärkta prydnadsväxter för tempererade lms. I Mexiko ätes dess frukter, hvaraf beredes ett helsosamt, välsmakande mjöl.*
Diosma, (Diosmeæ) T.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Diosma alba**, *Godahoppssudden* — 50
 " *fl. sort.*, se *Adenandra & Agathosma.*
 " *Buske med små vita blommor och vackert löfverk, passande till bukettrönt.*
Diplacus, (Scrophulariaceæ) T. B.
 " *glutinosus*, *Kalifornien*, *flera sorter* — 50
 " *Tacks, blommande, för boningsr. lämpl. växter. Pl. i löfjord; vattn. måttl., särdeles vintertiden.*
Diplazium, (Polypodiææ) V.
 " *Shefferdii*, *Antillerna* 1,50
 " *sylvaticum*, *Java* — 50
 " *Vackra ormbunkar.*
Dircaea, (Gesneriaceæ) V.
 " *bulbosa* (Gesneria) *Brasilien* — 50
 " *cardinalis* (Gesneria) *Mell. Amerika*. 1 —
 " *Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i frisk, god löfjord och ställas varmt. Behandlas eljest som Gesneria.*
Disandra, (Scrophulariaceæ) T.
 " *prostrata*, *Orienten* — 50
 " *Till amplar; små, gula blmr. Plant. i löfjord.*
Disemma, (Passifloreæ) T.
 " *aurantiaca* (Passiflora) *Nya Kaledon.* 1 —
 " *coccinea*, *Nya Holland* — 75
 " *Slingerväxter med egendomligt bildade blommor. Planteras i löfjord; vattnas måttligt.*
Dodecatheon; *Gudsöfva* eller *Gudsblomster*, (Primulaceæ) T. F.
 " *Jefferyanum*, *N. Amerika?* 1,50
 " *andra*, se *fleråriga blomsterväxter.*
 " *Fleråriga växter med nätta, vita eller ljusröda blommor. Planteras i löfjord; kunna under be- täckning odlas på kalljord.*
Doodia, (Polypodiææ) T. F.
 " *aspera*, *Nya Holland* — 30
 " *caudata*, *Nya Holland* 1 —
 " *lunata*, *Nya Holland* — 50
 " *rupestris*, *Nya Holland* — 50
 " *Smånätta ormbunkar, passa till plant. i terrarier.*
Doryopteris, (Polypodiææ) V.
 " *geraniifolia*, *Vestindien* — 75
 " *nobilis*, *Vestindien* 2,50
 " *pedata*, *Brasilien* 1 —
 " *Ormbunkar med vackra, egendomliga blad.*
Dracena; *Drakblodsträd*, (Asphodoleæ) V. T.
 " *arborea* (Alettris) *Afrika* 1 —
 " *brasilienis*, *Brasilien* 1, 5 å 10 —
 " *Draco*, *Äkta Drakblod*, *Ostindien* 15 —
 " *fragrans*, *Guiana* 1 —
 " *Rumphii*, *Java*, *starka exemplar* 10 —
 " *umbraculifera*, *Mauritius*, *starka ex.* 20 —
 " *Liksom Cordylina äro äfven Dracena bland de varmaste växternas skönaste prydnadsväxter. De flesta sorterna låta odla sig i boningsrum. De handlas som Cordylina.*
Durantha, (Verbenaceæ) V.
 " *Plumierii*, *Vestindien* 1 —
Dyckia, (Bromeliaceæ) V.
 " *remotiflora*, *Brasilien* — 50
 " *Behandlas som Billbergia.*
Echeveria, (Crassulaceæ) T.
 " *metallica*, *Mexiko?* 5 —
 " *pumila*, *Mexiko*, pr 12 st., rdr 2,50 — 20 —
 " *secunda*, *Mexiko*, pr 12 st., 3 rdr — 30 —
 " *Smånätta, rosetlikna växter med vackra blmr. Begagnas till infattningar af smågrupper, planteringar på bergpartier etc.*

Pr st. Rmt Rd ö.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Echinocactus & Echinopsis; Igelkaktus,**
(Cactæ) V. B.
" *candicans*, Brasilien 1,50
" *corynoides*, Brasilien 1 —
" *Decaisneana*, Brasilien 1 —
" *gibbosus*, Brasilien 1 —
" *ingens*, Brasilien 1 —
" *leucanthum*, Brasilien 1,50
" *mamillosus*, Brasilien 1 —
" *multiplex*, Brasilien 1 —
" *Ottonis*, Brasilien 1 —
" *Oxygona*, Brasilien 1 —
" *Rhollandii* 1 —
" *Schellhazii*, Brasilien 1 —
" *Sellowianus*, Brasilien 1,50
" *setispinus albus*, Brasilien 1 —
" *tetracanthus*, Brasilien 1 —
" *tubiflora*, Brasilien 1 —
" *turbinata*, Brasilien 1 —
" *Zuccariniana*, Brasilien 1 —
Planteras i med grof sand rikligt blandad löf-
jord; vattnas om vintern föga eller inet.
- Echites, (Apocynæ) V.**
" *Melaleuca*, Trop. Amerika 1,50
" *rubro-venia* Trop. Amerika 2 —
Något slingrande med mörkgröna, hvitådrade
blad. Planteras i löfjord; vattnas måttligt.
- Edwardsia, (Papilionacæ) T.**
" *Mac Nabiana*, Anstralien 1,50
Fint löfverk; vackra, gula blommor. Planteras
i ljung- och löfjord; vattnas måttligt.
- Elaphoglossum, (Polypodiæ) V.**
" *eallafolium* (Acrostichum) Java 75
" *melanopus* (Acrostich.) Tr. Amerika 1 —
Egendoml. ormbunkar med breda, läderakt. blad.
- Entelea, (Tiliacæ) T. F.**
" *arborescens*, Nya Zeeland 50
Användas om sommaren i bladgrupper. Äfven
vackert till dekorat. inomhus. Pl. i kraftig löfjord.
- Epaeris, (Eupaerideæ) T.**
" flera vackra sorter, starka exemplar. 1,50
Harva talrika, vackra, röda eller hvita cylinder-
formiga blmr. Pl. i god ljungjord; vattnas alltid
försigtigt. Fordra om vintern så mycket ljus
och frisk luft, som möjligt.
- Epidendron, (Orchideæ) V.**
" *biflorum*, Vestindien 3 —
" *ciliare*, Vestindien 3 —
" *cochleatum*, Vestindien 3 —
" *radiatum*, Brasilien 3 —
" *tuberculatum*, Brasilien 2,50
Trifvas bäst om de, med rötterna inmindade i
mossa, fastbindas vid träklossar. Fordra varm
och fuktig asmofer.
- Epiphyllum, (Cactæ) V. B.**
" *truncatum*, Södra Amerika, 1,50 à 5 —
- Eranthemum, (Acanthacæ) V.**
" *tuberculatum*, Trop. Amerika 75 —
Utmärkt för sina blommor. Planteras i löfjord.
- Erica; Ljung, (Ericacæ) T.**
" många sorter med namn . 75 öre à 1,50
" 12 sorter med namn 12 rdr.
Planteras i ren, god ljungjord; böra om vintern
stå ljnst och luftigt samt vattnas försigtigt.
- Erythrina; Korallträd, (Papilionacæ.)**
" *caffra*, S. Afrika, V. 2,50

- Erythrina corallodendron, Antillerna, V. 2,50**
" *crista galli*, Brasilien, V. T. F. 1,50
" " *galli*, stora praktexempl., 5, 10 à 15 —
" *insignis*, Vestindien, V. 2,50
" *speciosa*, Vestindien, V. 2,50
" *viarum*, Hemland? V. 2 —
Alla sorterna utmärka sig genom stora, i rika
klasar sittande blommor. Pl. i kraftig löf- &
drifbänkjord. De sorter, som under vintern fälla
bladen, böra, tilldess de åter börja vegetera,
vattnas föga eller inet. E. *crista galli*, kan,
såsom tecknen antyda, under sommaren äfven
plant. på ett varmt skyddadt ställe å kalljord.
- Eucalyptus; Praktmossa, (Myrtacæ) T.**
" *globulus*, Nya Holland 50
" *robustus*, Nya Holland 1 —
Höra till verdens största träd och blifva betyd-
ligt stora äfven i växthus. Planteras i löf- och
ljungjord; böra ej beskäras. E. *globulus*, som
finnes afbildad i fröförteckningen, pag. 24, är af
god effekt i bladgrupper.
- Eucharis, (Amaryllidæ) V.**
" *amazonica*, Trakten vid Amazonfl. 4 —
Praktfulla, hvita, liljelika blmr. Pl. i löfjord.
- Eugenia, (Myrtacæ) T. B.**
" *australis* (Jambosa; Myrtus) N. Hol-
land, vackra ex., efter storlek, 1, 5 à 10 —
" *Ugnii*, Chili 75
- Eupatorium; Flockblomster, (Eupatoriæ) V.**
" *omphalifolium?* Mexiko, T. B. 50
Hvita, välluktade blommor i Oktober & No-
vember. Planteras i kraftig lefjord.
- Euphorbia; Vargmjolk, (Euphorbiacæ) V.**
" *Ornithopus*, Godahoppsudden 1,50
" *splendens*, Madagasear 1 —
Taggiga, nistan bladlösa växter med vackra,
högröda, blmr större delen af året. Planteras i
löfjord; vattnas sparsamt om vintern.
- Evonymus; Benved; Spindelträd, (Rhamneæ.)**
" *japonicus*, Japan, T. 50
" " *fol. arg. var.* 50
" " *elegans var.* 75
" " *luteis var.* 1 —
" *radicans fol. arg. var.*, pr 12 st., 5 rdr — 50
" *fol. arg. och roseis pictus* 50
E. japon. är en härdig dekorationsväxt för kalla
växthus; E. *radic.* kan fördelaktigt användas till
infattn. af grupper. Pl. i löf- och grästorfjord.
- Fabiana, (Solanacæ) T.**
" *imbricata*, Chili 50
Fin grönska, talrika, hvita, cylinderformiga blom-
mor. Planteras i löfjord.
- Fabricia, (Myrtacæ) T. F.**
" *laevigata*, Nya Holland 1 —
Vackert bukettrönt. Plant. i löf- & ljungjord.
- Farfugium, (Senecionidæ) T. F.**
" *grande*, N. Kina 50 öre, 2 à 10 —
Mörkgröna, gulfl. blad. Plant. i kraftig drif-
bänkjord; fordrar skugga och fuktighet.
- Ferdinanda, (Senecionidæ) T. F.**
" *eminens*, Mexiko 75
Präktig bladväxt med stora ljusgröna välluk-
tande blad. Utmärkt i bladgrupper.
- Ferraria; Tigerlilja, (Iridæ) T. F.**
" *tigrida*, Mexiko, pr 12 st., rdr 2,50 — 25
Mycket egendomliga praktfulla blommor. Plan-
teras om våren i krukor, sedan på kalljord, upp-
tags om hösten och öfvervintras i torr sand.
- Ficus; Fikonträd, (Urticacæ.)**
" *Cooperii*, Vestindien, V. B. 1 —

Pr st. Rmt Rd ö.

- Ficus cordifolia*, Godahoppsudden, V. B. 1 —
 „ *elastica*, *Gummiträd*, Ostindien, stark 4 —
 „ *Porteana*, Trop. Amerika, V. B. 5 —
 „ *rubiginosa* (religiosa) N. Holland, T. 1 —
 „ *stipularis*, Kina, Japan, V. — 50
 Utmärka sig för stora vackra blad. Härifrån gör dock *F. stipul.* ett undantag, enär dess blad äro små, men är för öfrigt en af de bästa växter till bekl. af fula väggår etc. i fuktiga varnhus.

Fittonia, (Acanthaceæ) V.

- „ *argyrea*, Brasilien 1 —
 „ *gigantea*, Brasilien 2 —
 „ *Pearcei*, Brasilien 2 —
 Bladen genomväfda af röda eller hvita ådror. Passa till plant. i s. k. terrarier.

Foucroya, (Asphodelæ) T.

- „ *gigantea*, S. Amerika, stora, starka 10 —
 „ *rigida*, S. Amerika 1,50 à 5 —
 Agavelika, praktfulla dekorationsväxter. Planteras i med sand blandad löf- & drifbänkjord. Vattnas försigtigt om vintern.

Freycinetia, (Pandaneæ) T. V.

- „ *Baueriana*, Norfolk 6 —
 Passande till stora amplar.

Fuchsia; *Bloddroppe*, (Onagraricæ) T. B. F.

- „ *corymbiflora*, Anderna i Peru — 50
 „ „ *f. alba* 1 —
 „ „ fol. var. med brokiga blad 1 —
 „ *fulgens*, Mexiko — 50
 „ *gracilis*, Mexiko — 50
 „ *globosa* fol. var. med brokiga blad — 75
 „ *hybrida*, stamform., 50 öre; 2, 3 à 10 —
 „ till amplar. 1, 5 à 10 —
 „ *microphylla*, Mexiko — 50
 „ *Pillar of Gold*, med brokiga blad — 50
 „ *pumila* pr 12 st., 5 rdr — 50
 „ *serratifolia*, Peru — 50

25 sorter *Fuchsia hybrida* m. namn rdr 10 —12 „ *Fuchsia hybrida* med namn „ 5,506 „ „ *hybrida* med namn 3 —

Vår samling af *Fuchsia* består af omkring 200 de bästa nyare och äldre varieteteter. *F. pumila* är småblommig, lågväxt, rikblommig, utmärkt vacker till grupper. *F. serratif.* blommor om hösten och en god del af vintern. Lätta att odla.

Gazania, (Cynaræ) T.

- „ *splendens*, Godahoppsudden — 25
 pr 12 st., rdr 2,50.

Låg, präktig gruppväxt med stora, gula blommor, som dock blott äro öppna då solen skiner.

Genista; *Ginstbuske*, (Papilionacæ) T.

- „ *prostrata*, Frankrike, Spanien 1 —
 Kan äfven odlas på kalljord. Har gula blommor; vacker till amplar. Planteras i löfjord.

Geonoma; *Jordpalm*, (Palmeæ) V.

- „ *cæspitosa*, Trop. Amerika 10 —
 „ *fenestrata*, Trop. Amerika, unga ex. 10 —
 „ *sarapiquensis*, Trop. Amerika, unga 10 —
 „ *Schottiana*, Nya Holland 25 —
 „ *spicigera*, Brasilien, unga exemplar 10 —

Georgia; *Georgin* eller *Dahlia*, (Asteroideæ.)

- „ *imperialis*, Mexiko, T. F. 1 —
 „ Denna georginsort har hvita, klockform., enkla blmr, hvilka dock sällan utvecklas hos oss. Den blommor säkrast om man på våren gör sticklingar; omplant. dessa under loppet af sommaren i allt större krukor och inflyttar den mot hösten i ett varnhus, der den hela vintern får vegetera.

Pr st. Rmt Rd ö.

I Juni kan den utplanteras på kalljord. Behandlad som de vanliga dahlerna, blifver den en utmärkt vacker bladväxt.

Gesneria, (Gesneriacæ) V.

- „ *Bethmannii* (hybrid) 1 —
 „ *splendens*, Brasilien 1 —
 „ *tuberosa*, Brasilien 1 —

Gladiolus, se fleråriga blomsterväxter.

Gloriosa; *Praktlilja*, (Liliacæ) V.

- „ *superba*, Malabar 2 —
 „ *virescens*, Senegambien 2 —

Slingerväxter med stora, vackra blmr och köttiga rotknölar, hvilka vid omplant. ej böra säras, emedan de derigenom lätt rutna. Ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god, kraftig löf- & drifbänkjord, i väl dränerade, ej för små krukor.

Gloxinia, (Gesneriacæ) V.

- „ nya, storbl., praktfulla varieteteter i rummel, med upstående och lutande blommor . . . pr 12 st., rdr 7,50 — 75
 „ yngre rotknölar af samma sorter . . . — 40
 pr 12 st., 4 rdr.

Utmärkt praktfulla blmr i alla nyanser af hvitt och rödt, blått och violett. Rotknölarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i god löfjord. Böra under växtiden stå nära glaset, men skyddas mot solen. De äro ömtåliga för tvärdrag och blifva vackrast i ett växthus med varm, fuktig luft.

Gnidia, (Thymelææ) T.

- „ *sericea*, Godahoppsudden 1 —
 Grönliga blmr om våren. Pl. i löf- & ljungjord.

Gonathanthus, (Aroideæ) V.

- „ *sarmentosus*, Himalaya — 50
 Torra om vintern; omplant. om våren i löfjord.

Goniophlebium, (Polypodiæ) V.

- „ *appendiculatum*, Trop. Amerika . . . 1,50
 Vacker ormbunke. Pl. i halfrutten skogsjord.

Goniopteris, (Polypodiæ.)

- „ *crenata*, Vestindien 1,50
 Ormbunke. Planteras i halfrutten skogsjord.

Grevillea, (Proteacæ) T.

- „ *pyramidata*, Godahoppsudden . . . 1 —
 „ *robusta*, Godahoppsudden 1 —
 Träd med utmärkt vackert löfverk. Planteras i ljungjord; vattnas försigtigt, särdeles om vintern.

Gunnera, (Urticacæ) T. F.

- „ *scabra*, Chili 2,50
 Bladväxt af kolossala dimensioner. Under omsorgsfull betäckning tål den vintern ute i södra och mellersta Sverige. Planteras eljest i stora korgar, som under sommaren nedgrävas i jorden och öfvervintnas i oeldadt bogningsrum eller torr källare.

Gymnogramma, (Polypodiæ) V.

- „ *chrysophylla*, Vestindien 1,50
 „ *davallioides* (hybrid?) 2 —
 „ *Laucheana* (hybrid) 1,50
 „ *Martensii* (hybrid) — 75
 „ *tatarica*, Södra Amerika — 50
 „ *Wettenhalliana* 2,50
 Praktfulla ormbunkar, hvars blad på undersidan äro betäckta af ett tjockt guldgult eller silfverhvitt ludd.

Gynnerium; *Pampas-* eller *Prairiegräs*, (Gramineæ) T. F.

- „ *argenteum*, Chili m. fl., pr 12 st., 10 rdr 1 —
 Ståttigt gräs med silfverhvita, 5 à 6 fot långa blomvippor. Utmärkt till bladgrupper och de-

Pr st. Rmt Rd ö.

korationer, såväl inne som ute. Uthärdar, under omsorgsfull betäckning, vintern på kalljord.

- Hemantus;** *Blodlilja*, (Amaryllideæ.)
 „ albiflos, Godahoppssudden, T. 1 —
 „ coccineus, Godahoppssudden, T. 2 —
 „ natalensis, Natal, V. 5 —
 „ puniceus, Godahoppssudden, T. 1,50
 Praktfulla liljeväxter med blödröda (den först nämnda hvita) blmr. Planteras i kraftig löf- och drifbänkjord; vattnas ej under hviloftiden.

- Hakea**, (Proteaceæ) T.
 „ saligna, Nya Holland 1 —
 Planteras i ljungjord; vattnas måttligt om vintern; fordrar ljus och frisk luft.

- Hardenbergia**, (Papilionaceæ) T.
 „ Comptoniana, Nya Holland 1 —
 „ monophylla, Nya Holland 1 —
 Något slingrande prydnadsväxter med vackra blommor. Planteras i ljungjord.

Hedera, se Träd och buskar till anläggningar.

- Hedychium;** *Kransblomster*, (Scitamineæ)
 „ coronarium, Ostindien, V. B. — 75
 „ Gardnerianum, Ostindien, V. B. 1 —
 Vackra dekorationsväxter med praktf., gulröda starkt väluktande blmr. Pl. i löf- & drifbänkj.

- Heliconia**, (Musaceæ) V.
 „ metallica, Mexiko 5 —
 Dekorationsväxt med vackra blmr. Pl. i löfjord.

- Heliotropium;** *Heliotrop*, (Verbenaceæ)
 „ peruvianum, Chili, Peru, T. B. F. — 50
 „ diverse storblom. sorter till grupper — 40
 pr 12 st., 4 rdr.

Starkt vaniljuktande, allmänt omtyckta blmr, såväl till odling i boningsrum, som till grupper på fritt land. Fordra på kalljord varma, soliga platser och lös, fet jordmån.

- Hemionitis**, (Polypodiæ) V.
 „ palmata, Vestindien 1 —
Hepatica; *Anemon*, *Stippa* eller *Bläsippa*, (Ranunculaceæ) T. F.

- „ angulosa, Ungern 1,25
 Sällsynt, liknande vår bläsippa, men till alla delar större. Kan odlas på fritt land.

- Hibiscus;** *Hibblomster*, (Malvaceæ) V.
 „ Cooperii, Australien 1 —
 „ rosa sinensis, Ostindien, Kina 1 —
 „ tricolor, Japan 1 —
 Planteras i löfjord.

- Hoja;** *Porsinsblomster*, (Asclepiadæ) V.
 „ bella, Java 1 —
 „ carnosus, Ostindien 1 —
 Slingväxt med utmärkt vackra, väluktande blommor. Planteras i lucker, sandblandad jord; vattnas sparsamt om vintern.

- Hyophorbe**, (Palmæ) V. B.
 „ indica (Areca lutescens) Bourbon,
 Mauritius, unga exemplar 10 —
 Mycket vacker palm. Planteras i löf- & gräsfjord; fordrar mycket vatten.

Ilex, se Träd och buskar till anläggningar.

- Iris;** *Svärdslilja*, (Irideæ) T. F.
 „ foetida fol. var. — 75
 „ persica, Mindre Asien — 25
 „ tuberosa, S. Europa — 25
 Utmärkt vackra, intressanta blommor. Planteras i kraftig löfjord. De sorter, som under vintern fölla bladen, böra då ej vattnas.

- Isolepis**, (Cyperaceæ) V. B.
 „ tenuissimus, Ostindien — 5

Pr st. Rmt Rd ö.

Fint, vackert halmgräs, passande till amparö. s. v. Fordrar värme & fuktighet.

- Ixia**, (Irideæ) T. B.
 „ flera sorter i rummel. — 25
 Löskarne vattnas ej under hviloftiden.

Jambosa, se Eugenia.

- Jasminum;** *Jasmin*, (Jasmineæ) V.
 „ Zambac, Arabien, Ostindien 1 —
 Hvita, starkt väluktande blmr. Plant. i löfjord.

- Jubrea**, (Palmeæ) V.
 „ spectabilis, Chili, unga 6 —
 Kalmia, se Träd och buskar till anläggningar.

- Koniga**, (Crucifera) T. F.
 „ variegata (Alyssum) pr 12 st., 3 rdr — 30
 Hvitbrokiga blad. Utmärkt till infattningar af blomstergrupper. Fortpl. lätt gen. sticklingar.

- Kunzea**, (Myrtaceæ) T.
 „ leptospermoides, Nya Holland — 50
 Fint bladverk, passande till buketter; hvita blommor. Planteras i ljungjord.

- Laelia**, (Orchideæ) V.
 „ purpurata, Brasilien 10 —
 „ superbiens, Guatemala 6 —
 Mycket praktfulla blommor. Planteras i mossor eller fastbindas på träklossar. Hållas varmt, fuktigt och skyddas mot solen.

- Lantana**, (Verbenaceæ) V. F. B.
 „ flera olika sorter. pr 12 st., 3 rdr — 30
 En af de bästa växter att under sommaren utplantera på soligt belägna grupper. Blommarna variera i rödt, gult och lila, framkomma hela sommaren. Fordra kraftig jord.

- Lastrea**, (Polypodiæ)
 „ semula, Europa, Madeira, T. F. 1,50
 „ angescens (Asp. Otton) Trop. Am., V. — 50
 „ cinnamomea, N. Amerika 1,50
 „ chrysoloba, Brasilien, V. — 75
 „ dilatata, Europa, N. Amerika, T. F. 1 —
 „ „ angustiloba, T. F. 1,50
 „ „ nana, T. F. 1,50
 „ „ rumorsa, T. F. 1,50
 „ „ dumetorum, T. F. 1,50
 „ erythrorsa, Hemland? 1 —
 „ Filix mas, Sverige, T. F. — 50
 „ „ mas. crispa, T. F. 2 —
 „ „ „ cristata, T. F. 2 —
 „ „ „ angulata, T. F. 2 —
 „ „ „ furcans, T. F. 2 —
 „ „ spinolusa 1,50
 „ „ opaca, Hemland? 1 —
 „ Pindarii, Hemland? 1 —
 „ Standishii 2 —
 Ormbunkar; de med T. F. kunna naturligtvis utpl. på kalljord. Plant. i halfrutten skogsjord.

- Latania;** *Bourbonpalm*, (Palmeæ) V. B.
 „ bourbonica (Livistona chin.) efter storlek från 5, 10, 15, 25 till och med 50 —
 Stora, vackra, solfjäderlika blad. Planteras i löf- och torfjord; vattnas ymnigt. Se praktv.

- Laurus;** *Lager*, (Laurineæ)
 „ nobilis, vanlig, S. Eur., 5 å 6 f. hög 10 —
 Dessutom finnas mycket stora exemplar med vackra, runda kronor. Priset, efter exemplarens ålder och storlek, meddelas på begäran.

- Lavatera;** *Poppelros*, (Malvaceæ)
 „ arborea, S. Europa, F. T. — 50
 Talrika röda blommor, användb. i bladgrupper.

Pr st. Rmt Rd ö.

Leptospermum; Söderhafsmyrten, (Myrtaceae.) T.

- " *baccatum*, Nya Holland 1 —
 " *flavescens*, Nya Holland 1 —
 " *grandiflorum*, Nya Holland 1 —
 " *lanigerum*, Nya Holland 1 —
 " *scoparium*, Nya Holland 1 —
 Fint löfverk, hvita, stundom något rödaktiga blommor. Planteras i löfjord.

Libonia, (Acanthaceae.) V. B.

- " *floribunda*, Brasilien 50
 " Gulröda, cylinderformiga blommor vid olika tider. Planteras i ljungjord.

Licuala; Licualapalm, (Palmeae.) V. B.

- " *spinosa*, Java, Zingapore 50 —
 " Vackra, starka ex. Planteras i löf- & torfjord.

Ligularia; Bandblomster, (Senecionidae.)

- " *Kämpferii* fol. var., Japan, T. F. 1,50
 " Utmärkt vackra, hvitmarmorade blad. Planteras i kraftig jord; vattnas rikligt.

Ligustrum, se Träd och buskar till anläggning.**Lilium; Lilja, (Liliaceae.)** T.

- " *auratum*, Japan 4 —
 " Obestriddigt den vackraste af alla liljor; behandlas som *L. lancifolium*. De andra sorterna finnas upptagna bland fleråriga blomsterväxter.

Linaria; Flugblomster, (Scrophulariaceae.)

- " *Cymbalaria, Aarons skägg*, Mell. Eur. — 50
 " fol. var. 1,50
 " Båda utmärkt vackra ampelväxter.

Llavea, (Polypodiaceae.) V.

- " *cordifolia*, Mexiko 1,50

Lippia, (Verbenaceae.) T.

- " *citriodora* (*Verbena triph.*) Buen. Ayres 1,50
 " Utmärkt vällyktande blad, men obetydliga blommor. Planteras i löfjord.

Livistona; Solfjäderpalm, (Palmeae.) V. B.

- " *australis*, se *Corypha australis*.
 " *chinensis*, se *Lantania bourbonica*.
 " *olivæformis*, Java 20 —
 " *rotundifolia* (*Corypha*; *Saribus*) Japan 20 —
 " Praktfulla palmer. Lätta att odla i boningar. Planteras i kraftig, ej för lätt jord; vattnas ymnigt, men ej öfverflödigt. Se afbildningen, som är en typ af solfjäderpalmerna.

Lobelia, (Lobeliaceae.) T. F.

- " *fulgens* Queen Victoria, pr 12 st. 10 rdr 1 —
 " Röda blad och högröda blommor. Utmärkt till grupper på fritt land.

Locheria, (Gesneriaceae.) V.

- " *hirsuta* (*Achimenes*) Trop. Amerika. — 50
 " Vackra blmr. Behandlas som *Achimenes*.

Lomaria, (Polypodiaceae.) V.

- " *alpina*, Australien 1 —
 " *Boryana* (*cycadeifol.*) S. Afr., starka 60 —
 " *capensis*, S. Afrika 1,50
 " *ciliata*, S. Afrika 1,50
 " *gibba*, Hemland? V. B., praktfull 2,50
 " *Patersoni*, S. Afrika 2,50
 " Utmärkta ormbunkar. Planteras i halfrutten skogsjord. Hållas varmt och fuktigt.

Lophospermum; Kamfrö, (Scrophulariaceae.) T. F.

- " *scandens*, Mexiko 1 —
 " Slingsväxt med vackra blommor. Rotknärlarne hvilas om vintern; vattnas då icke; omplanteras om våren i god löfjord.

Lycaste; (Orchideae.) V.

Pr st. Rmt Rd ö.

- Lycaste aromatica, Mexiko 5 —**
 " *eruenta, Guatemala 5 —
 " *Skinnerii, Brasilien 10 —
 " De båda förstn. hafva mörkgula, starkt vällykt. blmr, den senare svagt vällykt. blmr, hvita med rödt. De pl. i massa samt hållas varmt o. fuktigt.**

Livistona (*Latania*.)**Lycopodium; Lummer, (Lycopodiaceae.)** V.

- " *phlegmarium, Hemland? unga 5 —*
 " En ytterst sällsynt växt, tillhörande samma släkte, som de hos oss förekommande s. k. Lummerväxterna. Planteras i halfrutten skogsjord. Andra, för hithörande arter, se *Selaginella*.

Lygodium, (Osmundaceae.) V.

- " *japonicum, Japan 1,50*
 " Egendomlig, slingsrande ormbunke. Planteras i halfrutten skogsjord.

Magnolia, se Träd och buskar till anläggning.**Mahonia, (Berberidaceae.)** T.

- " *Bealii* (*Berberis*) Norra Kina 1 —
 " Vackra blad, gula blmr i klasar. Pl. i löfjord.

Malva; Kattost, (Malvaceae.) T.

- " *californica, Kalifornien 50*
 " Blommor röda, framkomma ofta om vintern. Planteras i löfjord.

Mammillaria; Vårtkaktus, (Cactaceae.) V. B.

- " *angularis, Mexiko 1 —*
 " *acicularis, Mexiko 1 —*
 " *centricirrha, Mexiko 1,50*
 " *coarctata, Mexiko 1,50*
 " *echinata, Mexiko 1,25*
 " *fulvispina, Mexiko 1 —*
 " *glochidiata, Mexiko 1 —*
 " *leucantha, Mexiko 1,25*
 " *Neumannii, Mexiko 1 —*
 " *pentaantha, Mexiko 1,25*
 " *polythele, Mexiko 1 —*
 " " *quadrispina, Mexiko 1 —*
 " " *aciculata, Mexiko 1 —*

Pr st. Rmt Rd ö.

Mammillaria pusila, Vestindien	1,50
" rhodantha, Mexiko	1 —
" rutila, Mexiko	1 —
" sulphurea, Mexiko	1 —
" Webbia, Mexiko	1 —
" Zuccarinii, Mexiko	1,50

12 olika sorter med namn rdr 12 —
6 " sorter med namn " 6,50

Egendomliga kaktusväxter. Planteras i med grof sand och kalkgrus blandad löfjord; vattnas försigt om vintern.

Mandirola, (Gesneriaceæ.) V.

" lanata, Trop. Amerika	— 50
" Blå blommor. Behandlas som Achimenes.	

Macrantha, (Scitamineæ.) V.

" argyrea, Trop. Amerika	5 —
" Baraquinii, Trop. Amerika	3 —
" cinerea, Trop. Amerika	4 —
" Fagoreana, Trop. Amerika	2 —
" flavescens (Phrynium) Brasilien	1 —
" illustris, Trop. Amerika	4 —
" Legrellana, Trop. Amerika	2,50
" Lindenii, Trop. Amerika	3,50
" majestica, Trop. Amerika	3,50
" ornata, (alba lineata) Columbien	2,50
" picturata, Trop. Amerika	4 —
" Porteana, Brasilien	3 —
" regalis, Central-Amerika	3 —
" roseo-picta, Central-Amerika	4 —
" sanguinea, Trop. Amerika	2,50
" splendida, Trop. Amerika	3,50
" truncata, Trop. Amerika	2,50
" tubispatha, Central-Amerika	10 —
" Warzewiczii, Brasilien	2,50
" van der Heckii, Brasilien	3 —
" Veitchii, Trop. Amerika	3 —
" virginalis, Brasilien	4 —
" vittata, Trop. Amerika	3 —
" Zebrina, Brasilien	2,50

Utmärkta för sina praktfulla blad, som stundom variera i åtskilliga färger. Planteras i god löf-, torf- och ljungjord; hållas varmt och fuktigt. En svag bottenvärme är för dem alla mycket välgrända.

Maurandia, (Scrophulariaceæ.) T. B.

" antirrhinifolia, Mexiko	— 50
" Barelyana, Mexiko	— 50
" semperflorens, Mexiko	— 50

Slingväxter med vackra, viol- & röda blmr. Pl. i löfjord; användas till ampel eller beklädnad af mindre korgar, flätverk, espalier m. m.

Medeola, (Asparagineæ.) T.

" asparagoides, Hemland?	— 50
" Kan användas till ampel. Planteras i löfjord.	

Medicago, Luzern, (Leguminosæ.) T. F.

" arborea, S. Europa	— 50
--------------------------------	------

Melaleuca, Cajeputträd, (Myrtaceæ.) T.

" armillaris, Nya Holland	— 75
" decussata, Nya Holland	1,50
" ericifolia, Nya Holland	— 50
" hypericifolia, Nya Holland	— 50
" linearifolia, Nya Holland	— 75

Dessa träd lemna fint bukettgrönt. De violetta, gulvita eller röda blmnäro ofta ganska vackra. Planteras i löf- och ljungjord; beskåras årligen.

Pr st. Rmt Rd ö.

Melanoselinum, (Umbellifereæ.) T. F.

" discipiens, Madeira	— 50
" Användbar till plantering i bladgrupper.	

Melanthus; Honungsblomster, (Rutaceæ.)

" major, Godahoppssudden, T. F.	5 —
" Träd m. vackra, blåaktiga blad; vackert i bladgr.	

Meniscium, (Polypodiæ.) V.

" giganteum, Södra Amerika	5 —
" Egendomlig och sällsynt ormbunke.	

Mesembryanthum; Isplanta, (Ficiodeæ.)

" flera sorter med namn, T. B.	— 50
" 10 olika sorter med namn rdr 4 —	

6 " sorter med namn " 2,25

Dessa från Godahoppssudden härstammande växter odlades fordom ofta i boningsrum, hvartill de äro särdeles lämpliga. Utmärka sig icke allena för vackra, ofta briljanta blmr, utan äfven genom egendomliga bladformer. Pl. i god, sandblandad löfjord; vattnas obetydligt om vintern.

Metrosideros, se Callistemon.

Mikania, (Eupatoriaceæ.)

" Guako, Ormört, S. Amerika, V.	— 50
" scandens, Carolina, Mexiko, T.	— 50

Tacksamma slingerväxter. Planteras i löfjord.

Himulus; Musculusblomster eller Gyckelblomster, (Scrophulariaceæ.) T. F.

" cardinalis, Nordv. Amerika	— 35
" cupreatus, Chili . . pr 12 st., rdr 2,50 —	25
" luteus, Chili . . . pr 12 st., 2 rdr —	20
" " trigrinus . . . pr 12 st., rdr 2,50 —	25
" moschatus, Columbien	— 25

M. cupr. & lut. tigrinus äro utm. grupp. Den förra har röda, den senare gula, med rödt tigrerade blommor. M. cardia är en vacker rabattväxt och M. moschat. är utmärkt för sin starka, rena muskusluk. Allesamma vackra för krukor.

Mitrraria; Biskopsmossa, (Gesneriaceæ.) T.

" coccinea, Chili	1 —
" Skarlakanröda blmr. Plant. i löf- & ljungjord.	

Monstera, (Aroideæ.) V.

" deliciosa, Guatemala, stora exemplar 2 —	
" Utmärkta, med stora, mörkgröna utskurna blad. Planteras i löfjord.	

Morenia, (Palmeæ.) V. B.

" corallina, Guatemala, unga planter. 10 —	
" Vacker palm till odling i boningsrum.	

Musa; Pisang eller Bananas, (Musaceæ.) V.

" Cavendishii, Kina	5 à 10 —
" " fol. var.	2,50
" Dacca, Ostindien	5 à 10 —
" rosacea, Mauritius	5 —
" speciosa, Java	5 —
" zebrina, Java	10 —

Präktiga dekorationsväxter, hvars blad ofta uppnå flera alnars längd och proportionerlig bredd. Frukterna ätbara, kända under ofvanstående namn. Planteras i kraftig löf- & drifbänkjord; vattnas ymnigt om sommaren.

Myrtus, (Myrtaceæ.) T. B.

" communis, S. Europa, storbl., 50 öre à 2 —	
" " finbladig	50 öre t. o. m. 10 —
" " fol. var. med brokiga blad	— 75
" bullata, Nya Zeeland	— 75

Planteras i kraftig löf- och drifbänkjord.

Nagelia, (Gesneriaceæ.) V.

" flera sorter med namn.	50 öre à 1 —
" Dessa, från de varmare delarne af Amerika härstammande växter utmärka sig för vackra blad	

- Pr st. Rmt Rd ö.
- och blommor. Behandlas som Gesneria, till hvilket slagte de fordom räknades.
- Nephrolepis**, (Polypodiææ.) V.
- " *davallioides*, Malaiska järne 1,50
- " *exaltata*, S. Amerika, Java 1,50
- " *tuberosa*, Trop. Amerlka 1 —
- Prydliga ormbunkar. Pl. i halfrutten skogsjord.
- Nerium**; *Oleanderbuske*, (Apocynææ.) T. B.
- " *Oleander* fl. pl., S. Europa 50
- pr 12 st., 5 rdr.
- Planteras i kraftig löf- och torvfjord; vattnas ymnigt under sommaren.
- Nierembergia**, (Solanacææ.) T. F.
- " *frutescens*, Buenos Ayres 50
- Fin buskväxt med talrika, hvita, med ljusblått tecknade blommor. Plant. i löfjord; toppas ofta.
- Olea**; *Oljvetråd* eller *Oliveråd*, (Oleinaææ.) T.
- " *europæa*, S. Europa, N. Amerika 50
- Planteras i löfjord; beskåres årligen.
- Oncidium**, (Orchidææ.) V.
- " *altissimum*, Vestindien 2,50
- " *bicallosum*, Guatemala 5 —
- " *leucochilum*, Mexiko 5 —
- " *Papilio*, Trinidad 15 —
- Märkvärdiga, fjärrslika blommor. Fastbindas vid träklossar. Fordra varm och fuktig atmosfær.
- Opuntia**; *Fikonkaktus*, (Cactææ.) V. B.
- " *coccinellifera*, Mell. & S. Amerika 1,50
- " *curasavica*, Mell. & S. Amerika 1 —
- " *cylindrica*, Peru 1 —
- " *Ficus indica*, Mell. & S. Amerika 1 —
- " *myriacantha*, Mell. & S. Amerika 1 —
- " *ramulifera*, Mell. & S. Amerika 1,50
- " *Rufinesquiana*, Mell. & S. Amerika 1 —
- " *stricta*, Mell. & S. Amerika 1 —
- Behandlas som Cactus.
- Oreodoxa**; *Bergpalm*, (Palmeææ.) V.
- " *Regia*, Cuba, unga exemplar 10 —
- Stättlig palm. Planteras i kraftig löf- & grästorfjord; vattnas rikl; fuktig, varm atmosfær.
- Osmunda**, (Osmundacææ.) T.
- " *regalis*, Sverige, sällsynt. 2 —
- " *spectabilis* var. *gracilis*, N. Amerika 3 —
- Utmärkt vackra ormbunkar. Den förstnämnda tål vintern på kalljord; de senare öfvervintras frostfritt men utplanteras under sommaren.
- Oxalis**; *Hårklöfver*, (Oxalidææ.)
- " *Bovicii*, Godahoppsudden, V. 75
- " *esculenta*, T. F., . . pr 100 st., 1 rdr —
- Den förstnämnda har stora, vackra carmosinröda blmr. Vattnas ej om vintern, då den hvilat; ompl. om våren i sandblandad löfjord. O. *esculenta*, hvars rötter äro ätbara, användas till inf. kring blomstergrupper; utplanteras om våren på 2 à 3 tumms afstånd från hvarandra; upp-tagas då frost inträffar.
- Pandanus**; *Spiralpalm*, (Pandaneææ.) V.
- " *caricosus*, Ostindien 5 —
- " *javanicus* fol. var., Java 5 —
- " *utilis* Madagascar 10 —
- Utmärkt praktfulla dekorationsväxter för större varmbus. Planteras i kraftig löf- och torvfjord.
- Panicum**; *Hirs*, (Gramineææ.) V.
- " *plicatum*, Ostindien 50
- " fol. arg. var. 1 —
- " *sulcatum*, Ostindien 50
- " *variegatum* 50
- De tre förstn. utm. sig genom palmlika, breda,

- Pr st. Rmt Rd ö.
- veckade blad och äro sköna dekorationsväxter. Den sistn., hvars blad äro hvitröda, är låg, krypande och kan användas till amplar, infattningar af ställager o. s. v. i varma växthus.
- Passerina**; *Fågelluffväxt*, (Thymelææ.) T.
- " *filiformis*, Godahoppsudden 75
- Vacker dekorationsväxt. Pl. i ljung- & löfjord.
- Passiflora**; *Passionsblomster*, (Passiflorææ.)
- " *alba*, Brasilien, V. T. 75
- " *coerulea*, Brasilien, V. T. 75
- " *edulis*, Brasilien, V. T. 75
- " *trifasciata*, Trop. Amerika, V. 2,50
- Praktfulla slingerväxter med vackra, underbara blommor. Planteras i god löfjord.
- Peirescia**, (Cactææ.) V.
- " *aculeata*, Vestindien 50
- Denna växt odlas hufvudsakligen för att deruti inympa andra cactusarter.
- Pelargonium**, (Geraniacææ.) T. F.
- " Storbloom. engelska; Odiérska; diadem- och fantasipelargonier med namn 60
- 50 olika sorter med namn rdr 25 — —
- 25 " vackra sorter m. namn " 13 — —
- 12 " sorter med namn " 7 — —
- 25 " " i ruml. utan namn " 7 — —
- 12 " " i ruml. utan namn " 4 — —
- " Scarletpelargonier, enkla med namn — 60
- 25 olika sort. enkla m. namn rdr 10 — —
- 12 " sorter enkla m. namn " 6 — —
- 12 st. med tvåfärgade blad " 6 — 60
- 6 " m. tre- o. flerfärg. blad " 5 — 1 —
- 6 " med dubbla blommor " 5 — 1 —
- 100 " enkla i ruml till grup. " 20 — —
- 50 " " i ruml till grupper " 12 — —
- 25 " " " till grupper " 6,50 — —
- 12 " " " grupper 3,50 — 35
- Vår pelargoniesamling består af såväl nyare och nyaste, som de bästa äldre sorter. Särskildt förtjena de s. k. skarletpelarg. uppmärksammas, emedan de äro lika vackra till grupper, som till odling i krukor och med en samling sådana kan man åstadkomma de vackraste sammanställningar. Blomma hela året, med undantag af de mörkaste vintermånaderna.
- Penstemon**, (Scrophulariææ.) T. F.
- " diverse sorter i rummel till grupper — 30
- pr 12 st., 3 rdr.
- Blommorna variera i rött och violet. Utmärkt vackra och tacksamma för frilandsgupper. Fortplantas genom sticklingar.
- Peristeria**, (Orchidææ.) V.
- " *Humboldtii* (Acineta) Venezuela 10 —
- " Orchidé med märkvärdiga blmr. Plant. i mossar.
- Persea**; *Kamfersträd*, (Solanacææ.) T.
- " *Camphora* (Laurus) Kina, Japan 2,50
- Luktat starkt kamfert. Pl. i löf- & ljungjord.
- Petunia**, (Solanacææ.) T. F.
- " öfver. exemplar . . pr 12 st., 5 rdr — 50
- En af de tacksammaste och vackraste gruppväxter. Odlade i kruka blomma den äfven länge och rikligt. Planteras i fet löfjord.
- Phalacraea**, (Eupatoriææ.) T. F.
- " *Wendlandii*, S. Am., pr 12 st., 3 rdr — 30
- Vackra, blå blommor i rika flockar. Unga frö- eller sticklingsplanter blomma, om de under sommaren väl behandlas, i Oktober och November, en tid då alla blommor äro välkomna. För öfrigt förträfflig till grupper.

Pr st. Rmt Rd ö.

Pr st. Rmt Rd ö.

Phegopteris, (Polypodiæ).

- „ *Dryopteris, Sverige, F.* — 25
 „ *spectabilis, trädartad, Trop. Amer., V.*,
 unga fröplantor 1,50
 „ *tetragona, Hemland? V. T.* — 50
 „ Bland dessa ormbunkar utmärka sig isynnerhet
 Ph. spectab. för flera olika långa, vackra blad.
 Planteras i halfrutten skogsjord.

Philodendron, (Aroideæ) V.

- „ *bipinnatifolium, Brasilien* 2,50
 „ *Linnei, Trop. Amerika* 2,50
 Utmärkta bladväxter. Planteras i god löfjord.

Phoenix; Daddelpalm, (Palmeæ) V. T.

- „ *canariensis, Canariöarne?* unga ex. 10 —
 „ *cycaedifolia, Hemlend?* unga exempl. 10 —
 „ *dactylifera, vanl., Asien, Afrika* . . . 1,50
 „ *reclinata, S. Afrika, Kafferlandet* . 15 —
 „ *sylvestris, Ostindien* 10 —
 Fraktfulla palmer, hvilka såsom stora kumna
 odlas i tempererade växthus. Som små fordra
 de mera värme. Planteras i kraftig löf- och
 drimbänkjord; vattnas ymnigt.

Phormium; Ny-Zeelandslin, (Asphodoleæ.)

- „ *tenax, Nya Zeeland, T.*, 2,50; 5 å 10 —
 Dekorationsväxter med långa, smala, ljusgröna
 blad. Planteras i löf- och torfjord.

Phyllanthus; Bladblomster, (Eupatoriææ.)

- „ *angustifolius, Vestindien, V.* 1,50
 De små blommorna framkomma i bladkanterna.
 Planteras i löfjord.

Phymatodes, (Polypodiæ) V. T.

- „ *Billardieri, Nya Zeeland* — 50
 „ *longipes, Malaiska öarne* — 50
 „ *postulata, Nya Zeeland* — 50
 Ormbunkar. Planteras i halfrutten skogsjord.

Physematum, (Polypodiæ) V.

- „ *Perinianum, N. Amerika* 1 —

Pincenecticia, (Asphodoleæ) T.

- „ *glauca (Beaucarnea stricta) Mexiko* . 2,50
 „ *tuberculata (Beauc. recurvata, Mexiko)* 3 —
 Stätliga dekorationsväxter med smala blad och
 egendomliga stambildningar. Plant. i löfjord.

Piperomia; Pepparväxt, (Piperaceæ) V.

- „ *ariifolia var. argyreia, Brasilien* . . . 1 —
 „ *magnoliifolia, S. Amerika* 1 —
 Båda odlas för sina blad. Planteras i ljungjord.

Pitcairnea, (Bromeliææ) V.

- „ *leionema, Trop. Amerika* 2 —
 Planteras i halfrutten skogsjord; fordrar skugga,
 värme och fuktighet.

Pittosporum; Klippfrö, (Pittosporææ) T.

- „ *Tobira, Kina* 1 —
 Vackra blad; hvita väluktande blommor. Plan-
 teras i ljung- och löfjord.

Platyterium, (Polypodiæ) V.

- „ *alcicorne, Ostindien* 1,50
 Märkvärdig ormbunke. Fastbindes vid träcklos-
 sar; hålles ständigt varm och fuktig.

Plumbago; Blyrot, (Plumbagineæ) T.

- „ *capensis, Godahoppsudden* 1 —
 Vackra blå blommor. Plant. i ljung- & löfjord.

Podocarpus, (Conifereæ-Podocarpeæ) T.

- „ *acicularis, Nya Zeeland* 3 —
 „ *coreana, (Toreya nucifera) Japan* . . 5 —
 „ *latifolius, Japan* 1,50
 „ *nerifolius, Nepal* 2 —
 „ *Mockii, Japan* 1,50

Podocarpus nubigense, Nubien 1,50

Ständigt gröna träd. Plant. i löf- & ljungjord.

Polyanthus; Tuberos, Hemerocallidæ) T.

- „ *tuberosus, Java, Ceylon* — 50
 „ Stora, hvita, väluktande, stundom dubbla blom-
 mor på långa stjelkar. Rötterna hvilas om vin-
 tern, bära då ej vattnas; omplanteras om våren
 i god löfjord.

Polemonium, se fleråriga blomsterväxter.**Polygala; Jungfrulin; Fågelört, (Polygalææ.)**

- „ *Dalmaisiana, Godah. udden, T. B.* . 1 —
 „ *grandis, Godahoppsudden* 1 —
 „ *latifolia, Godahoppsudden* 1 —
 Vackra, violetta blommor under nästan hela året.
 Planteras i ljung- och löfjord.

Polypodium; Bergsöta, (Polypodiæ.)

- „ *areolatum, Hemland?* 2 —
 „ *aureum, Trop. Amerika, V.* 1 —
 „ *decursivum-pinnatum, Amerika* . . . 1,50
 „ *dimorphum, Antillerna* 1,50
 „ *glaucum (Phlebodiumsporadocarpum)*
Mexiko, V. 1,50
 „ *irioides (Microsorium) Vestindien, V.* 1 —
 „ *latipes (Goniophleb. loriceum) Trop.*
Amerika, V. 1 —
 „ *leiorhizon, Brasilien* 2 —
 „ *metamorphum (Goniophlebium sub-*
auriculatum) Malaiska öarne, V. . . 2,50
 „ *morbillosum, Borneo* 5 —
 „ *nigrescens, S. Amerika* 2 —
 „ *nitidulum, Honduras, V.* 2 —
 „ *Paradisæ, Brasilien, V.* 1,50
 „ *sanctum, Nya Zeeland* 3 —
 „ *teniosum (Campyl angustif) T. Am., V.* 1,50
 „ *vulgare, S. Europa, N. Amerika, F.* — 25
 „ *cristatum, N. Amerika, T. F.* . . . 1 —
 „ *seratum, N. Amerika, T. F.* 1 —
 Vackra, intressanta ormbunkar. Planteras i half-
 rutten skogsjord.

Polystichum, (Polypodiæ) T. F.

- „ *angulare var. grandidens, Europa* . . 1,50
 „ *var. interrupta* 1,50
 „ „ *imbricatum* 1,50
 „ *coriaceum, Mauritius* 1,50
 „ *crisatum* 2,50
 „ *grandiceps* 2,50
 „ *gracile* 2,50
 „ *imbricata* 3 —
 „ *lobatum* 2 —
 „ *latipes* 2,50
 „ *proliferum* 1 —
 „ *Wollastonii* 2 —
 Intressanta ormbunkar.

Pothos, (Aroideæ) V.

- „ *ventricosus, Trop. Amerika* 1,50
 Märkvärdiga för sina uppblåsta bladskaff.

Primula. Manjucel; Gullviva, (Primulææ.)

- „ *cortusoides, Sibirien, T. F.* — 50
 „ *amoena grandifl.* 1 —
 „ *chinensis (prænitens) i många utmärkta*
sorter, T. B. pr 12 st., 5 rdr — 50
 „ fl. pl., dubbla, utm. vackra, T. B. 1,50
 „ andra sorter (*acaulis & mollis*) till odl.
 i krukor, se fleråriga blomsterväxter.

- Pr st. Rmt Rd ö.
- Den förstn. har rosenröda blmr. P. cort. am. gr. är en utm. vacker form med stora röda blmr. Behandlas som den vanliga. Den s. k. kinesiska primulan är bland de vackr. och tacks. vinterblommor vi äga. De dubbla sorterna äro synnerl. vackra i buketter. Pl. i löfjord; fordra jemn ej öfverfödig fuktighet och skugga om sommaren.
- Protea**, *Silfverträd*, (Proteaceæ) T.
- ” *Scolymus*, Godahoppssuden — 50
Vackert träd med gulgröna blommor. Planteras i ljungjord.
- Pteris**, (Polypodiæ.)
- ” *arguta* (flabellata) Afrika, Södra Amerika m. fl. V. — 50
” *aspericaulis*, Ostindien, V. — 75
” *argyrophylla*, Trop. Amerika, V. 1 —
” *aurita*, Java, V. — 50
” *Blumeana* (repandula), Ostindien, V. — 50
” *eretica*, S. Eur., Or., Afr., Bras., T. V. — 50
” *calomelanus*, Hemland? 1,50
” *geraniefolia*, (Pellæa) Vestindien, V. 1 —
” *gigantea*, Guatémala, V. 1,50
” *glaucoviridis*, Ceylon, V. 1 —
” *hirsuta*, Vestindien, V. 1,50
” *longifolia*, S. Eur., Afr., Orient., T. V. — 50
” *nemoralis*, Brasilien, V. — 50
” *palmata*, (Doryopteris) Brasilien, V. 1 —
” *repandula*, Hemland? 5 —
” *sagittata*, Brasilien 1 —
” *semipinnata*, Kina, Ostindien, T. V. — 75
” *serrulata*, Kina, Japan m. fl., V. T. — 50
” *cristata*, T. V. 2,50
” *variegata*, T. V. 2,50
” *polydactyla*, T. V. 2,50
” *tremula*, Nya Holland, T. V. — 50
” *umbrosa*, Nya Holland, T. V. — 50
Alla vackra, intressanta ormbunkar.
- Puya**, (Bromeliæcæ) V.
- ” *Altensteinii*, Columbien 1 —
Vackra, skarlakaröda blommor. Pl. i löfjord.
- Rhaphis**, (Palmeæ) V. B.
- ” *flabelliformis*, Kina, Japan, 2, 10 à 25 —
Vacker palm. Planteras i löf- och grästorjord.
- Remusatia**, (Aroideæ) V.
- ” *vivipara*, Malabar 1 —
Stora, vackra blad, bör under hvilotiden ej vattnas, under växttiden deremot ymnigt. Planteras i löfjord.
- Rhodea**, (Aspidistæ) T.
- ” *japonica*, Japan 1 —
Dekorationsväxt. Planteras i löf- och torfjord.
- Rhododendron, se Träd och buskar till anlägg.
- Richardia** eller **Calla**, (Aroideæ.)
- ” *africana*, se *Calla æthiopica*.
” *albo-maculata*, Nepal, T. 1 —
Vackra, hvitfläckiga blad och mindre än den vanliga. Planteras i löfjord.
- Rivinia**, (Phytolacæ) V.
- ” *brasiliensis*, Brasilien — 50
” *humilis*, Vestindien — 50
Vackra, högröda frukter. Planteras i löfjord.
- Russelia**, (Scrophulariæcæ) V.
- ” *juncea*, Mexiko — 75
Trädfröna, nästan bladlösa grenar och röda blommor. Planteras i löfjord.
- Sabal**; *Sabalpalm*, (Palmeæ) V.
- ” *Adansonii*, Georgia etc., starka 15 —
- Pr st. Rmt Rd ö.
- Sabal Palmetto**, Florida, starka 10 —
Vackra. Planteras i löf- och grästorjord.
- Saccharum**; *Sockerrör*, (Gramineæ) V.
- ” *officinarium*, Ost- & Vestindien 1,50
Plant. i löfjord; vattnas ymnigt om sommaren.
- Salvia**, (Labiæcæ) T. F.
- ” *argentea*, Orienten, pr 12 st., 10 rdr 1 —
” *patens*, Mexiko 1,50
Den förstnämnda har stora, silfverhvita blad och användas fördelaktigt till grupper. Den senare har rent ultramarinblå, vackra blommor. Planteras i löfjord; vattnas ej om vintern.
- Sanchezia**, (Acanthacæ) V.
- ” *nobilis*, Ecuador 1,50
” *spectabilis*, Ecuador 1,50
Dessa växter utmärka sig för stora med guld-gula tvåådror prydda blad och skarlakaröda blommor. Planteras i god löfjord.
- Sansevieria**, (Asphodolæ) V.
- ” *guineensis*, Guinea 1,50
Aloelk med gråhvita, väluktande blommor. Planteras i löfjord; vattnas sparsamt om vintern.
- Sauromatum**, (Aroideæ) V.
- ” *cornutum*, Ostindien — 50
” *pedatum*, Caracas 1 —
” *pulchrum*, Ostindien 2,50
Ha märkvärdiga, illaluktande blommor, men stora, vackra blad. Rötknälarne ligga torra om vintern; omplanteras om våren i löfjord.
- Saxifraga**; *Stenbräcka*, (Saxifragæcæ.)
- ” *sarmentosa*, Kina, Japan, T. B. — 50
” *tricolor*, T. B. — 50
Begagnas ofta i boningsrum till ampelr. Planteras i löfjord; vattnas måttligt om vintern.
- Schizostylus**, (Irideæ) T.
- ” *coccinea*, S. Afrika — 50
Vackra högröda blommor i Oktober och November. Planteras i löfjord.
- Scilla**; *Hafslök*, (Asphodolæ) T.
- ” *maritima*, S. Europa, stora lökar. 3 —
Vattnas ej under hvilotiden. Planteras i löf- och drifbänkjord.
- Scolopendrium**; *Hjorttung*, (Polypodiæcæ.)
- ” *officinarium*, Europa, T. F. — 75
” 10 à 12 olika former, hvardera 1,50 à 2 —
Märkvärdiga ormbunkar. Tåla vintern ute under betäckning.
- Scutellaria**; *Hjelmört* eller *Gtnos*, (Labiæcæcæ.)
- ” *Mociniana*, Nya Spanien, V. 1 —
” *scarlatina*, Nya Granada, V. — 50
Den förstnämnda är en verklig praktväxt med stora knippor af eldröda blommor; den senare ärven ganska vackra. Planteras i god löfjord; fordra varm, fuktig luft och skugga.
- Seafortia**, (Palmeæ) V.
- ” *elegans*, Trop. delen af Nya Holland, mycket vackra, unga exemplar 10 —
Praktfull palm. Planteras i löf- och grästorjord; vattnas ymnigt.
- Sedum**; *Fetvärt*; *Fetknoppar*, (Crassulacæ) T.
- ” *Fabarium*, Karpatherna — 50
” *Sieboldii*, Japan — 50
” *in medio pictum* — 75
Planteras i sandblandad löfjord; vattnas måttligt om vintern.
- Selaginella**; *Lummer*, (Lycopodiæcæ) V.
- ” *apoda* (S. apus); *Lycopod. bras.* Bras. — 50
” *caulescens* (S. peltata; *Lycopod. fruticulosa*) Java 1 —

Pr st. Rmt Rd ö.

- Selaginella convoluta* (S. paradoxa; *Lycopodium hygrometricum*) Brasilien 1 —
 „ *cuspidata* (S. pallescens; *Lycopodium circinatum*) Guatemala 1 —
 „ *denticulata* (*Lycopodium*) S. Eur., T. — 50
 „ „ fol. var., praktfull, ljusgrön — 75
 „ *erythropus* (L. umbrosus) S. Amer. 1 —
 „ hematodes (S. filicina; Karsteniana; *Lycopodium hematodes*) Peru 1 —
 „ *Lobbi* (*Lycopodium*) Borneo 2 —
 „ *Lyalli* (*Lycopodium*) Madagascar 1 —
 „ *Martensii* (L. stolonif, flabellat.) Mex. — 50
 „ „ *compacta* (L. asplenif.) Mexiko — 75
 „ „ fol. var., med brokiga blad. — 75
 „ *pilifera* (S. lepidophylla) Texas 1 —
 „ *Poulterii* (*Lycopodium*) Brasilien — 50
 „ *serpens* (S. variab.; L. Serp.) Mexiko — 50
 „ *uncinata* (S. caecia; L. uncinat.) Kina — 50
 „ *Wildenowii* (S. & L. pubescens) Ostind. 1 —
 Utm. nätta, mosslika, ombunkartade växter; till mycken prydn. i varma växthus och oundärliga i s. k. terrarier. Några sorter, såsom S. denticulata, apoda, uncinata m. fl. äro krypande och blifva knappt ett par tum höga; andra, såsom S. caulescens och Martensii m. fl. växa upprätt och lika de egentliga ombunkarne. Odlingen är ej svår; de fordrå lätt, halfrutten jord och framförallt jern, men ej öfverfödig fuktighet. S. denticulata kan äfven odlas i kalla och tempererade växthus.

Senecio; Böört, (Senecionideæ) T.

- „ *Petasites* (Cin. platanif.) Mexiko — 50
 „ *Ghiesbreghtii*, Mexiko 1 —
 „ andra sorter, se Cineraria.
 Stora, vackra blad och gula blommor; passa till bladgrupper.

Solanum; Trollbär, (Solanaceæ) V. T. F.

- „ 12 st. i flera sorter, till bladgrupper, 4 rdr.

Spatiphyllum, (Aroideæ) V.

- „ *cannae-folium*, Vestindien 2 —
 „ *heliconiaefolium*, Vestindien 1,50
 Vackra dekorationsväxter. Planteras i löfjord. Spreckelia, se *Amaryllis formosissima*.

Stanhopea, (Orchideæ) V.

- „ *aurea*, Guatemala 10 —
 „ *eburnea*, Brasilien 10 —
 „ *graveolens*, Brasilien 10 —
 „ *insignis*, Brasilien 10 —
 „ *Jenischii*, Brasilien 15 —
 „ *Lindleyana*, Mexiko 10 —
 „ *oculata*, Mexiko 10 —
 „ *figrina*, Mexiko 15 —
 „ *Wardii aurea*, La Guayra 10 —
 Märkvärdiga, praktfulla, starkt vaniljuktande blommor. Planteras i hackad hvitmosa, uppblandad med grof torfjord och träkol, uti korgar af öfver hvarandra lagda träpinnar.

Strelitzia, (Musaceæ) V.

- „ *Augusta* (*Heliconia alba*) Godah.-udd. 10 —
 „ *Regina*, Godahoppssudden 5 —
 Den förstnämnda uppnår äfven i växthus betydlig storlek. Den andra har hvarje år märkvärdiga blå och gula blommor, men blifver ej så stor. Planteras i kraftig löf- och grästorfjord.

Struthiopteris; Strutträken, (Polypodiæ)

- „ *germannica*, Sverge, T. F. — 50
 Utmärkt i ombunkgrupper och i krukor.

Pr st. Rmt Rd ö.

Tecoma, (Bignoniaceæ) T.

- „ *jasminoides*, Nya Holland 1 —
 „ Slingerväxt med stora, vackra blommor. Planteras i löfjord.

Teucrium; Kattört, (Labiatae) T. B.

- „ *Marum*, Spanien, Syrien m. fl. — 50
 Starkt luktande, gråaktig buskväxt. Pl. i löfjord.

Thalia, (Cannaceæ) V.

- „ *dealbata*, Carolina 1 —
 Vackra blad. Planteras i löf- och grästorfjord; vattnas ymnigt eller ställes i vatten.

Thrinax; Thrinaxpalm, (Palmeæ) V.

- „ *parviflora*, Trop. Amerika, små plant. 2,50
 Praktfull palm med cirkelrunda, soffjäderlika blad. Planteras i löf & torfjord; vattnas ymn.

Thuja, se Träd och buskar till anläggningar.**Thujopsis, (Cupressineæ) T.**

- „ *dolabrata*, Japan, vackra, 50 öre à 1 —
 Vackert, ständigt grönt, cypresslikt träd.

Tillandsia, (Bromeliaceæ) V.

- „ *brachystachys*, Trop. Amerika 2,50
 Plant. i halfrutten löfjord; fordr. värme & fukt.

Torenia, (Scrophulariaceæ) V. B.

- „ *asiatica*, Ostindien 1 —
 Vacker ampelväxt med blå blmr. Pl. i löfjord.

Tradescantia, (Commelineæ) V. B.

- „ *discolor*, S. Amerika — 75
 „ *zebrina*, S. Amerika — 50
 Den sistn. passar till amplar. Plant. i löfjord.

Trithrinax, (Palmeæ) V.

- „ *mauritiformis*, Venezuela, starka . 10 —
 Praktfull palm. Planteras i löf- och torfjord.

Tropaeolum; Krasse, (Tropæoleæ) T. B.

- „ *azureum*, Chili 4 —
 „ *Jarattii*, Chili 1,25
 „ *tricolorum*, Peru 1,25
 Utmärkt vackra, talrika blmr, tidigt om våren. Hvila under sommaren, böra då ej vattnas. I Sept. börjar den trädfina stängeln att åter växa, då rotnöjl. böra ompl. i god löfjord, ställas ljusa och vattnas försigtigt. Rankorna ledas upp efter fina, greniga, i krukan nedstickna qvistar, eller ock uppåt fina stålträdespalier.

Tydaea, (Gesneriaceæ)

- „ flera vackra sorter, pr rhizom — 50
 „ „ vackra sorter, pr kruka 1 rdr.
 Praktfulla blommor. Behandlas som *Achimenes* eller *Gesneria*.

Urtica; Nässla, (Urticaceæ) V.

- „ *macrophylla*, Japan — 60
 Utmärkt vackra blad. Planteras i löfjord.

Vallota, (Amaryllideæ) V. B.

- „ *purpurea* Godah.-udd., pr 12 st. 10 rdr 1 —
 Denna tacksamma lökväxt utvecklar sina praktfulla skarlahanröda blommor i Okt. & Novemb. Förtjnt att allmänt odlas. Plant. i god löfjord.

Veltheimia, (Asphodelæ) V. B.

- „ *glauca*, Godahoppssudden 2 —
 „ *viridiflora*, Godahoppssudden 1 —
 Lökväxt med ljusröda blommor i rika klasar. Planteras i löfjord; vattnas ej under hvilotiden.

Verbena; Jernört, (Verbenaceæ) T. F.

- „ fl. vackra sort. t. gr., pr 12 st., 4 rdr — 40
 „ *Imperatrice* Elisabeth, vacker till infatn., pr 100 st., 20 rdr; 12 st., 3 rdr — 30

Veronica; Ärenpris, (Schrophulariaceæ)

- „ fl. vackra hybrider och varieteter. T. B. — 50
 Blommorna varierar i blått och violett; utmärkt vackra. Planteras i kraftig löf- & drifbänkjord.

Pr st. Rmt Rd ö.

Viburnum; *Snöboll*, (Caprifoliaceæ.)

” **Tinus**, S. Europa, T. B. . . 50 öre à 2 —
 Dessutom finnes starka exemplar, liknade lagerträdd, med stora, runda kronor; priserna derå meddelas på begäran.

Wellingtonia, se Träd till anläggningar.

Wigandia, (Convolvulaceæ.) V. F.

” **earacassana**, Caracas, pr 12 st., 5 rdr — 50
 ” **Vigierii**, Tr. Amer., pr 12 st., 5 rdr — 50
 Höra till de aldra vackraste bladväxter för fritt land under sommaren. Fordra fet jord och värma, skyddade platser.

Yucca; *Palmiljja*, (Liliaceæ.) T. F.

” **aloefolia**, Jamaica, Vera Cruz . . . 2;50
 ” ” fol. var. 2,50
 ” **Draconis**, Syd-Carolina, unga, starka 2,50
 ” **flaccida**, Hemland? unga plantor . . 1 —
 ” ” **meldensis**, unga exemplar . . . 1,50
 ” **gloriosa**, Virginien, unga, starka ex. 5 —
 ” **plicata**, Virginien, unga, starka ex. 5 —

Pr st. Rmt Rd ö.

Yucca recurvata, Georgien, starka ex. . . 5 —
 Palmiljorna äro utmärkte dekorationsväxter m. hvita eller hvitgula, liljelika, vålluktande blommor. Kunna användas om sommaren i det fria. Planteras i kraftig, humusrik jord; vattnas sparsamt om vintern.

Zygotepalum, (Orchidææ.) T. F.

” **crinitum**, Brasilien 5 —
 ” Utmärkt vackra, blå blommor om hösten. Planteras i mossor.

Då urvalet af sorterna öfverlättes åt oss, lemnas olika, vackra krukväxter i unga, men fullkomligt friska och starka exemplar med namn:

300 olika, vackra krukväxter . . . 100 —
 200 ” vackra krukväxter 75 —
 100 ” ” krukväxter 40 —
 50 ” ” krukväxter 25 —
 25 ” ” krukväxter 15 —
 12 ” ” krukväxter 8 —

VIII. Praktexemplar af Krukväxter:

Af följande växter finnas stora praktexemplar, hvilka säljas till här antecknade priser. Den uppgifna höjden beräknas från baljans eller krukans botten till växtens topp.

Pr st. Rmt Rd ö.

Agave americana fol. aur. marg., 3 f. h. o. ungef. lika breda ex., 2 st. 90 rdr. 50 —
 ” **atrovirens**, 1½ fot höga ex. 25 —
 ” **coccinea**, 1½ fot höga, 2 st. 45 rdr 25 —
 ” **filifera**, 1½ fot höga, utm. vackra 50 —
 ” **lurida**, 7 à 8 fot höga, jätteexempl. 200 —

Alsophila australis; *Trädartad Ormbunke*, praktfull; stam 4 fot hög, bladen 6 till 7 fot långa 150 —
 ” **australis**, plantor à 2 f. höjd, bladen inberäknade, starka o. vackra, 10 à 15 —

Araucaria Biddvillii, 7 fot höga och lika breda praktexemplar 100 —
 ” **brasilienensis**, 9 à 10 fot höga. . . 50 —
 ” **Cunninghamii**, 8 fot höga, 5 fot breda, utmärkt vackra exemplar . . 120 —
 ” **exelsa**, 20 à 30 fot höga, verkliga praktexemplar 300 —
 ” ” 9 à 10 fot höga, utm. vackra . 100 —
 ” **imbricata;** *Chilitall*, 8 à 9 fot höga, 7 fot breda, praktik. exemplar . 150 —
 ” 5 fot höga, lika breda 50 —

Areca Bauerii (en af de vackraste palmer för tempererade lokaler) 7 fot höga med 5 à 6 blad 100 —
 ” **rubra**, 7 fot höga med 5 à 6 st., 4 à 5 fot långa blad 50 —

Asplenium Belangerii, starka, vackra exemplar 10 —
 ” **Nidus avis**, starka 50 —

Attalea exelsa, *Uricari*- eller *Pisabapalm*, 6 fot höga med 10 blad . 100 —
Aucuba japonica, 5½ fot hög, buskig 25 —
 ” **japonica**, 3 à 4 fot höga. 10 —
 ” **macrodontha**, 5½ fot hög, praktikf. 40 —

Pr st. Rmt Rd ö.

Balanium antarcticum; *Trädlik Ormbunke*, stam 3¼ f. h. o. 10 tum i diameter; bladkronan rik, ytterst praktikf. 200 —
 ” **antarcticum**, stambhöjd 2 fot, för öfrigt som föregående 150 —

Beaucarnea tuberculata, 3 fot hög med stamknöl, som håller nära 6 tum i diameter. 50 —

Begonia, många olika sorter i mycket starka exemplar, planterade i stora krukor och fat. 5, 10 à 15 —

Biota orientalis expansa, 9 fot hög. 20 —
 ” **orient. aurea**, 4 à 5 fot h., 3 fot i genomskrifning . . pr 2 st., 70 rdr 40 —
 ” **orientalis Fortunei**, 5 à 7 fot hög, 2½ fot i genomskrifning. 50 —

Blechnum brasiliense, *Trädlik Ormbunke*, 3 à 4 fot h. med 6 à 8 blad 25 —

Bonapartia juncea, 4½ fot höga, 5 fot i genomskrifning, praktfulla . . 100 —
 ” **gracilis & glauca**, 2 à 2½ f. h. 25 à 30 —

Buxus sempervirens, 9 f. h. pyramider 35 —
 ” **sempervirens**, 5 fot höga pyramider 15 —

Camellia, flera sorter, 12 à 18 fot höga med vackra kronor. 100 —
 ” 8 à 10 fot höga, utmärkte ex., 25 à 50 —

Chamadorea elatior (Martiana) 7 à 8 fot höga m. fl. sidokott 30 —
 ” **Ernesti-Augusti**, 4 à 5 f. m. 5 à 6 blad 25 —

Chamærops exelsa (Fortunei), *Chinesisk dvergpalm*, 7 fot hög med 20 à 30 blad 150 —
 ” **exelsa**, 3 à 4 fot med 15 à 18 blad 75 —
 ” **humilis;** *Europeisk dvergpalm*, 5½ à 6 fot hög med 20 à 25 blad . 100 —

Pr st. Rmt Rd ö.

- Chamærops humilis* 3 à 4 fot hög med
15 à 20 blad 75 —
" *humilis*, 2 à 3 f. h. med 10 à 15 blad 30 —
" *Palmetto*, starka med 10 à 12 blad 50 —
Utmärkt vackra dekorationspalmer för temperade lokaler.
- Cibotium princeps.** (En af de ståtliga trädlika ormbunkar som finnas.)
Starka praktex. utan stammar, men med 6 à 8 st. öfver 6 f. långa blad 75 —
" *Schideii*, praktex. med 7 à 9, omkring 8 fot långa blad 100 —
" *regale*, unga plantor med 6 à 8, omkring 4 fot långa blad 50 —
- Cordolync** (*Dracæna*) *australis*, 12 à 18 fot höga praktfulla ex. med rika bladkronor 100 —
" *australis*. 5 à 8 fot höga, starka 20 —
" *brasiliensis*, 6 f. h. m. 25 à 30 blad 25 —
" *Cannæfolia*, 7 fot hög med 25 blad 50 —
" *nutans*, 2 à 3 fot höga, vackra 10 —
" *robusta*, 6 fot höga m. 15 à 20 blad 25 —
" *siamensis*, 5 f. h. m. 12 à 15 blad 10 —
" *superbiens*, 13 à 15 fot höga, utmärkt praktfulla exemplar med mycket rika bladkronor 150 —
" " 10 fot höga, eljest som föreg. 100 —
" " 4 fot höga, utmärkt vackra 40 —
Allo samman utmärkt dekorationsväxter för tempererade lokaler.
- Corypha** (*Livistona*) *australis*; *Solfjæderpalm*, mycket stora och starka ex. med 25 à 35, omkring 6 fot långa och 3 fot breda blad 250 —
" *australis*, 4 à 5 fot höga, starka ex. med 12 à 15 blad 75 —
Utmärkt ståtliga palmer för temper. växthus.
- Crium americanum**, 5 fot höga med 3 à 4 fot långa och 4 tum breda blad; blommorna hvita liljelika 100 —
- Cupressus fastigiata**; *Åkta Cypress*, 15 à 20 fot höga exemplar 100 —
" *Lawsonii*, 11 à 12 fot höga, lummiga, praktfulla exemplar 75 —
- Cycas revoluta**; *Sagopalm*, starka, utm. vackra ex. i flera storlekar, 15, 25, 50 à 100 —
- Dracæna Draco**; *Åkta Drakblodträd*, 10 à 12 fot höga, med 5 à 6 tum tjocka stammar och mycket stora, rika bladkronor 150 —
" *Draco*, 5 fot höga, eljest som föreg. 75 —
" *ferrea* (med mörkröda blad) 5 f. h. 15 —
" *Rumphii*, 5 fot höga exemplar 25 —
" *umbraculifera*, 2 fot höga, 2 à 3 fot vida exemplar 50 —

Pr st. Rmt Rd ö.

- Dracæna Veitchii*, 3 fot höga exemplar 15 —
Ficus australis, 12 fot höga exemplar med vackra kronor 50 —
- Hedera Helix** var. *digitata*, vackra, 6 fot höga, pelarlikt uppdragna ex. 25 —
" *Helix maculata*, som föregående 15 —
- Ilex aquifolium fol. luteis** var., 5 à 6 fot höga, vackra exemplar 10 —
- Laurus nobilis**; *Lager*, gamla, utmärkt vackra exemplar med runda kronor. —
Priset, som noteras efter växternas ålder och storlek, meddelas på begäran.
- Livistona chinensis**, (*Latania bourbonica*) praktfulla ex. med 25 à 30 st., 10 $\frac{1}{2}$ fot långa, 4 à 5 fot breda, solfjäderlika blad 250 —
" *chin.*, 6 fot h. med 13 à 15 blad. 100 —
" " 4 fot hög med 9 à 11 blad 50 —
" " 2 $\frac{1}{2}$ fot hög med 7 à 9 blad 25 —
" *olivæformis*, 2 à 3 f. m. 8 à 10 blad 50 —
- Licuala spinosa**; *Likualapalm*, 3 fot höga ex. med 10 à 12 blad 50 —
- Marantha zebrina**, 5 fot hög, utmärkt 75 —
- Nettopteris Nidus**, en ormbunke, liknande ett väldigt fogelnäste, 4 fot hög, 5 à 6 fot i genomskärning 125 —
- Pandanus mauritanicus** (*elegans*) 5 fot höga, utmärkta exemplar 100 —
" *utile*; *Skrufpalm*, 9 fot hög, utm. 150 —
- Phoenix dactyifera**; *Daddelpalm*, 14 fot hög med 25 à 30 blad 200 —
" *dactyifera*, 8 fot hög med 12 blad 75 —
" *farinifera*, 2 fot h. m. 9 à 12 blad 75 —
" *reclinata*, 2 fot h. m. 8 à 10 blad 50 —
- Phormium tenax**; *Nyzeelandslin*, 4 à 5 fot höga, mycket bladrika exempl. 25 —
- Rhaphis flabelliformis**, 5 fot höga med talrika stammar 75 —
- Seafortia elegans**; *vacker palm*, 6 fot hög med 6 à 7 blad 75 —
- Saccharum officinarum**; *Sockerrör*, 14 fot hög med 12 à 15 starka rör 75 —
- Thrinax elegans**; *Trinaxpalm*, 4 à 5 fot hög med 7 à 9 blad 75 —
- Thuja gigantea**, 11 fot höga exempl. 30 —
- Trithrinax mauritiformis**; *Palm*, vackra ex. med 7 à 9 blad. 40 —
- Vriesia Glaziouana**, vacker, ananaslik växt med talrika, 4 fot långa, 2 à 3 tum breda blad och praktf. blmr. 125 —
- Yucca aloefolia**, 8 fot höga 30 —
" *aloefolia fol. var.*, 7 fot höga 50 —

Diverse:

Rmt Rd ö.
Svanor, hvita, tama, här födda, 2 st., 75 —
 „ ettåriga ungar 2 st., 50 —
Ympvax, kallflytande pr burk, 2,25
Bastmattor, goda pr st., — 75
Bukettpapper, (Manschetter) flera oli-

Rmt Rd ö
 ka sorter, mönster och storlekar,
 pr dussin 50 öre, 1 rdr, å 1,50
Bukettpapper med tyllspetsar . . pr st., 1 —
Bukettmanschetter af siden med tyll-
 spetsar, flera olika sorter, mönster och stor-
 lekar i åtskilliga färger, utmärkt vackra,
 pr st., 3; 3,50; 4; 4,50; 5; 5,50; 6, 7 å 8 —

Utmärkt smakfulla. fina buketter, till olika ändamål, från 2 till 50 rdr rmt pr st., försändas på requisition. Dock torde **observeras** att vi icke lemna **kredit** på **mindre belopp än 10 rdr.** hvarföre **liqvid** utbedes i **förskott** om requisitionen icke uppgår till nämnda belopp eller **reqvirenten** är oss **obekant**.



TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE,

utgifven under samverkan af flera af vårt lands mest framstående trädgårdsodlare och som under sin elfvaåriga tillvaro rönt en ständigt stigande uppmuntran, anmäles härmed vördsamt till prenumeration för 1873.

Tidningens syfte är fortfarande, att uteslutande verka för samma allmännyttiga mål som hittills, nämligen att söka väcka häg för, och sprida insigt i trädgårdsskötsel och trädgårdskonst bland alla samhällsklasser. Bland annat kommer den härmed anmälda **tolfte** årgången att innehålla en utförlig minneslista för trädgårdsodlare, afsedd såväl för hela Sverige som grannländerna. Tidningen utkommer med ett nummer i början af hvarje månad (12 nr pr år) och kostar såväl å postanstalterna som i bokhandeln **två riksdaler riksmünt.** Prenumerationssedlar å **1 rdr 82 öre** (då prenumeranten sjelf vid requisition å postkontoret erlägger portoafgiften, **18 öre**) kunna reqvирeras hos **GEORG LÖWEGREN.**

Stockholm i December 1872.

ERIK LINDGREN.

Register

öfver i katalogen förekommande svenska och utländska, mera allmänt begagnade växtnamn.

Sidan.	Sidan.	Sidan.	Sidan.
Aarons skägg 37. 92	Bergangelika 55. 69. 76. 83	Bukett-aster 15	Dverggyllenlack 18
Afodill 45	Bergfur 66	Bukettlöfkoja 16	Dverg-löfkoja 17. 18
Afvenbok 69	Bergpalm 94	Btkettros 72. 75	Dvergmandel 69
Akasia 54. 81	Bergskrabba 48. 78	Buxbom 69, 74	Dvergpalm 86. 98
Akeleja 44. 76	Bergsöta 95	Bärmispel 68. 72	Dyffelsträck 48
Al 68	Beta 13. 24	Bäräpple 72	Ek 72
Aleppofur 66	Betelpalm 83	Böna 5. 6. 30	Ekorrebär 46
Alm 74	Betesgröe 12	Bönträd 70. 88	Elefantsabel 38
Aloe 55. 82. 98	Bindsallad 7	Cajeputträd 61. 98	Eleusingräs 27
Alpros 62	Binka 48	Calla 56. 85	Elm 27
Alsikeklöfver 12	Bisamblomster 38	Camellia 56. 85. 98	En 66. 71
Alsrömeria 55. 82	Biskopsmössa 93	Camellie-balsamin 18	Endivie 7
Amaryllis 55. 82	Björnklo 23. 81	Cantaloup 10	Engelskt gräs 45. 77
Amerikansk aloë 55. 82. 98	Björnfloka 25. 78	Caprifolium 69	Elefantblomster 41. 52
Amerikansk Becktall 66	Björnrefva 77	Cardoner 6	Escariol 7
Amurgräs 12	Björnöra 32	Cardy 6	Eschalottök 9
Andrieux-Balsamin 18	Björk 69	Carolinapoppel 72	Esdragon 8
Anemon 44. 49. 76. 91	Bladkål 3	Caroter 4	Esparett 12
Angelika 7	Bladselleri 6	Cederträd 65. 69	Evighetsblomster 36. 59
Anguriepumpa 10. 29	Bladblomster 95	Cedronell 46. 77	Fackelblomster
Anis 8	Blodbok 70	Celaster 28	Fackelbärare 28
Apelsin 57	Bloddroppe 59. 90	Cembrafur 66. 72	Falsk akasia 72
Apelsinpumpa 20. 29	Blodlilja 91	Centnerpumpa 29	Falsk indigo 68
Aprikos 67	Blodört 52	Cerast 24	Fantasipelargonja
Aralia 23. 55. 69. 83	Blomkål 3	Champignon 10	Christoffersört 61. 94
Araukaria 69. 83. 98	Blomman för dagen 21. 29	Christoffersört 44	Christustörne 71
Arfve 32	Blomsterböna 6	Cichoria 4. 7	Fantasipensé 21
Ask 70	Blomsterlyra 47. 77	Citronmeliss 8	Femfingerört 51. 72. 79
Askört 25. 57. 86	Blomsterrör 24. 85	Citronpumpa 10. 29	Fenkol 8
Aster 14. 32. 45. 75	Blyerts-ceder 66. 71	Citronträd 57	Fetknoppar
Astragalkaffe 6	Blyertsträd 66. 71	Coriander 8	Fetört 41. 53. 80. 96
Atlas-ceder 69	Blyrot 51. 95	Cymbalblomster 40	Fjellros 55. 69. 83
Aurikel 51	Blåklint 33	Cypergräs 27. 88	Fjetterskida 77
Avgatotråd 61	Blåklocka 33	Cypress 65. 70. 87. 99	Figurkurbits 10. 29
Axsvingel 27	Blåkunt 35	Daddelpalm 95. 99	Fikonkaktus 61. 94
Azalea 55. 69. 83	Blåluzern 12	Daggkäpa 76	Fikonträd 89
Backtörne 71. 74	Blåsippa 49. 91	Daggört 62	Fingerborgsblomster
Baldrian 33. 53	Blåskor 43. 76	Daglilja 49. 78	Fingergräs 27
Balsamin 18. 37	Blåsträd 69	Dahlia 48. 78. 90	Fingerört 51. 72. 79
Balsamgurka 30	Blåtåtel 27	Dampelsblomster	Finnbär 71
Balsampoppel 72	Bohvene 13. 41. 51. 79	Darrax 27	Fioringräs 11
Balsamtall 66. 71	Bok 70	Darrgräs 11. 27	Fjädergräs 27. 28. 80
Bambusrör 23. 84	Bokharaklöfver 12	Deodoraceder 69	Fjäderkål 3. 24
Bananas 62. 93	Bolmört 49. 78	Dill 8	Fjäderneglika 47. 77
Bandblomster 79. 92	Bondbönor 6	Diptam 47	Flambomster 28. 51
Bandgräs 79	Bondros 51. 79	Dragon 8	Flaskkurbits 10. 29
Bandpalm 88	Borettsch 8	Drakblodträd	Flaskträd 55
Basilika 8. 40	Borstneglika 19. 77	Druhufvud 58. 88. 99	Flikrefva 29
Bastard-löfkoja 17	Bourbonpalm 91	Druffläder 35. 47. 77	Flipkrage 37. 49
Batrams-ört 52. 80	Boört 80. 97	Dubbelfrukt 73	Flockblomster 48. 89
Becktall 66	Brockoli 3	Dvergaster 51	Flocklilja 55. 82
Begonia 55	Brudspira 53. 73. 80	Dverbalsamin 17	Flugblomster 37. 49. 92
Bened 70. 89	Brunskära 32	Dvergfur 66. 72	Flugfälla 44
Benzointråd 60	Brüsselkål 3	Dverggranat 62	Fläckblomster 42
	Brännpalm 85		Fläder 73

	Sidan.		Sidan.		Sidan.		Sidan.
Foderbetor	13	Hafslök	80. 96	Ibsblomster	37. 60. 91	Klockblomster	33. 46. 77
Foderkål	13	Hafstörne	71	Idegran	66. 73	Klotamarant	36
Fodermörötter	13	Hagtorn	70: 74	Igelaster	15	Klotaster	14
Foderpalsternackor	13	Hallon	68. 72	Igelkaktus	58. 89	Klottistel	48
Foderrofvor	12	Hammarbuske	57	Inkarnatklöfver	12	Kloarter	45
Frumynta	23	Hampa	13. 24	Indiansk krasse	8	Klätt	31. 44
Fur	66. 71	Handblomster	38	Indigobuske	60. 68	Klöfver	13. 42
Fågelhufvud	94	Harklöfver	5. 40. 94	Ingefära	83	Knölbafre	11
Fågelmjölk	79	Harsvans	27	Isop	8. 31	Kokardaster	15
Fågelört	95	Hartimjan	46	Isplanta 7. 39. 61. 93	93	Kokospalm	87
Färrapunzel	49	Hassel	68. 70	Italiensk pinie	66	Kolfhirs	15
Färsvingel	11	Hasselört	77	Jacobsblomster	18	Korallträd	59. 89
Förgätmigej 35. 50. 77	77	Heliotrop	59. 91	Jasmin	91	Korgpil	73
Gamander	63	Herkulesklubba	10. 29	Jernek	71	Korkalm	74
Gemsrot	47. 77	Herkulesört	25. 78	Jernört	42. 63. 97	Korn	27
Georgin	48. 85. 90	Hjelmört	52. 80. 96	Jobstärar	27	Kornblomster	33
Getnos	52. 80. 96	Himalja-ceder	69	Jordbröd	58. 87	Kornell	70
Gigelsärter	12. 60	Himmelsros	31	Jordmandel	5	Koronill	70. 87
Ginkoträd	71	Hjorttunga	96	Jordpalm	90	Korsblad	46. 77
Ginstbuske	59. 71. 90	Hirs	13. 25. 27. 94	Jordpärm	5	Korskansansk fur	72
Gipsblomster	36. 48. 78	Honungsblomster	25. 40. 93	Jordärtskockor	5	Kransblomster	59. 91
Glis	45	Honungsklöfver	12	Judä silfverpenn	50	Kraftrot	61
Gossen i det gröna	31. 44. 76	Hornbuske	70	Judekörs	40	Krasse	8. 30. 97
Gran	65. 68. 74	Hortensia	71	Jungfrun i det gröna	39	Krepe	35
Granatäpple	62	Hufvudkål	3	Jungfrulin	95	Kronärtskockor	6
Grekisk fur	65	Hufvudsallad	7	Jungfrumariösko	43. 76	Krusbär	67. 72
Grekiskt hö	12	Humleklöfver	12	Jungfruskört	34	Kruskål	3
Groblad	13	Hundexing	11	Jungfruvin	28. 69	Krustätel	11
Gräal	68	Hundrofvä	28. 77	Jupitersblomster	44	Kryddträd	69
Gråbo	23. 83	Hundtand	78	Jättebalsamin	37	Krypbönor	6
Gråddrä	44. 76	Hundtunga	35. 46. 77	Jättegröe	12	Kryphven	11
Gråttätel	11	Husarknopp	42	Jätte-melon-pumpa	10. 29	Kräftbuske	87
Gräskar	10. 29	Hven	11. 26. 27	Jätterör	27. 83	Kummin	8. 13
Gräslilja	53	Hvit-ceder	65. 69	Kabbalök	77	Kungsljus	53. 80
Gräslök	9. 68	Hvitgröe	12	Kaffeträd	57. 94	Kurbits	10. 29
Gräsneglika	45. 53. 71	Hvitthven	11	Kakaomalva	54	Kyndel	8
Gröe	12. 27. 28	Hvitklöfver	12	Kaktus	56	Käl	3. 13. 24
Guajavaträd	62	Hvitkål	3	Kalflecka	77	Kälask	71
Gudsblomster	47. 77. 88	Hvitlök	9	Kalmia	71	Kälrabbi	3
Gudsgäfva	47. 77. 88	Hyacinth	78	Kamexing	11	Kälrofvor	3. 13
Guldblomster	33	Hårdsvingel	11	Kamfrö	30. 92	Kälrötter	3. 13
Guldhufvud	34	Hårgriffel	30	Kamäfva	35	Källarhalsbuske	70
Guldmalva	44	Hårgrä	27	Kanfärdsträd	94	Käringkruka	76
Guldris	53. 80	Hårgurka	30	Kanadapoppel	72	Käringtänder	12
Guldsvans	27	Hårhven	11	Kanariefrö	12	Kärleksblomster	39
Guldträd	69	Hårkalk	56	Kapuzinerkrasse	8	Kärleksgräs	27
Gulhafre	11	Hägg	72	Kassiatråd	56	Kärleksäpple	8. 38
Gulrefva	30	Hängalm	74	Kasaraträd	56. 85	Körvel	8
Gullregn	70. 88	Hängask	70	Kastanje	67. 68. 85	Körvelrofvor	4
Gullvifva	51. 80. 95	Hängbjörk	69	Kattost	38. 50. 60. 79. 92	Körsbär	14. 67. 72
Gummiträd	90	Hängbok	71	Kattört	97	Lackviol	86
Gurka	9. 10. 29	Hängpoppel	72	Kejsarkrona	48	Lager	60. 91. 92
Gurkört	8	Hästkastanje	68	Kejsar-löfkoja	17	Lambertsfur	66
Gyckelblomster	29. 93	Hökblomster	49. 78	Kejsarmössa	10. 29	Lambertnötter	68
Gyllenlack	18. 75. 86	Höll	62	Kinesisk neglika	20	Lävalend	8
Gäsfot	25	Höstgröe	12	Klarkia	34. 76	Lefverbalsam	31
Gäsört	45	Höstklocka	48. 78	Klibbal	68	Lefverört	80
Gökmat	40	Höst-löfkoja	17	Klibbför	95	Lejonblad	49
Göskälla	44	Höstsyren	51. 79	Klint	24. 33. 46	Lejongap	18. 44. 75
Hafre	27	Hör	37. 50. 60			Lejontand	8
Hafrerötter	4					Libanons-ceder	65. 69

	Sidan.		Sidan.		Sidan.		Sidan.
Licualapalm	92. 99	Månfrö	30	Pilgrimsflaska	29	Rosenblomster	41
Lifstråd	66. 73. 75	Månviol	50	Pimperört	73	Rosenböna	6
Liguster	71. 75	Märgärter	5	Pimpinella	8	Rosenklädning	62
Lilja	60. 78. 92	Nakna Jungfrun	46. 77	Pingstlilja	79	Rosenkål	3
Liljekonvalje	46. 77	Narciss	79	Pinie	66	Rosentry	71
Limon	57	Nattens drottning	56	Pion	51. 71. 79	Rosmarin	9
Lin.	13. 37. 50. 60	Nattljus	40. 50. 79	Pion-aster	15	Rotabagga	4. 13
Lind.	74. 75	Nattviol	49. 78	Piplblomster	69. 76. 88	Rotpersilja	4
Linsner	6	Neglika	18. 35. 47. 77	Pisang	61. 93	Rotselleri	4
Ljung	58. 89	Nejlikrot	48	Plommon	14. 67. 72	Runkelrofva	13
Lobelia	38. 76	Nerium	61	Plymbblomster	63	Rädiser	4
Losta	11. 27	New-Jerseyfur	66. 72	Pommerans	57	Räfböna	53
Luddhafre	11	Nysrot	49. 75	Pompon-aster	16	Rättika	12
Luddtåtel	11	Nyzeelandslin	61. 95. 99	Poppel	72	Räfmjök	35
Luftblomster	82	Nyzeeländsk spenat	7	Poppelros	25. 37. 91	Räfsvans	23. 32
Lukeraurikel	51	Nål-aster	15	Porslinsblomster	91	Rätklor	4
Luktgräs	12	Näfverlönn	68	Portlak	7. 19	Rödbetor	4. 5
Luktviol	54	Nässla	97	Potatis	5	Rödklöfver	12
Lumner	92. 96	Obeliskblomster	40. 50	Potatislök	9	Rödlök	9
Lundgröe	12	Oleanderbuske	66. 94	Prairiegräs	25. 90	Rödrefva	29
Lupin	13. 38. 50	Oljetråd	94	Praktax	56	Rödsvingel	11
Luzern	13. 93	Oliftråd	94	Praktbuske	56	Rölleka	43. 76
Lyncosfur	66	Ontariopoppel	72	Praktlilja	90	Rönn	73
Lysing	50	Orange	57	Praktmalva	38	Rör	27. 83
Lådertråd	72	Original-aster	16	Praktmössa	25. 85. 89	Röraster	14
Lärktråd	66. 72	Ormbunke	64. 98	Praktvicka	34. 57. 87	Rörflen	11. 79
Lötkoja	16. 33. 39. 76	Ormhufvud	35	Prestkrage	33. 57. 86	Sabalpalm	96
Lök	9. 44. 76	Ormlök	44. 76	Presttråd	86	Sabelärter	5
Lönn	68. 75	Ormgurka	10. 30	Prophetgurka	29	Saffran	77
Maderalager	61	Ormlök	35	Prustrot	49. 78	Sagopalm	87. 99
Madra	32	Ormlök	44. 76	Pumpa	10. 29	Sallad	7
Majnyckel	51. 62. 80. 95	Ormröt	42. 53. 62	Punktilja	59	Saltbuske	71
Majs	13. 26. 76	Ornmört	93	Purjolök	9	Salvia	9. 26. 41. 52.
Malva	8. 76	Ormsbjörk	69	Pyramidal	74	Sammetsblomster	21
Malört	83. 2. 83	Oxbär	70	Pyramidpoppel	72	Sandelm	27
Mammouthtråd	74	Oxel	73	Pyrenéefur	66	Sandlilja	44. 76
Mandarinorange	57	Oxlagga	80	Päsklilja	79	Sandluzern	12
Mandel	69	Oxtunga	44	Päron	14. 67. 72.	Sandneglika	47. 77. 83
Mangold	7. 24	Oxöga	45	Qvesved	73	Sandrör	11
Mannagräs	11	Paddbär	44	Qvitten	70	Sandtörne	71
Manskraft	48	Palmilja	63. 98	Qvinoa	7	Savoykål	3
Marieklocka	46	Palsternacka	4. 13	Ranunkel	52. 80	Schallottlök	9
Maskros	8	Pampasgräs	25. 90	Ranunkel-buske	70	Schersmin	71
Matrhobarber	6. 25. 68	Pappersblomster	43	Ranunkel-vallmo	23	Senap	9. 13
Mell	7. 23	Pappersgräs	88	Rapontika	5	Sensitiv	39
Mejram	8	Pappersväxt	88	Rapunzel	5	Seradella	13
Melon	10	Passionsblomster	94	Rapunzelselleri	5	Silén	41. 53.
Melontråd	56	Patientia	7	Rasselblomster	46. 85	Silfveral	75
Mispel	71	Pelargon	61. 94	Raygräs	11	Silfverbuske	70
Mjuklosta	11	Pensé	21	Remontantros	75	Silfvergran	66. 71.
Mjölke	77	Pepparväxt	95	Regnvisaren	33	Silfverlönn	68
Molla	7. 23	Perlgäs	11. 28	Reseda	41	Silfverpoppel	72
Morot	4. 13	Perlhyaecinth	79	Rhabarber	6. 25. 68. 80	Silfvertråd	62. 96
Monke	49	Persika	67	Riddarsporre	20. 35. 47. 77	Sippa	44. 46. 78. 91
Mossros	75	Persilja	8	Rigsfur	66	Sitsblomster	41
Moutanpion	51. 71. 79	Persiljefläder	73	Ringblomster	33	Skallerskida	58
Munklöss	46	Peruktråd	72	Rockamboll	9	Skarlakanmalva	40
Murgreña	71. 99	Pestrot	79	Rofvor	4. 12	Skarletpelargon	7
Muskblomster	39. 93	Petunia	19. 76	Ros	75	Skogsklöfver	68. 102
Musmat	61	Phytolak	7	Rosen-aster	15	Skogsrefva	28. 69. 86
Mynta	79	Piasabapalm	98	Rosen-balsamin	18		
Myrten	61. 93	Pil	72				

	Sidan.		Sidan.		Sidan.		Sidan.
Skogstulpan	53	Spinat	7. 32	Tall	66. 71. 78	Venussko	88
Skogsårta 40. 51. 79		Spindelträd	70. 89	Tamarind	63	Venuspegel	30
Skorzonera	4	Spiralfrukt	98	Theros	75	Venusvagn	51. 79
Skriftblomster	36	Spiralpalm	94	Thimotej	12	Verbena	42. 96
Skrufpalm	99	Springurka	39	Thrinaspalm. 97. 99		Vicka	42
Skålblomster	30	Spritärter	5	Thunbergia	30	Victoria-aster	15
Skägg-gräs	27	Stenbräcka 52. 80. 96		Tidlösa	46. 77	Vide	72
Skärmrefva	30	Stenlind	71	Tigerlilja	89	Vildvin	28. 69
Sköldblomster 46. 77. 83		Stenört	44. 76	Timjan	9	Vinbär	67. 72
Skönhetsöga	33	Stjernblomster 32. 45		Tjärblomster 42. 50. 79		Vinda	34. 57
Slottergröe	12	Stjernfloka	45. 77	Tobak	14. 25	Vindrufva	31. 67
Smultron	68	Stjernfur	66	Toffelblomster 32. 56. 85		Vinruta	9
Smultronspinat	32	Stinknäsla	26	Trift	45	Vintergröna	81
Smultronträd	55	Stjufmorsblomster		Trollbär	26. 42. 62. 73. 97	Vinterkrasse	48
Smörblomster 52. 80		Stockros 21. 31. 44. 76		Troll-lök	44	Vinterlöfkoja	18. 76
Snabellilja	87	Storknäbb	78	Trumpetblomster		Vinterlök	9
Snittsallad	7	Stormhatt	43. 76	Try	22. 38. 55. 69. 84	Vintersallad	8
Snöboll	63. 74. 83	Strandfur	72	Tuberos	71. 75	Vinterspenat	7
Snöbär	73. 75	Strandhafre	11	Tubrefva	95	Verginia-ceder	71
Snödroppe	78	Strandkål	6. 46	Tuftåtel	30	Virsing	3
Snöpäron	72	Strandlöfkoja	33	Tulpan	53. 80	Viol	54. 76. 81
Socketbetor	13	Strandvallmo	48	Tupphufvud	11	Vårbrodd	11. 26
Sockethirs	13. 25	Stråsblomster. 36. 59		Tuppkam	49	Värtkaktus	92
Socketlönn	68	Strålgräs	27	Turban-aster.	22. 75	Vägtörne	72. 75
Socketpalm	83	Strutbräken	97	Turbanpumpa 10. 29		Vägvårda	51
Sockerrör	96. 92	Studentneglika		Turkiskt hvete	15	Välska bönor	6
Sockerrötter	4	Stångböna	5	Turnips	12	Vändelrot	53. 80
Sockerärter	5	Sumakträd	72	Tusensköna	26	Zellernötter	68
Solfjäderpalm		Sumpblomster	37	Tårgräs	45. 77	Zerbelnötter	66
87. 92. 99		Surtörne 55. 69. 84. 91		Tätel	27	Zinna. 22. 23. 43. 76	
Solros 13. 25. 36. 49		Svalrot	45. 55. 77	Törnros	11. 27	Åkerhirs	27. 48
Solsicka	30	Svartpoppel	72	Ullgräs	72. 81	Åkerkrans	31. 44
Solvän	37	Svartrot	80	Ulltistel	25. 28	Åkerkulla	32
Solvända	49	Svensk kaffe	6	Underblomster 22. 39		Åkersallad	8
Solvändare	36	Svensk turnips	12	Underträd	25	Ålandsrot	25. 49
Sommarendivie	7	Svingel	11. 26	Uruccarpalm	22. 39	Äggplanta	42
Sommarlöfkoja 16. 76		Svärdslilja 49. 78. 91		Vallmo	26. 76	Äkta kastanje	67
Spaltblad	41	Sykomorlönn	68	Valparaisopumpa	98	Ångboll	80
Spaltblomster	41	Syra	7. 26	14. 22. 40. 51		Ånggröe	12
Spaltrefva	28	Syrén	73. 75	Vargböna 38. 50. 79.		Ångskafle	11
Spansk cardy	6	Säpört	41. 80	Vargmjölk	35. 89	Ångsruota	50. 80
Spansk peppar 9. 33		Säfsvindel	11	Vattengröe	12	Ångsvingel	11
Spansk syra	7	Säfvenbom	66. 71	Vattenmelon	10	Ångsvädd	41. 52
Sparris	6. 68	Säl	72	Vaxblomster	33	Äpple	14. 67. 72
Sparrisålar	3	Söderhafsmyrten 60. 92		Weichsel	72	Ärenpris	
Sparrisärter	5	Sötblomster	39	Weimuthstall	66. 72	42. 53. 63. 80. 97	
Spergel	13. 53	Taggbräken	83	Venusblomster	79	Ärtblomster 22. 29. 70	
Spetsblomster	55	Taggvallmo	32	Venusblomster	82	Ärtträd	58. 69. 75
Spetssvans	40	Taklök	62	Venusblomster	82	Österriskisk fur	66
Spikklubba	35. 58						





Rosen-Aster.

3 K 4.



Zinnia Haageana fl. pl.

Koenig-Aster