

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.  
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.  
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.  
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.





# TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE.

Redigerad af Erik Lindgren och Georg Löwegren.

N<sup>o</sup> 9.

September 1870.

9:de årg.

Af denna tidning, som uteslutande sysselsätter sig med till trädgårdsodlingen hörande ämnen, utkommer ett nummer i hvarje månad. — Prenumerationspriset är för helt år, såväl å postkontoren och i bokhandeln, som hos redaktionen, två riksdaler riksmünt. — Bref till tidningen adresseras: *Tidning för trädgårdsodlare, Stockholm.*

## Redogörelse för försöksodlingen af matväxter vid Kongl. Landtbruksakademiens experimentalfält 1865.

(Ur den öfver verksamheten vid Experimentalfältet nyligen utgifna berättelsen.)

(Slut fr. nr 8.)

Af stångbönor odlades:	Blommade	Matnyttiga	Mognad
Nya jätte socker svärds-	2 aug.	23 aug.	mognade ej.
Turkische Erbsen . . .	3 »	2 sept.	» »
Hvita socker perl- . . .	1 »	8 »	» »
Rosenbönor . . . . .	20 juli	23 aug.	» »
Genomskinliga vaxmed svarta frön och gula skidor . . . . .	3 aug.	2 sept.	» »
Ordinära svärds- . . .	2 »	22 aug.	» »

Alla dessa sorter voro från Göteborgs trädgårdsförening.

Till smaken voro de genomskinliga s. k. vaxmed gula skidor de bästa. De ordinära åter voro de som buro rikast, och torde därför dessa sorter företrädesvis förtjena odlas. För öfrigt uppnådde ingen sort någon betydligare utveckling, hvadan afkastningen blef af alla ringa; mognad uppnådde ingen sort. De såddes på bänk i slutet af maj och utplanterades på kalljord den 5 juni.

Af krypbönor odlades följande sorter, hvilka alla lades på kalljord den 24 maj.

Yellow sixweeks från Reeves & C:o i Newyork . . . . .	Blommade	Mognade
Hvita tidiga svärds- . . . . .	18 juli.	10 sept.
Tidiga gula . . . . .	27 »	mognade ej.
» hvita . . . . .	22 »	19 sept.
» hvita . . . . .	24 »	mognade ej.
Rödfläckiga . . . . .	21 »	19 sept.
Svarta . . . . .	22 »	19 »
Hvita tidiga perl- . . . . .	28 »	mognade ej.
Tusen för engula . . . . .	21 »	10 okt.
» » hvita . . . . .	9 aug.	mognade ej.
Flageolet . . . . .	24 juli.	10 okt.

Med undantag af den förstnämnda voro alla från Göteborgs trädgårdsförening. Denna förstnämnda sort mognade fullkomligt, hvaremot hos alla de öfriga, för hvilka finnes uppgifvet att de mognade, detta var ofullständigt. Den värdefullaste för våra förhållanden var följaktligen *yellow sixweeks beans*. Den odlades äfven 1864 jemte bruna bönor och åtskilliga andra sorter, hvaraf då icke heller någon annan sort än denna uppnådde någon fullkomligare mognad. Sorten har

båda åren burit rikt, och bönorna äro mycket lika vanliga bruna bönor, ehuru något litet mindre. Krypsvärdsbönorna, hvilkas användning är lika med svärdsstångbönor, hade matnyttiga skidor den 18 augusti, och torde sorten förtjena odlas för att man under ogynnsamma år icke må alldeles gå miste om skärbönor, ty ehuru denna sort lades direkte på kalljord, lemnade den dock förr skörd än stångbönorna, oaktadt dessa voro uppdragna på bänk.

*Wälska bönor.*

Följande sorter från Sutton and Son i Reading såddes den 4 maj å mager och torr jord.

	Blommade	Matnyttiga	Skördades	Höjd
Beeks green Gem	26 juni.	20 juli.	5 sept.	1 fot.
Broad Windsor . . . . .	25 »	22 »	5 »	3½ »
Monarch . . . . .	24 »	24 »	5 »	3 »
Green Windsor . . . . .	24 »	22 »	5 »	3 »
Royal Cluster . . . . .	26 »	21 »	5 »	1 »
Scarlet blossom . . . . .	25 »	26 »	5 »	3 »

Mazagan från Tjäd-

ders fröhandel 27 » 21 » 5 » 1 »  
Följande sorter från Göteborgs trädgårdsförening utsåddes på ett annat, något bördigare jordstycke d. 13 maj:

	Blommade	Matnyttiga	Skördades	Höjd
Red blossom . . . . .	3 juli.	26 juli.	27 sept.	3¼ fot.
Johnstons wonderful	2 »	25 »	27 »	4 »
Cluster . . . . .	5 »	28 »	27 »	1 »
Engelska Windsor, gröna . . . . .	2 »	29 »	27 »	4 »
Mazagan . . . . .	4 »	27 »	27 »	1 »
Ordinära . . . . .	1 »	24 »	27 »	4 »

Till smaken tycktes green Windsor vara den bästa och dernäst den hvita Windsorbönan. Öfverhufvud voro de högväxta sorterna bättre till smaken än de lågväxta. I afseende på bördigheten voro windsorbönorna sämst; de lågväxta voro bördigast och dernäst den sorten, som förekommer under benämningen ordinära. Någon skillnad mellan Cluster- och Mazaganbönorna kunde icke upptäckas; också visade de i båda försöken en märklig likhet i afseende på tidigheten. Scarlet eller red blossom hade vackra röda blommor.



Af sallat odlades följande 4 sorter från Reervers & C:o i Newyork:

Brown Dutch.  
Cabbage.  
Frankfurt Head.  
Curled Lettuce.

Deraf voro Brown Dutch- och Curled Lettuce de bästa.

Af frö från Göteborgs trädgårdsförening odlades följande sorter sallat:

Stor gul asiatisk.	Jätte-Mogul.
» » berliner.	Imperial.
Tidig gul Steinkopf.	Broy geel.
Schwedenkopf.	Lactuca discephala.
Brun harlemer.	Laktuk eller snittsallat.
Blodforelle.	Sparrissallat.
Gul Mogul.	Paris Coss.

Bath Coss.

Endivien, grön bredbladig casseler.

» gul.

Af *hufvudsallat* syntes gul asiatisk, gul berliner, gul Steinkopf, imperial, broy geel och jättemogul vara de bästa sorterna. Den vanliga Laktuk- eller snittsallatsorten visade sig till följe af dess snabba växt såsom den bästa för tidigt behof, äfvensom för vinterbehof, under denna tid sådd i lådor eller fat. Endivien gånvo litet men utmärkt vackra och rätt goda blad; synnerligast var detta fallet med den gula sorten. Bath Coss och Paris Coss Lettuce voro utmärkta bindsallatsorter. På dessa sorter måste de yttre bladen sammanbindas upptill, för att få de inre bladen blekta; deraf kommer namnet bindsallat.

Af *rädisor* odlades:

Turnip Radish	} från Reervers & C:o i Newyork.
Long scarlet	
Runda röda	} från Göteborgs trädgårdsförening.
» violetta	
» hvita	
» gula	
Långa rosenröda glas-	}
» hvita	
Woods superb frame	

Turnip radish från Amerika öfverträffade alla de andra sorterna i tidighet; hade derjemte vacker form och färg samt god smak. Sådd på drifbänk den 13 mars var den färdig redan den 4 april, således på den korta tiden af 22 dagar; de vanliga månadsrädisorna blefvo färdiga först 8 dagar senare. Den violetta rädisan skiljde sig från den röda runda till utseendet blott genom färgen, hvarjemte den var något senare. Den gula runda rädisan hade vacker form och en något starkare smak än de öfrige. Den långa rosenröda glasrädisan var utmärkt god, kunde bli temligen stor utan att förlora i välsmaklighet eller fasthet och förtjenar odlas mera allmänt än hittills är fallet. Woods superb frame skiljde sig nästan endast genom en mörkare röd färg, från föreg. och befanns vara alldeles samma sort som Long scarlet radish från America. Den långa hvita

rädisan var en dålig sort, som icke förtjenar att odlas.

*Gurkor.* — Följande sorter odlades på drifbänk:

Long green cucumber	} från Reervers & C:o.
White spine »	
Victory of Bath,	från Tjäder.

Grön kinesisk slanggurka, från Göteborgs trädgårdsförening.

Egyptisk kungsgurka } odlade af förf. sedan  
Cucumis semperfructifera } flere år tillbaka.

White spine var den mest välsmakande af alla, men icke bördig. Den egyptiska s. k. kungsgurkan var den största och vackraste af alla. Long green var den bördigaste och Cucumis semperfructifera den tidigaste. De båda andra voro äfven utmärkta sorter för bänk.

På varm list försöktes följande gurksorter, hvilka såddes på bänk den 20 maj och utplanterades på list den 29 s. m.:

Tidig drufgurka, gaf frukt \*) den 29 juli; bekant sort.

Cucumis semperfructifera, gaf rikt m. frukt d. 9 aug.

Tidiga rikbärande drif-	} hunno icke utbilda några frukter.
Walkers Travello	
Non plus ultra	

Arnstädter ljusgröna

Cuthills black spine gaf frukt den 22 aug.; gröna frukter; en förträfflig sort.

Långa hvita slang- gaf frukt d. 8. aug., frukterna blefvo små, missbildade och oansenliga, och visade sig således sorten icke lämplig för list.

Victory of Bath gaf frukt d. 9 aug., stora vackra frukter; bar teml. rikt.

Gladiator; frukterna hunno icke utbilda sig.

Långa gröna slang, gaf frukt d. 4 aug.; syntes mycket lämplig för list.

Snows hortikultural, frukterna hunno icke utbilda sig.

Allmän grön gurka, gaf frukt d. 14 aug.; bar rikt.

White spine cucumber; frukterna hunno ej utbilda sig.

Long green cucumber, gaf frukt d. 16 aug.; bar rikt med stora, gröna, vackra frukter.

Med undantag af de två sistnämnda, som voro från Reervers & C:o, voro samtliga från Göteborgs trädgårdsförening. Som det synes af ofvanstående voro somliga sorter alldeles olämpliga för list. Utrymmet medgaf icke heller att försöka alla sorterna på bänk.

Af *spenat* odlades:

Gaudry-Savoy-	} från Göteborgs trädgårdsförening.
Med spetsiga frön	
Med runda frön	
d:o d:o	från Tjäder.

Som jorden der de såddes var mycket starkt gödslad, blefvo alla sorterna mycket frodväxta. Gaudryspenaten hade de tjockaste, savoyspena-

\*) Med orden »gaf frukt», som här begagnas, menas alltid att sorten börjat ge frukt, eller att de första frukterna afplockades den angifna dagen.



ten samt den sort som erhållits från Tjäder de största bladen.

Af tobak odlades:

Cuba.

Havanna.

Salonichi.

Ordinär tjockbladig. Alla från Göteborgsträdgårdsförening.

Den förstnämnde hade långa spetsiga blad, men som icke blefvo synnerligt stora. De två efterföljande hade större och bredare blad, och tycktes företrädet i detta afseende tillkomma havannatobaken. Ordinär tjockbladig var en ytterst dålig sort, som knappt liknade tobak och som vid förbränning icke en gång luktade likt sådan.

Utom dessa här ofvan nämnda sorter odlades ett icke ringa antal andra, såväl allmänne som sällsyntare köks- och ekonomiväxter. Förbi-gående de allra allmännaste, såsom mejram, timjan, dill m. fl. samt sådana, hvilka såsom trädgårdsväxter betraktade icke kunna vara förtjenta af ringaste uppmärksamhet, såsom libsticka, krusmalva, malört, pimpinella (Porterium sanguisorba) m. fl. d. lemnas här redogörelse för några.

Mangold gaf högst rikligt med blad, och hvilka vid försök att anrättas såsom spenat lemnade en rätt duglig sådan, visserligen icke så god som vanlig, men dock bättre än den s. k. vinterspenaten (Rumex patientia). Anses således kunna utgöra en god insats i hvarje tarfli-

gare hushåll, helst den ger ymnigt med blad äfven under den tid, då den vanliga spenaten vanligen icke finnes att tillgå.

Sparrisarter (Lotus tetragonolobus eller Tetragonolobus siliquosus) gaf rik skörd och skidorna, tillagade och använda såsom sparris, befunnos vara utmärkt goda. Anses förtjena allmänne odling än f. n. är fallet.

Jordmandel (Cyperus esculentus) fick blott några få små rotknölar af något öfver en ärtas storlek under hvarje stånd. Dessa små rotknölar må nu ha hvilka egenskaper som helst, så ger växten i alla fall så ringa afkastning, att den alldeles icke förtjenar att odlas.

Svenskt kaffe (Astragalus boeticus) är en liten växt med små skidor, innehållande små bönor och icke att förväxla med lupiner, som äfven stundom odlas under namn af svenskt kaffe. Här nämnes blott, att fröen visserligen mognade med lätthet, men att de använda såsom kaffe hade en allt annat än angenäm smak och följaktligen icke förtjena att odlas.

Scorzonerä. Ehuru denna växt är allmänt bekant, upptages hon dock här för att få tillfälle nämna, att rötterna stufvade äro utmärkt goda och att den derföre förtjenar odlas i hvarje trädgård.

Anis, körfvelrofvor, angelica, sockerrötter (Sium Sisarum), cochlearia, japanska kardborrar och fenkål såddes men uppkommo ej.

## Urval af träd och buskar för fritt land.

(Forts. fr. nr 8.)

**Cytisus, L.**, bönträd, bönbuske, guldregn. — *C. alpinus*, Mill., alpguldregn, Skottland, Frankrike, Ungern, 10—15 fot hög, med vackra blad och vackra, gula blommor i långa hängande klasar. En praktfull art. Affryser i ungdomen stundom rätt betydligt vid Stockholm. Passar endast för södra och mellersta Sverige. — *C. capitatus*, Jacq., Österrike etc., 3—5 fot, med talrika gula blommor i toppen af grenarne. Härdig och passande för de norra orterna. — *C. elongatus*, W. & K., Ungern, 3—6 fot, med talrika gula blommor. En vacker, mycket härdig art. — *C. Laburnum*, L., äkta guldregn, södra Eur., 10—15 fot hög. Är mycket lik *C. alpinus*, men visar sig vara ännu ömtåligare än denna. Passar endast för södra och mell. Sverige. — *C. nigricans*, L., Tyskland etc., 2—3 fot hög, med vackra mörkgula blommor i juli—oktober. — *C. purpureus*, Scop., södra Europa, låg,  $\frac{1}{2}$ —1 fot med vackra, röda blommor. Något öm; passar endast för södra och mell. Sverige. — *C. sessilifolius*, L., södra Eur., 3—5 fot. En fin, utmärkt vacker art med gula blommor; en bland de allra vackraste i hela släktet, men något öm vid Stockholm. Passar endast för södra och mell. Sverige. — *C. supinus*, L., Sibirien, Tyskland etc., 2—3 fot hög, med ljusgula blommor. Mycket härdig.

Dessa äro de arter af detta slägte som vi anse i första rummet förtjena odlas. En sort som erhållits till Landtbruks-akademiens experimentalfält under namn af *Cytisus Alschingerii* (skall rätteligen skrivas *Alschingeri*) förtjenar här särskildt nämnas. Det gifves visserligen en art med namnet *Alschingeri*, men beskrifningen på densamma passar icke in på den här ifrågasvarande, utan är detta sannolikt en form af *Cytisus alpinus*. Det är en högst praktfull sort, med mycket stora (småbladen 5—6 tum långa, 3—3  $\frac{1}{4}$  tum breda) blad och talrika, 2—3 fot långa rika blomklasor, ofta slutande i en liten bladrossett. Enligt flera års iakttagelser å Landtbruks-akademiens experimentalfält är denna sort vida härdigare än *alpinus* och *Laburnum* och den förtjenar derföre den vidsträcktaste spridning. Möjligen är det denna varietet, (art är det näml. ej) som under namn af *grandiflorum* räknas till *C. Laburnum*, vi anse dock att den hör till *alpinus* och ämna tillsvidare ändra det med säkerhet oriktiga namnet *Alschingeri* till *C. alpinus grandiflorum*.

Hithörande arter förtjena plats i hvarje trädgårdsanläggning och i synnerhet äro de af oskattbart värde derföre att de trifvas i torr, mager,



sand- och grusjord, der föga annat kan växa. — Bönorna af åtskilliga arter lära vara giftiga.

**Daphne**, *L.* tibast, källersals. — *D. Mezereum*, *L.*, Sverige, 2—3 fot hög. En bland de praktfullaste buskväxter som odlas. Är mycket tidigt på våren, innan flertalet andra buskväxter ännu börjat visa tecken till växtlighet, alldeles öfverklädd med vackra, röda, väluktande blommor. Får längre fram på sommaren talrika vackra, röda bär, hvilka dock skola vara ytterst giftiga och af denna orsak varnas stundom för dess odling. Vi ha dock aldrig hört omtalas att någon förgiftning genom dessa bär förekommit, troligen därför att de ha en obehaglig skarp smak, och att t. ex. barn som skulle vara frestade att smaka dem, af denna orsak säkert genast afstå derifrån innan någon skada skett och vi tro därför att denna buske utan fara kan odlas. Trifves i all jordmån, men blir kraftigast och vackrast i kraftig, ej för torr lerjord.

**Deutzia**, *Thunb.* — *D. crenata*, *S. & Z.* (*D. scabra*, *Thunb. hort?*) Japan, 5—8 fot. En vacker buske med hvita blommor. Passar endast för södra och mellersta Sverige. Odlas allmänt under namn af *Deutzia scabra*, ett namn som är särdeles passande, emedan bladen äro mycket sträfva för känseln. I Regels Gartenflora (se Tidning för trädgårdsodlare 1867, sid. 64) uppgifves med anledning af den då nyligen i handeln under namn af *Deutzia crenata fl. pl.* förekommande utmärkt vackra varieteterna här af med dubbla blommor, att *Deutzia crenata* ännu icke var införd i europeisk kultur, utan att den här nämnda varieteterna således skulle heta *D. scabra fl. pl.* Nu upplyser åter professor Kock att *Deutzia scabra* alldeles icke förefinnes i odling, utan att det är *D. crenata*, som går under detta namn. Hvem af dessa skall man emellertid tro? — *D. gracilis*, *S. & Z.* (*D. gracilis vera*, *hort.*), Japan, 1—3 fot hög. En utmärkt vacker blomsterbuske, med talrika hvita blommor under sommaren. Passar endast för södra och mellersta Sverige.

Fordra varmt läge och varm, näringsrik jordmån och böra, så framt de skola komma att blomna rikt, täckas under vintern med gran- eller tallris. — Till drifning i kruka är *D. gracilis* en bland de allra bästa buskväxter.

**Diervilla**, *Mill.* — *D. canadensis*, *Willd.*, Kanada, 2—3 fot hög, med talrika gula blommor. Visar sig mycket hårdig och föga nogräknad på jordmån.

**Elaeagnus**, *L.*, silfverbuske, oleaster. — *E. macrophylla*, *Thunb.* (*E. latifolia*, *Spr.*, *E. argentea*, *hort.*), Japan, 6—8 fot hög med vackra, silfverglänsande löf och små gula, väluktande blommor. En utmärkt vacker buske, som icke bör saknas i någon trädgårdsanläggning. Visar sig mycket hårdig, äfven långt upp i Norrland, enligt meddelanden derifrån.

Fortkommer i hvarje jordmån, ehuru en lätt, ej för torr jord är den bäst passande. — De öf-

riga arterna af detta slägte äro hvarken så vackra eller hårdiga, som den här upptagna.

**Evonymus**, *L.*, alster, spindelträd. — *E. europaea*, *L.*, Sverige etc., 6—10 fot hög. Blommorna små obetydliga, men fröen, hvaraf busken om hösten är alldeles fullsatt, äro inneslutna i lysande röda kapslar, hvilka slutligen öppna sig, då de gula fröen nedhånga och bidra till att göra denna buske till en bland parkens utmärktaste prydnader. Bladen antaga dessutom om hösten oftast en bjert röd färg, och då frukterna täfla i skönhet med de vackraste blommor, förtjenar denna buske att ymnigt användas i buskpartierna. Är mycket hårdig och synes vara föga nogräknad på jordmån. — *E. latifolia*, *Scop.* s. Eur., Schweiz etc., 6—10 fot hög. Vacker art med stora vackra löf och högröda frökapslar. — *E. nana*, *Bieb.* (*E. angustifolia*, *hort.*, *E. rosmarinifolia*, *hort.*), Kaukasus, låg, krypande, med smala, ständigt gröna blad. Utbreder sig temligen betydligt och är särdeles passande till s. k. fjellpartier, infattningar o. d. Frökapslarne äfven hos denna art lysande röda. Ympad på några fot höga stammar af *E. europaeus* bildar denna art små utmärkt vackra slokträd. — En hårdig, för vissa ändamål förträfflig art. Förtjent af uppmärksamhet äfven därför att den är en bland de få ständigt gröna buskväxter som fullkomligt uthärda hos oss. — *E. verrucosa*, *Scop.*, Österrike, Ungern, Ryssland etc., 4—6 fot. Liknar något *E. europaea*, men växer vida långsamare och har grenarne tätt besatta med mörka vårtor.

Trifvas i hvarje, icke allt för dålig jordmån. Alla här nämnda äro hårdiga.

**Fagus**, *L.*, bok. — *F. sylvatica*, *L.*, södra Sverige etc., 80—100 fot högt, ståtligt träd. Varieteter: *F. sylv. atropurpurea*, blodbok; vacker. Skada att svårigheten att fortplanta detta träd gör att det håller sig dyrt och lägger hinder i vägen för dess allmännare användande i parker. *F. sylv. laciniata* eller *asplenifolia*, flikbladig bok med flikade blad; ser egendomlig ut. *F. sylv. pendula* och *F. s. purpurea pendula*, ett par varieteter med hängande grenar, föga vackra och förtjena knappt odlas.

Boken trifves bäst i djup, sandblandad lerjord, är för öfrigt icke särdeles kinkig. Trifves bäst i ungdomen, om den åtnjuter skydd och en lätt beskuggning af andra träd. Är fullt hårdig vid Stockholm och anses kunna med framgång planteras betydligt nordligare, synnerligast om varma, skyddade platser väljas.

**Fraxinus**, *Lin.*, ask. — *F. alba*, *Bosc.* n. Am. 20—30 fot. — *Fr. americana*, *Willd.*, n. Am., 30—50 fot. — *F. cinerea*, *Bosc.*, n. Am. 20—30 fot. — *F. epiptera*, *Vahl.* n. Am. 20—40 fot. — *F. excelsior*, *L.*, vanlig ask, Sverige etc., 60—100 fot, är allmänt bekant. Varieteter: *asplenifolia* (*laciniata*), med flikade löf; *argentea*, med nästan helhvita löf, utmärkt vacker; *aurea*, med guld-gula årsskott, öm, passar endast för södra och



mellersta Sverige; *aurea pendula*, med gula års-kott och hängande grenar, öm såsom föregående; *crispa* (atrovirens, imbricata) en märklig och egendomlig form, med sammanträngda, svartgröna, krusiga blad, effektiv; *fol. argenteis variegatis*, med hvitfläckiga blad; *linearis*, med smala blad, egendomlig; *nana* (*nana globosa*), bildar en tät, klotrund buske af 10—15 fots höjd; *pendula*, hängask, allmänt bekant; *simplicifolia* (heterophylla, monophylla, integrifolia, diversifolia) enkelbladig ask, temligen bekant, vacker; *simplificifolia laciniata*, enkelbladig ask medflikade löf, m. fl. — *F. juglandifolia*, Lam., n. Am., 40—50 fot, storbladig vacker. *Fr. aucubaefolia*, hort. En utmärkt vacker sort med gulfläckiga löf räknas stundom såsom varietet af denna art. — *F. lentiscifolia*, Desf., (*F. lenscifolia pendula*, hort.) södra Eur., Spanien etc., 15—20 fot. En småbladig ömtålig art, hvars grenar utbreda sig och vanligen hänga något nedåt. Ympad på höga stammar får den därför namn af *F. lent. pendula*. Passar endast för södra Sverige. — *F. pubescens*, Walt. n. Am. 20—40 fot. Anses bättre än de öfriga trivas i sandjord.

Detta slägte förtjenar mycken uppmärksamhet för parkanläggningar. De amerikanska arterna och samtliga varieteter af *F. excelsior* äro särdeles vackra och skulle säkert en större grupp, bildad ensamt af ask i åtskilliga arter och afarter, komma att göra god effekt. Fordra god lerdjord.

**Genista**, *L.*, ginst. — *G. anglica*, *L.*, England, Tyskland, Danmark. — *G. germanica*, *L.* södra Sverige. — *G. pilosa*, *L.* sydliga delarne af Sverige. — *G. tinctoria*, *L.* södra Sverige. Alla dessa äro låga buskar med vackra gula blommor. Äro odlade å bördigare jord ganska ömtåliga, förträffliga deremot å torr, mager jord, såsom i backslutningar etc.

**Halimodendron**, *Fisch.*, saltbuske. — *H. argenteum*, *Lam.*, Sibirien, 6—10 fot. Vacker buske med silfverhvita löf och rödaktiga blommor. Härdig, föga kinkig på jordmån.

**Hedera**, *L.*, murgrön. — *H. Helix*, *L.*, Sverige. Bekant, ständigt grön klängväxt, som å passande lokaler uppnå betydlig höjd. Föredrager en lugn växtplats och något litet skugga, ehuru den trives äfven i ett läge för full sol, samt en stenig, kalkblandad jordmån. Fortkommer dock temligen väl i hvarje jordmån, till och med styf lera, blott platsen icke är mycket utsatt för blåst, eller då den har skydd mellan andra buskväxter. Odlas allmänt i kruka, deraf fördomen att den icke skall vara härdig, hvilket den dock verkligen är och måste vara, såsom förekommande ingalunda sällsynt i våra skogar i södra och mellersta Sverige. Förtjenar att planteras mera än f. n. är fallet.

**Hippophaë**, *L.*, haftorn. — *H. canadensis*, *L.* (*Shepherdia canadensis*, *Nutt.*), Kanada, 6—10 fot. Vacker, härdig buskart, som trives i hvarje ej allt för styf eller fet jord. — *H. rhamnoides*, *L.*,

norra Sverige från Haparanda till Roslagen, 6—10 fot hög, vacker buske med hvassa tornar och smala, silfvergrå löf och gula bär. Bör gerna planteras i torrare, magrare jord. Såsom en egendomlighet förtjenar anföras att ehuru denna buskart härstammar från höga Norden, bortfryser den icke sällan i mell. Sverige planterad i fet eller styf jord; å magrare, torrare jord är den fullt härdig.

**Juniperus**, *L.*, en, ene. — *J. communis*, *L.*, Sverige, allmän. Ene förtjenar verkligen en plats i hvarje trädgårdsanläggning, och tillsammans med Thuja och åtskilliga andra coniferer är den af utmärkt effekt, synnerligast de mera storväxta eller pyramidformiga varieteterna. Dessa äro dock temligen dyra, hvilket lägger hinder i vägen för deras allmännare plantering. — *J. excelsa*, *Bieb.* (*J. Bedfordiana*, *hort.*), Sibirien etc. skall i sitt hemland uppnå 20—30 fots höjd och deröfver. En utmärkt vacker art, hvaraf till och med helt unga exemplar å Landtbruksakademiens experimentalfält under loppet af flera år visat sig fullt härdiga. Är dock åtminstone ännu ganska dyr. — *J. Sabina*, *L.*, säfvenbom (tyska Seewenbaum), Sibirien, södra Eur. etc., 5—10 fot hög. Temligen bekant vackert grön, härdig buske. — *J. virginiana*, *L.*, n. Am. skall i sitt hemland bilda träd af ända till 50—60 fots höjd; torde hos oss blott bli en högre buske. Har å experimentalfältet visat sig något öm i ungdomen, äldre exemplar äro deremot ganska härdiga. En vacker art.

Trifvas bäst i sandblandad, något lerhaltig jord.

**Kerria**, *DC.* — *K. japonica*, *DC.*, Japan, 3—5 fot hög med gula blommor. Förekommande allmännast såsom dubbelblommande. Trifves i vanlig god trädgårdsjord. Passar endast för södra Sverige. Bortfryser ofta i mellersta delen af landet.

**Ligustrum**, *L.*, liguster. — *L. ovalifolium*, *Lam.* (*L. buxifolium*, *hort.*), Japan, 3—6 fot hög buske. Uppgifves i utländska arbeten såsom mycket ömtålig, uthärdar dock temligen väl å Landtbruks-Akademiens experimentalfält och kan rekommenderas för södra samt äfven för skyddade platser i mellersta Sverige. Vacker. — *L. vulgare*, *L.*, Sverige, troligen förvildad, 6—10 fot, vacker buske med hvita blommor och svarta bär. Särdeles passande till prydnadshäckar. Trifves i hvarje för odling fullt lämplig jordmån. Varieteter: *angustifolium*, med smalare blad; *baccis flavis*, med gula bär; *baccis viridis*, med gröna bär; *fl. luteo*, med gula blommor; *fol. alb. varieg.*, med hvitbrokiga blad; *fol. eleg. varieg.*, med gulbrokiga blad; *fol. luteis*, med gula blad; *sempervirens (italicum)*, med ständigt gröna blad (detta dock endast i särdeles skyddade lägen).

**Lonicera**, *L.* Slägtet *Lonicera* kan rätteligen sägas innefatta två släkten, hvaraf det ena, **try** (*Xylosteum*), omfattar upprättväxande arter och det andra, **kaprifolium** (*Periclymenum* eller *Caprifolium*), omfattar rankande arter. Båda dessa släg-



ten sammanföras dock af botanisterna under ofvannämnda slägtnamn. Då emellertid deras användningssätt är olika, vilja vi här afhandla tryarterna och kaprifoliearterna hvar för sig i särskilda afdelningar.

a. Upprättväxande *Lonicerae*: try.

*L. alpigena*, *L.*, Bäjern, Österrike etc., 4—8 fot. Vacker buske med brunröda blommor och röda bär. — *L. altaica*, *Pall.*, Altaiberget, 3—6 fot, med vitgula blommor och svartblå bär. — *L. coerulea*, *L.*, Sverige, på Osmundsberget i Dalarne m. fl. st., 3—6 fot hög, med hvita blommor och blåa bär. — *L. hispida*, *Pall.*, Altaiberget, 2—3 fot med gulgröna blommor och röda bär. — *L. iberica*, *Bieb.*, södra Rysslands berg etc. 3—6 fot. Tätbladig art med gulaktiga blommor och röda bär. — *L. Ledebourii*, *Eschsch.*, Nykalifornien, 3—6 fot, med rödgula blommor och röda bär. — *L. nigra*, *L.*, mell. Europa, 3—6 fot med rödaktiga blommor och svarta bär. — *L. orientalis*, *Lam.*, Iberien, mindre Asien, 3—6 fot, med röda blommor och svarta bär. Är oaktadt namnet synes antyda annat, fullt härdig. — *L. pyrenaica*, *Willd.* (icke *Lin.*) Sibirien etc., 6—10 fot, med hvita blommor och gula bär. Till växtsätt och bladform lik *L. tatarica*, af hvilken den anses vara varietet. *L. pyrenaica*, *Linné*, är en annan, hvilken vi ännu icke haft tillfälle att försöka. — *L. tatarica*, *L.*, rosentry, Tatariet, Sibirien, 10—15 fot hög, med hvita, oftast rödrandiga blommor och röda bär. En bland de härdigaste och praktfullaste blomsterbuskar som finnas. — *L. Xylosteum*, *L.* Sverige, allmän, vanlig try, 6—10 fot, med vitgula blommor och röda bär.

Tryarterna äro alla vackra buskar, som förtjena att rikligen användas i parkanläggningar. Trifvas i nästan hvarje jordmån.

b. Rankande *Lonicerae*: kaprifolier.

*L. Caprifolium*, *L.*, vanlig kaprifolium, södra Europa, uppnår 15—30 fots höjd. Har gulhvita blommor och ljusröda bär. En vacker, härdig art. — *L. dioica*, *Ait.*, n. Am. uppnår 10—15 fots höjd. Blommorna rödgula, bären mörkröda. Storbladig, vacker. — *L. etrusca*, *Santi Viagg.*, södra Frankrike, Krain etc., uppnår 10—15 fots höjd med röda blommor. Vacker. — *L. flava*, *Sims.*, n. Am., uppnår 15—30 fots höjd. Har stora blad, gula blommor och röda bär. — *L. grata*, *Ait.* n. Am., 15—20 fot hög, vacker. — *L. occidentalis*, *Hook.*, vestliga delen af norra Amerika, torde uppnå 20—30 fots höjd. Har gulröda blommor. — *L. Periclymenum*, *L.* Sverige, uppnår 20—30 fots höjd. Har utvändigt röda, invändigt hvita blommor, hvilka, då växten odlas, synas ha benägenhet att öfvergå mera i gult. Bären mörkröda. En bland de härdigaste och praktfullaste rankande buskväxter som finnas. Varietet: *quercium fol. varieg.*, med rundflikiga, brokiga blad.

— *L. pubescens*, *Sweet.*, Kanada, 20—30 fot. Har ludna blad, gula blommor och röda bär. Sällsynt. — *L. sempervirens*, *Ait.*, Virginien etc., 10—15 fot. Blommorna högst praktfulla, långa, utvändigt skarlakansröda, invändigt gulröda. Har deremot svag växt och är något öm.

Utom dessa finnas åtskilliga andra vackra kaprifolier i odling, hvilka dock i botaniskt hänseende äro, i anseende till den i handelsträdgårdar oftast rådande villervallan, ännu temligen obestämda och derföre här icke kunnat upptagas. Kaprifolierna fordra en lös, varm, bördig jord och ett skyddadt läge. *L. Periclymenum* och *L. Caprifolium* äro de härdigaste och för våra förhållanden de bästa, ehuru åtskilliga andra ha ett frodigare, rikare utseende.

**Lycium**, *L.*, bocktörne, fasanbuske. — *L. barbarum*, *L.*, södra Eur., Asien, norra Afrika samt i Sverige (förvildad), 10—15 fot hög, med långa, slankiga, bågböjda grenar och är derföre särdeles användbar såsom rankväxt. Har röda eller violetta blommor och gula bär. — *L. europaeum*, *L.*, södra Eur., 10—15 fot hög, med rödaktiga blommor och gulröda bär. Temligen öm för våra vintrar. — *L. ovatum*, *Pers.*, Kina, 6—10 fot, med violetta blommor och gulröda bär. — *L. ruthenicum*, *Murr.*, mell. och norra Asien, 3—6 fot, med rödgredelina blommor och svarta bär. Är ganska sällsynt i våra anläggningar, ehuru namnet icke är det. *Lycium barbarum* förekommer näml. icke sällan under namn af *L. ruthenicum*.

Dessa buskar, i synnerhet den förstnämnda, äro förträffliga till plantering för täckande af hvarjehanda mindre vackra föremål, såsom stenmurar, större stenar etc. och de äro väl egnade för bildande af buskager i steniga backar. Skjuta en myckenhet rotskott och bilda slutligen ogenomträngliga massor, i hvilka nyttiga småfoglar finna godt skydd och lämpliga häckplatser. Äro föga nogräknade på jordmån.

**Mahonia**, *Nutt.* — *M. Aquifolium*, *Nutt.*, norra Amer., 3—5 fot hög buske med ständigt gröna, glänsande löf, gula blommor och mörkpurpur-röda bär. Utmärkt vacker och temligen härdig. — *M. repens*, *G. Don.* n. Am., 2—3 fot, med ständigt gröna (icke blanka) löf, gula blommor och blåsvarta bär.

Utmärkt vackra buskar, som förtjena en plats i hvarje anläggning, så mycket heldre som det gifves helt få ständigt gröna buskväxter, som fullkomligt uthärda våra vintrar. Synas trifvas bäst i något lerhaltig jordmån.

**Mespilus**, *L.* — *M. germanica*, *L.*, mell. och södra Europa, 10—15 fot, med stora, hvita blommor och runda frukter, stora som mindre äpplen och i någon mån liknande sådana. Fordrar varm jordmån och skyddadt läge. Passar endast för södra och mell. Sverige.

**Morus**, *L.*, mullbär. — *M. alba*, *L.*, hvita mullbär, Syrien, Persien, Kina. (Forts.)



## Minneslista för trädgårdsodlare i september månad 1870.

Spenat och rädisor sås äfven i denna månad. Till spenat väljes ett jordstycke som är bördigt och fritt från ogräsfrön, ty eljest utvecklar sig ogräs i stor mängd under höstmånaderna. Rädisorna sås helst på ledigblifna drifbänkar. Sockerrötter och körvelrofvor, hvilka dock endast sällan odlas hos oss, är det emellertid rätta tiden att så nu. Blomkål, afsedd för att öfvervintras, sås på en afdrifven drifbänk eller i lådor. Plantorna sättas senare flera tillsammans i lådor eller ock i smärre krukor, en i hvarje, och öfvervintras i ett svalt, torrt växthus eller annat ljusst, frostfritt rum.

Åtskilliga fleråriga köks- och blomsterväxter kunna fortfarande omplanteras. I senare delen af månaden planteras träd- och buskväxter med fördel. Härifrån undantagas dock alla för klimatet ömtåliga sorter, äfvensom pil- och pop-

pelarterna, hvilka alltid heldre böra planteras om våren.

Blomsterlökar, näml. *hyacinter*, *tulipaner* *crocus*, *tazetter* m. fl., afsedda till drifning under vintern, inplanteras nu i krukor. I slutet af denna eller början af nästa månad utplanteras äfven dylika lökar på kalljord.

I medlet af månaden förses fruktträden med kransar, på sätt detta flera gånger i föregående årgångar af Tidning för trädgårdsodlare finnes beskrifvet, för att hindra frostfjärilshonorna från att komma upp i träden och lägga ägg.

Sättqvistar af åtskilliga träd och buskar kunna fortfarande sättas på kalljord.

Krukväxterna, som under sommaren varit utflyttade i det fria, inflyttas nu.

Fröinsamlingen fortsattes.

## Kortare uppsatser och notiser.

**Mammoth-trädet.** År 1860 planterades i Göteborgs Trädgårdsförening, på ett för de starkaste vindarne någorlunda skyddadt ställe och i styf, tung lerjord, ett en fot högt exemplar af det s. k. Mammoth-trädet från Kalifornien, *Wellingtonia gigantea*. Samma exemplar har nu, efter 10 års förlopp, uppnått följande dimensioner:

Omedelbart öfver jordytan mäter stammen 2 fot 4 tum, och tvänne fot öfvan marken 1 fot 6 tum i omkrets. Exemplarets höjd är 11 fot och dess periferi 2 fot från marken 26 fot 6 tum. Trädet, med dess oskadade grenar från toppen ända ned till marken, bildar en praktfull pyramid och är måhända det största och vackraste exemplar som finnes i Skandinavien af detta sällsynta trädslag.

De första vintrarne skyddades det unga trädet af temligen tjock granrisbeklädad, hvilken påfördes sedan frosten nedträngt några tum i jorden, men efterhand som det blef äldre och tilltog i styrka, förtunnades betäckningen och anlades först sent om vintern. En god del af fjolårets vinter stod trädet obetäckt och motstod under tiden — 17° Cels. utan att i ringaste mån deraf lida skada. Jag är nu fullt öfvertygad om trädets hårdighet för vårt klimat och tänker att hädanefter med betäckningen endast skydda detsamma mot snö, som, då den är våt och tung och i för stor mängd lagrar sig på de lummiga grenarne, lätt kan afbryta dem. Trädet bör ej planteras i för kraftig, utan heldre i något mager, sandblandad jord, hvaruti det visserligen icke växer så hastigt, men deremot vinner mera förmåga att motstå vintrarne.

**Tvänne nya infattningsväxter.** Bland den stora massan af ettåriga blomsterväxter, som för närvarande odlas, egnar sig endast ett helt ringa antal till infattning eller garnering af blomstersångar och grupper. De aldri flesta hafva någon egenkap, som gör dem mindre lämpliga för nämnda ändamål. Antingen äro blommorna för oansenliga eller af för obestämda färger, eller har växten för kort blomningstid, eller blifver den för hög o. s. v. Hvarje god tillökning i antalet af dessa växter bör derföre vara välkommen och det är oss ett nöje, att kunna rekommendera tvänne nya växter, som icke allenast äro fullt lämpliga för ofvannämnda ändamål, utan äfven särdeles lätta att odla och billiga att anskaffa, alldenstund de hvarje år uppdragas genom frö, som köpes billigt i hvarje någorlunda väl försedd fröhandel. Den ene är en varietet af den temmeligen allmänt kända s. k. matransväxten (*Matricaria Parthenium*) och kallas i frökataloger *Pyrethrum parthenifolium aureum*. Den är egentligen flerårig, men bör behandlas som ettårig, d. v. s. hvarje år uppdragas af frö. Växten uppnår en höjd af 3 å 4 tum, här ett friskt, vackert, ljusst gulgrönt löfverk, som skarpt kontrasterar mot det omgifvande gräset, och trifves i hvarje jordmån och

i hvarje läge. Den andra af de begge nyheterna är en formförändring af den i botaniska trädgårdar ofta odlade *Amaranthus bicolor*. Kallas i fröförteckningarne *A. bic. purpureus*. Den utmärker sig för blodröda blad, hvilka, då växten planteras i något mager och sandblandad jord och på en för fulla solen utsatt lokal, ofta till en del öfvergå i skarlakansrödt. Växten har i Göteborgs trädgårdsförenings trädgård uppnått omkring 8 å 10 tum höjd och har visat sig vida bättre kunna motstå kall och ogynsam väderlek, än den sedan 1863 odlade *A. melancholicus*. Båda dessa nya växter kunna med största fördel användas såväl bland bladväxter som på blomstergrupper. Fröet sås i ljum drifbänk, hvarefter plantorna sedan utplanteras. G. L.—n.

**Något om s. k. fria grönsaker.** Bruket att bland löneförmåner tilldela vissa tjänare fria grönsaker borde trädgårdsegarne helt och hållet upphöra med, ty om alla slags förmåner, af hvad beskaffenhet som helst, der förmånens beskaffenhet icke är noga begränsad, kunna urarta till missbruk, är detta sannolikt i högsta grad fallet med s. k. fria grönsaker; ty för det första är benämningen grönsaker teml. obestämd och för det andra kan som sagt är tillåtelsen att efter behof få sådana till sitt hushåll genom att utsträcka begreppet grönsaker till allt möjligt som inom trädgården produceras, leda till högst betydliga missbruk. Det kan till och med hända att trädgårdsegaren icke ens alltid kan infria sitt obetänksamma löfte. Räkna man till grönsaker potatis, frukt, alla slag, och äfven sådan till torkning och till saft, bruna bönor, ärter till torkning och inläggning, m. m. d., utom allt sådant som odspubabelt hör dit, kunna de lofvade fria grönsakerna komma att stå trädgårdsegaren rätt dyrt, helst sådana år, då det blir litet eller ingen frukt, då bruna bönorna ej mogna o. s. v. enär han då skulle för att fullt infria sitt löfte, nödgas köpa sådant till höga priser.

I stället för fria grönsaker ville jag derföre föreslå att åt hvarje gift tjänare anläggas en mindre trädgård eller att åtminstone upplåta en lämpligt belägen jordbit att anlägga trädgård på. Derigenom vore förmånen af grönsaker ordentligt begränsad, och det berodde då på hvars och ens egen omtanke och idoghet att skaffa mer eller mindre tillgång på grönsaker för sitt behof. Korteligen, jag vet af erfarenhet att ömsesidiga belåtenheten blir större genom en sådan anordning. Denna här anmärkta sak är viktigare än mången torde tro och jag har derföre ansett den böra påpekas.

**Dahlia imperialis.** Enligt benäget meddelande af hr direktör Fr. Pettersson, har Dahlia imperialis blommat i Upsala botaniska trädgård sistlidne höst. Behandlingen der har varit följande: Af plantor som under sommaren stått på fritt land och der uppnått en höjd af 7 å 8 fot inplanterades, någon af de sista dagarne i augusti, 2 exemplar i krukor, hvilka nå-



gra dagar ställes i skugga och sedan inflyttades i varmhuset, der de i början af oktober visade blomknopp och i november vid 11 à 12 fots höjd utvecklade sina praktfulla rent hvita \*) klockformiga blommor. Direktör Pettersson tillägger att han funnit lämpligast att behandla denna dahlia på samma sätt som den vanliga dahlia, näml. att under vintern förvara rotknölarne torra och i mars eller april sätta dem till drifning för utplantning på fritt land, der de till hösten uppnå en höjd af 8 à 10 fot och utgöra allt ifrån början en verklig prydnad såsom bladväxt.

**Kannväxten.** På Ceylon förekommer en växt hvars botaniska namn är *Nepenthes destillatoria*, L. På svenska har den blifvit kallad kannväxten, emedan dess blad ega formen af en med lock försedd kann. Från stielken utgår ett bladskäft eller en bladslida af 6—8 tums längd, 1—2 tums bredd och lancettlik form,



upptill förlängd till ett smalare skäft, uppbärande den 3 tum långa och 1 tum vida kannan, hvilken utgör själva bladet. Då kannan först utväxer är locket sammanväxt med dess kanter, men sedan lossnar det och öppnar sig. I dessa kannor afsöndras ur själva växten ett fullkomligt rent vatten, som förblifver deri och hvaraf kannorna efterhand fyllas, tills de genom vattnets tyngd taga öfverbalansen och uttömma en del af sitt innehåll. Denna växt är för resande i de trakter den förekommer en välgerning, emedan den lemna tillgång till drickbart vatten, hvilket der eljest skall vara svårt att finna, och skola 6—8—10 kannor innehålla tillräckligt vatten för släckande af en människas törst. Efter »Bilder ur växtvärlden» af Th. M. Fries meddelas här en afbildning af ett blad af nämnde växt.

Utom denna art finnas flera tillhörande samma släkte, alla bärande kannor. I europeisk odling äro utom den nämnda införda: *Nepenthes ampullacea*, Jack., från Ostindien; *N. glabra*, Lindl., Java; *N. madagascariensis*, Poir., Madagaskar; *N. Rafflesiama*, Jack., Ostindien; *N. villosa*, Hook., Borneo, och några andra. De äro varmhusväxter och som de växa i sumptrakter fordra de mycken fuktighet. *Nepenthes destillatoria* har ett par gånger blifvit införskrifven till Haga, men der som vi tro åter gått förlorad och vi känna icke huruvida den f. n. finnes i odling inom Sverige.

E. L.

\*) De blommor vi erhöilo från Åkers styckebruk hade någon dragning åt rödt. Särkerligen en följd deraf att dessa blommor som, utvecklade sig vid slutet af april, hade haft rikligare tillgång på sol och ljus.

E. L.

### Annons

emottagas till införande mot 12 öre pr petrad. För gröfre stilsorter betalas i mån af det utrymme de upptaga. Annonserna måste, för att kunna inkomma i något visst nummer, vara komna redaktionen tillhanda den 10:de i föregående månad.

Som flere så väl äldre som yngre trädgårdsmästare från åtskilliga delar af landet anmält sig önska platser vid instundande höstflyttning, kunna de som äro i behof af trädgårdsmästare derom hänvända sig till undertecknad.

Stockholm & Experimentalfältet i juli 1870.

E. Lindgren.

Härmed följer såsom bihang: Priskurant från Kgl. Landbruks-Akademiens Experimentalfälts trädskolor.

**En yngre, examineret dansk Gartner,** söger Plads paa en Herregaard til August eller senere. Han har opholdt sig i de større danske Herregaardshaver i 8 Aar, dels som Elev og dels som Medhjælper og kan fremvise gode Anbefalinger. Det bemærkes, at han er fri for militærtjeneste undtagen i Krigstilfælde. Reflectanter bedes om at henvende sig til *Konseilleraad Eilskov i Odense*.

**En ogift Trädgårdsmästare,** med grundliga insigter i alla delar af sitt fack, önskar plats till hösten. Närmare upplysningar har Redaktionen af Tidning för Trädgårdssodlare lofvat meddela.

**En trädgårdsmästare** i sina bästa år, som praktiserat på flera framstående ställen och kan förete hedrande vittnesord, önskar plats till hösten på någon större landegendom. Reflekterande som härä fasta uppmärksamhet torde lemna adress till herr Direktör Lindgren, Stockholm & Experimentalfältet.

**En Trädgårdsmästare** med mångårig praktik, förvärfvade mångsidiga kunskaper och goda insigter i sitt yrke, samt försedd med tillförlitliga, rekommenderande betyger öfver sitt såväl moraliska som tjensteuppförande, önskar och söker sig till den 24 oktober ett passande emploi, uti hvilket han kunde få tillfälle att ådagalägga sina meriter och sin förmåga såsom en »sann» sådan. Hvarest de närmare till detta ändamåls vinnande, nödiga upplysningar och underrättelser erhållas, har Redaktionen för denna tidning benäget lofvat meddela.

**E. Wilh. Tjäders fröhandel** är i huset n:o 1 Stora Nygatan 1 trappa upp, midt emot Elektriska Telegrafstationen.

Kataloger såväl öfver Frö- som Trädskolealster och Dahlier utdelas gratis.

**Vid Upsala Läns Trädskola** försäljes *Frukträd* och *Bärbuskar*, *Trädgårdsmultron*-, *Hallon*-, *Rabarber*-, *Sparris*- och div. andra *Köksträdgårdsplantor*. *Allée*-, *Park*- och *Ornamentsträd*; *Park*- och *Blomsterbuskar*; *Törnrosor*; *Häckplanter*; *Rankväxter*; *Fleråriga växter* för friland; *Dahljerötter*, omkring 300 af yppersta urval; *Krukväxter*, mest modeplanter för rum och tempererad växthus, hvaribland *Fuchsia* 30 nyaste och nyare dubbla och enkla sorter, *Scharlet-Pelargonier*, 50 nyaste och nyare dubbla och enkla sorter, *Verbena* 40 sorter, *Rosor* af Remontantes, *Borbonica*, *Thea*, m. fl., öfver 100 sorter *Azalea*, *Camellia*, *Coleus*, *Côniferae* m. m. samt *Blomsterlökar* till vinterdrifning och kalljordsplantering.

Pris på *Äppelträd* pr 100 styck. Lågstammiga i goda sorter 75 rdr.

» » pr d:o 100 st. starka Halfstammiga d:o 80 rdr.

» » pr d:o 100 st. » Högstammiga pr st. 1 rdr.

» » pr d:o 100 st. » Högstammiga d:o 100 rdr.

» » pr st. 1: 25.

» » *Päronträd* pr 100 starka 90 rdr., pr st. 1 rdr.

» » *Plommon*-, *Körsbärs*-, *Bigarreau* och *Espalierträd* 1: 50.

pr styck.

Af *Frukträd* finnes under hösten att afläta omkring 300 sorter i 10,000 ex; de flesta efter Dr Enderoths *Pomologi*, passande för vårt lands mellersta och norra del. Med afseende på trädskolans nordliga läge och hårda klimat, kan här uppdragna träd med skäl rekommenderas.

Priskuranter sändas gratis; Requisitioner och bref adresseras till

C. J. Wallin

Upsala och länets trädskola.

Starka, skolade planter af *Cineraria hybrida* och *Primula chinensis fimbriata alba* och *rubra*, à 4 rdr pr 100 st. Emballage beräknas à 50 öre pr 100. Requisitioner torde med första insändas till undertecknad hvars adress är Stockholm, Stora Gråbergsgatan N:o 15.

J. F. Holm.

Handelsträdgårdsmästare.

### Innehåll:

Redogörelse för försöksodlingen af matväxter vid Kongl. Landbruksakademiens experimentalfält 1865, (slut). — Urval af träd och buskar för fritt land, (forts.). — Minneslista för trädgårdssodlare i september månad 1870. — Mammoth-trädet. — Tvänne nya infattningsväxter. — Något om s. k. fria grönsaker. — *Dahlia imperialis*. — *Kannväxten*.

STOCKHOLM, SIGFRID FLODINS BOKTRYCKERI, 1870.

Landbruks-Akademiens Experimentalfälts trädskolor.